

貯法：室温保存，遮光保存，吸湿注意
使用期限：外箱等に表示の使用期限内に使用すること
規制区分：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

	OD錠2.5mg	OD錠5mg
承認番号	22900AMX00838000	22900AMX00839000
薬価収載	2017年12月	2017年12月
販売開始	2017年12月	2017年12月
** 効能追加	2018年12月	2018年12月

HMG-CoA還元酵素阻害剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg 「日医工」
 ロスバスタチンOD錠5mg 「日医工」

Rosuvastatin OD

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 肝機能が低下していると考えられる以下のような患者
急性肝炎，慢性肝炎の急性増悪，肝硬変，肝癌，黄疸〔これらの患者では，本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。また，本剤は主に肝臓に分布して作用するので，肝障害を悪化させるおそれがある。〕
3. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳婦（「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」の項参照）
4. シクロスポリンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）

【組成・性状】

販売名	ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「日医工」	ロスバスタチンOD錠 5mg 「日医工」	
剤形・色調	うすい黄色のフィルムコーティング錠 （口腔内崩壊錠）		
有効成分の名称	ロスバスタチンカルシウム		
含量（1錠中）	2.6mg （ロスバスタチンとして 2.5mg）	5.2mg （ロスバスタチンとして 5mg）	
添加物	D-マンニトール，炭酸水素ナトリウム，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，クロスボビドン，結晶セルロース，アミノアルキルメタクリレートコポリマーE，スクラロース，L-メントール，ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー，酸化チタン，黄色三二酸化鉄，ステアリン酸マグネシウム		
外形	表面	 質量：77.5mg	 質量：154mg
	裏面	 直径：5.6mm	 直径：7.2mm
	側面	 厚さ：3.1mm	 厚さ：3.6mm
本体表示	ロスバスタチンOD 2.5 日医工	ロスバスタチンOD 5 日医工	
包装コード	㊤118	㊤119	

**【効能・効果】

高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞

- ** 1. 適用の前に十分な検査を実施し，高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
- ** 2. 家族性高コレステロール血症ホモ接合体については，LDL-アフェレーシス等の非薬物療法の補助として，あるいはそれらの治療法が実施不能な場合に本剤の適用を考慮すること。

**【用法・用量】

通常，成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが，早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお，年齢・症状により適宜増減し，投与開始後あるいは増量後，4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には，漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない，家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り，さらに増量できるが，1日最大20mgまでとする。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

1. クレアチニンクリアランスが30mL/min/1.73m²未満の患者に投与する場合には，2.5mgより投与を開始し，1日最大投与量は5mgとする。（「慎重投与」の項参照）
2. 特に20mg投与時においては腎機能に影響があらわれるおそれがある。20mg投与開始後12週までの間は原則，月に1回，それ以降は定期的（半年に1回等）に腎機能検査を行うなど，観察を十分に行うこと。
3. 本剤は口腔内で崩壊するが，口腔粘膜からの吸収により効果発現を期待する製剤ではないため，崩壊後は唾液又は水で飲み込むこと。（「適用上の注意」の項参照）

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - (1) 腎障害又はその既往歴のある患者〔重度の腎障害のある患者では，本剤の血中濃度が高くなるおそれがある。一般に，HMG-CoA還元酵素阻害剤投与時にみられる横紋筋融解症の多くが腎機能障害を有する患者であり，また，横紋筋融解症に伴って急激な腎機能悪化があらわれることがある。〕（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）
 - (2) アルコール中毒患者，肝障害又はその既往歴のある患者〔本剤は主に肝臓に分布して作用するので，肝障害を悪化させるおそれがある。また，アルコール中毒患者では，横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。〕（「禁忌」の項参照）
 - (3) フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等），ニコチン酸，アゾール系抗真菌薬（イトラコナゾール等），マクロラ

イド系抗生物質（エリスロマイシン等）を投与中の患者〔一般にHMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で横紋筋融解症があらわれやすい。〕（「相互作用」の項参照）

- (4) 甲状腺機能低下症の患者、遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィー等）又はその家族歴のある患者、薬剤性の筋障害の既往歴のある患者〔横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。〕
- (5) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

2. 重要な基本的注意

- (1) あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や高血圧、喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
- * (2) 腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合のみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。
- (3) 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。
- (4) 近位筋脱力、CK（CPK）高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元酵素（HMGCR）抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。（「重大な副作用」の項参照）
- (5) 投与開始又は増量後12週までの間は原則、月に1回、それ以降は定期的（半年に1回等）に肝機能検査を行うこと。

3. 相互作用

本剤は、OATP1B1及びBCRPの基質である。

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シクロスポリン（サンディミュン、ネオーラル等）	シクロスポリンを投与されている心臓移植患者に併用したとき、シクロスポリンの血中濃度に影響はなかったが、ロスバスタチンのAUC _{0-24h} が健康成人に単独で反復投与したときに比べて約7倍上昇したとの報告がある。	シクロスポリンがOATP1B1及びBCRP等の機能を阻害する可能性がある。

(2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* フィブラート系薬剤 ベザフィブラート等	フェノフィブラートとの併用においては、いずれの薬剤の血中濃度にも影響はみられていない。しかし一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	両剤共に横紋筋融解症の報告がある。 危険因子：腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ニコチン酸 アゾール系抗真菌薬 イトラコナゾール等 マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン等	一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	危険因子：腎機能障害のある患者
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	抗凝血作用が増強することがある。本剤を併用する場合は、本剤の投与開始時及び用量変更時にも頻回にプロトロンビン時間国際標準比（INR）値等を確認し、必要に応じてワルファリンの用量を調節する等、注意深く投与すること。	機序は不明
制酸剤 水酸化マグネシウム・水酸化アルミニウム	ロスバスタチンの血中濃度が約50%に低下することが報告されている。ロスバスタチン投与後2時間経過後に制酸剤を投与した場合には、ロスバスタチンの血中濃度は非併用時の約80%であった。	機序は不明
* ロピナビル・リトナビル アタザナビル/リトナビル ダルナビル/リトナビル グレカプレビル・ピブレンタスビル	ロスバスタチンとロピナビル・リトナビルを併用したときロスバスタチンのAUCが約2倍、Cmaxが約5倍、アタザナビル及びリトナビル両剤とロスバスタチンを併用したときロスバスタチンのAUCが約3倍、Cmaxが7倍、ダルナビル及びリトナビル両剤とロスバスタチンを併用したときロスバスタチンのAUCが約1.5倍、Cmaxが約2.4倍上昇したとの報告がある。またロスバスタチンとグレカプレビル・ピブレンタスビル ^{注)} を併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.2倍、Cmaxが約5.6倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤がOATP1B1及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
シメプレビル	ロスバスタチンとシメプレビルを併用したとき、ロスバスタチンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	シメプレビルがOATP1B1の機能を阻害する可能性がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ダクラタスビル アスナプレビル ダクラタスビル・ア スナプレビル・ベク ラプビル	ロスバスタチンとダ クラタスビル、アス ナプレビル、または ダクラタスビル・ア スナプレビル・ベク ラプビル ^{注1)} を併用し たとき、ロスバスタ チンの血中濃度が上 昇したとの報告があ る。	ダクラタスビル、 ベクラプビルが OATP1B1、1B3及 びBCRPの機能を 阻害する可能性が ある。また、アスナ プレビルがOATP 1B1、1B3の機能を 阻害する可能性が ある。
レゴラフェニブ	ロスバスタチンとレ ゴラフェニブを併用 したとき、ロスバスタ チンのAUCが3.8 倍、Cmaxが4.6倍上 昇したとの報告があ る。	レゴラフェニブが BCRPの機能を阻 害する可能性がある。
* グラゾプレビル/エ ルバスビル	ロスバスタチンとグ ラゾプレビル ^{注1)} 及 びエルバスビルを併 用したとき、ロスバ スタチンのAUCが約 2.3倍、Cmaxが約5.5 倍上昇したとの報告 がある。	左記薬剤がBCRP の機能を阻害する 可能性がある。
エルトロンボパグ	ロスバスタチンとエ ルトロンボパグを併 用したとき、ロスバ スタチンのAUCが約 1.6倍上昇したとの 報告がある。	エルトロンボパグ がOATP1B1及び BCRPの機能を阻 害する可能性がある。

注) 承認用量外の用量における試験結果に基づく。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用 (以下、全て頻度不明)

1) 横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミ
オグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、
急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがある
ので、このような場合には直ちに投与を中止すること。

2) ミオパチー

ミオパチーがあらわれることがあるので、広範な筋肉
痛、高度な脱力感や著明なCK (CPK) の上昇があら
われた場合には投与を中止すること。

3) 免疫介在性壊死性ミオパチー

免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれることがあ
るので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には
投与を中止し、適切な処置を行うこと。

4) 肝炎、肝機能障害、黄疸

肝炎、AST (GOT)、ALT (GPT) の上昇等を伴う
肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期
的に肝機能検査等の観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5) 血小板減少

血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等
の観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与
を中止し、適切な処置を行うこと。

6) 過敏症状

血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがあるので、
このような場合には投与を中止し、適切な処置を行う
こと。

7) 間質性肺炎

間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与で
あっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が
認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン

剤の投与等の適切な処置を行うこと。

8) 末梢神経障害

四肢の感覚鈍麻、しびれ感等の感覚障害、疼痛、ある
いは筋力低下等の末梢神経障害があらわれることがあ
るので、異常が認められた場合には投与を中止し、適
切な処置を行うこと。

9) 多形紅斑

多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切
な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

	頻度不明
皮膚 ^{注1)}	そう痒症、発疹、蕁麻疹
消化器	腹痛、便秘、嘔気、下痢、膵炎、口内炎
筋・骨格系	CK (CPK) 上昇、無力症、筋肉痛、関節痛、筋 痙攣
精神神経系	頭痛、浮動性めまい、健忘、睡眠障害 (不眠、 悪夢等)、抑うつ
内分泌	女性化乳房
代謝異常	HbA1c上昇、血糖値上昇
肝臓	肝機能異常 (AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇)
腎臓	蛋白尿 ^{注2)} 、腎機能異常 (BUN上昇、血清クレア チニン上昇)

注1) 症状が認められた場合には投与を中止すること。

注2) 通常一過性であるが、原因不明の蛋白尿が持続する場
合には減量するなど適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下していることが多いので、
患者の状態を観察しながら投与すること。また、横紋筋融
解症があらわれやすいとの報告がある。なお、他社が実施
した臨床試験では高齢者と非高齢者においてロスバスタチ
ンの血漿中濃度に明らかな差は認められていない。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しない
こと。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない
が、ラットに他のHMG-CoA還元酵素阻害剤を大量投与
した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更にヒト
では、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤で、妊娠3ヵ月ま
での間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれた
との報告がある。]

(2) 授乳中の婦人には投与しないこと。[ラットで乳汁中へ
の移行が報告されている。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全
性は確立していない (使用経験が少ない)。

8. 適用上の注意

(1) 薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用する
よう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭
角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞
炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

(2) 服用時

本剤は舌の上に乗せ、唾液を浸潤させると崩壊するため、
水なしで服用可能である。また、水で服用することもで
きる。

9. その他の注意

海外において、ロスバスタチンを含むHMG-CoA還元酵素
阻害剤投与中の患者では、糖尿病発症のリスクが高かつた
との報告がある。

【薬物動態】

生物学的同等性試験

(1) ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」

ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」は、「含量が異な
る経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン (平

成24年2月29日 薬食審査発0229第10号)に基づき、ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。¹⁾


(2) **ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」**

ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(ロスバスタチンとして5mg)健康成人男性に絶食単回経口投与(水なしで服用及び水で服用)して血漿中ロスバスタチン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC, Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。²⁾

<ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」：水なし>

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	81.56±17.09	7.28±1.78	4.4±1.1	14.4±2.9
標準製剤(普通錠, 5mg)	75.31±23.25	6.87±2.23	4.4±1.2	18.2±6.5


(1錠投与, Mean±S.D., n=20)



<ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」：水あり>

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	72.76±26.81	6.39±2.34	4.6±1.0	16.2±10.2
標準製剤(普通錠, 5mg)	69.42±25.73	6.26±2.51	4.1±1.1	14.2±3.8

(1錠投与, Mean±S.D., n=20)



血漿中濃度並びにAUC, Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


【薬効薬理】

コレステロール生合成の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素を競合的に阻害することによってコレステロールの生合成を抑制する。³⁾

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ロスバスタチンカルシウム (Rosuvastatin Calcium)
 化学名：Monocalcium bis((3R, 5S, 6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methanesulfonyl(methyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3, 5-dihydroxyhept-6-enoate)

構造式：



分子式：(C₂₂H₂₇FN₃O₆S)₂Ca

分子量：1001.14

性状：白色の粉末である。

アセトニトリルに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、水に溶けにくく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

安定性試験

本品につき加速試験(40℃, 相対湿度75%, 6ヵ月)及び長期保存試験(25℃, 相対湿度60%, 18ヵ月)を行った結果、ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」及びロスバスタチンOD錠5mg「日医工」は通常の市場流通下において2年間安定であることが推測された。⁴⁾

【包装】

ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」

100錠(10錠×10; PTP)

140錠(14錠×10; PTP)

500錠(バラ)

ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」

100錠(10錠×10; PTP)

140錠(14錠×10; PTP)

500錠(バラ)

【主要文献】

- 1) 日医工株式会社 社内資料：生物学的同等性試験(OD錠2.5mg)
- 2) 日医工株式会社 社内資料：生物学的同等性試験(OD錠5mg)
- 3) グッドマン・ギルマン薬理書(上)薬物治療の基礎と臨床 第12版 1134, 廣川書店, 2013
- 4) 日医工株式会社 社内資料：安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120)517-215

Fax (076)442-8948

