

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

瞳の健康を考えた1回使い切りタイプ ティアーレ®シリーズ

ものもらい・結膜炎の治療に ティアーレ® 抗菌目薬

第2類医薬品

特長

有効成分が
目の表面に

長くとどまる

ヒアルロン酸Na
(粘稠剤として)
配合

(はやり目)
結膜炎



(まぶたのただれ)
眼瞼炎



ものもらい

かゆみ

**抗菌成分
サルファ剤**

細菌に対して強い抗菌力を持つサルファ剤を

基準内最大濃度配合※

[スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%]

**W配合
抗炎症成分**

グリチルリチン酸二カリウムとイブシロン-
アミノカプロン酸が目の炎症を効果的に
しのぎます。

**防腐剤
フリー**

無菌充てん・防腐剤無添加の「1回使い切り
タイプ」で、使うときいつでも新鮮・清潔です。
小さなお子様にもご使用いただけます。

※眼科用薬製造(輸入)承認基準

保管・取扱注意

- 品質を保つため、保存する場合は内袋と箱に入れてください。
- 本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- ・長期連用しないでください。
 - ・コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
 - ・点眼用にのみ使用してください。



相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) はげしい目の痛みがある人。
- (5) 他の目薬を使用している人。

2 使用後、次の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹、発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 使用後、症状の持続又は増強がみられた場合

(3) 3~4日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

【用法・用量】 1日5~6回、1回2~3滴点眼する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ・キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開封してください。(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- ・使用後に薬液が残っていても、再使用しないでください。

【成 分】 スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%

グリチルリチン酸二カリウム 0.2%

イブシロン-アミノカプロン酸 1.0%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ヒアルロン酸ナトリウム、pH調節剤を含有します。



【保管及び取扱い上の注意】

- ・直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- ・本品は、光による薬液の変質を防ぐため、着色袋を使用しておりますが、保存する場合は内袋と箱に入れるなど、光の当たらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。
- ・本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。
- ・小児の手のとどかない所に保管してください。
- ・他の容器に入れかねないでください。
- （誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・1本を他の人と共用しないでください。
- ・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後はすみやかに使用してください。
- ・本剤を携帯する際、ズボンの後ろポケット等に入れないとください。（キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。）
- ・本剤を点眼後、口中に苦味または甘みを感じることがありますが、本剤の有効成分によるものですので、ご心配ありません。