

### 【使用上の注意】

#### 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
長期連用しないこと

#### 【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) 次の症状のある人。むくみ (4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。  
3. 5～6日間服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.

# カゼなどで熱がある時や肉体的疲労時の栄養補給、 滋養強壮 ビタグルコンK

#### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(20mL)を1日3回服用する。●用法及び用量を厳守すること。

#### 【効能・効果】

発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体的疲労・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮

製造販売元

**Rinyo**

**金陽製薬株式会社**

奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451

販売名:ビタグルコンK

#### 【成分・分量】

1日量(60mL(20mL×3本))中  
カンゾウエキス900mg(原生薬換算量3600mg)、ショウキョウエキス25mg(原生薬換算量300mg)、ケイヒ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、タウリン1500mg、リボフラビン3mg、ピリドキシン塩酸塩15mg、ニコチン酸アミド30mg、(アルコール含有0.2mL以下)、添加物として白糖、ブドウ糖果糖液糖、DL-アラニン、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調整剤、アルコール、グリセリン、香料、プロピレングリコールを含有します。  
●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

●生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

第2類医薬品 20mL

ガラス:ビン、金属:キャップ



4