

肩こり 腰痛

お肌にやさしく、ムレにくい
消炎鎮痛ラスター 穴あきタイプ

第3類医薬品

痛みのもとに
密着浸透!!

痛みのもとに
密着浸透!!

肩こり 腰痛


お肌にやさしく、ムレにくい
消炎鎮痛ラスター 穴あきタイプ

ビタミンE
配合

140枚入

保存袋付

サイズ(6.2cm×4.2cm)



肩こり 腰痛

お肌にやさしく、ムレにくい 穴あきタイプ
消炎鎮痛ラスター

ビタミンE
配合

140枚入

保存袋付

サイズ(6.2cm×4.2cm)

第3類医薬品

お肌にやさしく、ムレにくい
消炎鎮痛ラスター 穴あきタイプ

第3類医薬品



PRINTED WITH
SOY INK™

この箱は、環境に配慮し、水なし印刷方式、
大豆油インキを使用しております。

痛みのもとに
密着浸透!!

製造番号

使用期限



4 987754 103958

T11



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しあわせ、骨折痛

用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関する注意>

(1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(6) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚(6.2cm×4.2cm)

発 売 元 マイクロウェーバー株式会社

広島県三原市沼田西町小原200番地の76

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)



使用上の注意

成分及び分量 1.0m²中

dl-カンフル	1.80g
サリチル酸メチル	9.00g
ハッカ油	1.20g
l-メントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ノニル酸ワニリラミド	0.01g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-エチルヘキシリ共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。		

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話: 076-479-1313

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)