

RiUP X5

説明書

RiUP X5

第1類医薬品

リアップX5

壮年性脱毛症における発毛剤

リアップX5は、有効成分
ミノキシジルを、当社従
来品※の5倍量(5%)配
合した男性用の発毛剤
です。

キャップを開け、頭皮に
押しあてるだけで、1回
量の1mLを計量できる
容器です。

ミノキシジルを5倍量
配合することにより、
優れた発毛効果を発揮
します。



※ リアップ、リアッププラス

安全に、かつ効果的にお使いいただくために…

目次

使用上の注意／してはいけないこと	3
使用上の注意／相談すること	4
使用上の注意／その他の注意	6
効能・効果	7
成分・分量	7
用法・用量	8
容器の使用方法	9
保管及び取扱い上の注意	11
正しい洗髪方法	11
1日2回のヘアケア習慣	12
ヘアケアQ&A	13
お困りのことがあったら	14

リアップX5は、
「壮年性脱毛症における発毛剤」です。

髪が成長するには時間がかかります。発毛の効果を実感するまで、少なくとも4ヵ月間、用法・用量を守って正しくお使いください。

また、その後は脱毛の進行予防の効果（既に始まってしまった脱毛がそれ以上進行するのを防ぐ効果）を維持するためにも、継続してご使用になることをおすすめいたします。

壮年性脱毛症とは、一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行し、目立つようになるものです。

使用上の注意

❌してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。

1 次の人は使用しないでください。

1 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2 女性。

本剤は日本人女性における安全性が確認されていないため、女性の方はミノキシジルを1%配合した「リアップレディ」をご使用ください。

3 未成年者（20歳未満）。

国内での使用経験がありません。

4 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。

本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。

5 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。

2 次の部位には使用しないでください。

1 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。

血圧が下がる等のおそれがあります。

2 きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。

きず等を悪化させることがあります。

3 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります



相談すること

1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

1 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2 高血圧の人、低血圧の人。

本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。

3 心臓又は腎臓に障害のある人。

本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。

4 むくみのある人。

むくみを増強させる可能性が考えられます。

5 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。

6 高齢者(65歳以上)。

一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

- 7 次の診断を受けている人。
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、 ふけ、使用部位の熱感等
神 経 系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器系	胸の痛み、心拍が速くなる
代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、 手足のむくみ

3 6ヵ月使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

4

使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

その他の注意

1

毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヵ月間、毎日使用してください。

本剤の有効性は4ヵ月使用後から認められています。

2

毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

3

効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。


本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び
脱毛（抜け毛）の進行予防。

この医薬品の対象となる壮年性脱毛症

リアップX5は、以下のようなパターンの脱毛
あるいは薄毛に効果があります。



※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

成分・分量

100mL中

成分	ミノキシジル
分量	5.0g
はたらき	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。

添加物：1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、
リン酸、エタノール

用法・用量

成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを
脱毛している頭皮に塗布してください。

1回1mLのご使用は、脱毛範囲の大小に関係なくお守り
ください。1mLは塗り広げれば、頭皮全体に十分に行きわ
たる量として設計してあります。

なお、容器は1mLを計量できるタイプです。

注 意



- 1 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。（決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります）
- 2 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- 3 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- 4 頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
- 5 アルコールなどに溶けるおそれのあるもの（メガネわく、化学繊維等）にはつかないようにしてください。
- 6 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- 7 染毛剤（ヘアカラー、毛染め、白髪染め等）を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

容器の使用方法

1回量の1mLを計量できるタイプの容器です。

1 準備

容器本体をたてにして、キャップをゆっくりまわしてはずします。



2 確認

容器を逆さにすると薬液が計量室(ドーム部分)に入ります。

3 計量

容器を逆さにしたまま、ゆっくりと頭皮にノズル先端部を押しあてて、ノズルが止まるまでしっかり押し込んでください。

(ノズルが押し込まれることにより、1回量の1mLが計量されます。)

注意頭皮に対して垂直に押しあてないと、毛髪がノズルにはさまることがあります。


4 塗布

ノズル先端部を頭皮に押しあてては離しながら、薬液が計量室から完全になくなるまで毛髪の薄い部分全体に塗布してください。




注意強く押しつけたり引っかかりたりすると、頭皮が傷つくおそれがありますのでおやめください。

誤飲防止のため容器本体と計量室、ノズルがはずれなくなっています。

薬液が入る前




薬液が入った後



5 終了


ノズルから薬液がでなくなったら、キャップを容器の面と一致するまで、ゆっくりとまわして、しめてください。(最後までしっかりしめることで、次回の準備ができます。)



まれにノズル周辺に白い結晶があらわれることがありますので、その場合はふきとってからご使用ください。

保管及び取扱い上の注意

- 1 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
- 2 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 4 火気に近づけないでください。
- 5 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



正しい洗髪方法

- 1 めるま湯でざっと髪と頭皮の汚れを洗い流します。
- 2 洗髪時の髪への摩擦を少なくするため、シャンプーは直接髪につけず、手のひらでよく泡だててお使いください。
- 3 爪を立てずに、指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。
- 4 シャンプーをよく洗い流します。すすぎ残りはふけ・かゆみの原因になります。

1日2回のヘアケア習慣

リアップX5は**1日2回**、1回1mLを
脱毛している頭皮に塗布します。

◎ご使用になる時間について

1日2回のタイミングは、ライフスタイルに応じて様々ですが、時間
間隔をあけて、例えば朝夕にお使いいただくと効果的です。
また、できるだけ頭皮が清潔な状態でご使用になることをおすすめ
します。ご自身のライフスタイルに合わせた習慣をお作りください。

例) 洗髪のタイミングに合わせて…



*1：マッサージはリアップX5塗布前に行ってください。

*2：リアップX5は十分髪が乾いてからお使いください。

ヘアケアQ & A

Q. 壮年性脱毛症とはどのような脱毛症ですか？

A. 徐々に進行する遺伝性の薄毛・抜け毛です。

一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行します。普通、頭髮は2～7年程度をかけて太くしっかりと成長しますが、壮年性脱毛症の方ではその成長期間が短くなってしまいうため、細く短い毛になってしまいます。早い人では20代から発症することもあります。

Q. 1日2回より多く使ってもよいですか？

A. リアップX5は「1日2回」、お守りください。

1日2回より多く使ったり、1回の量を多く使っても効果はあがりません。回数を増やしたり、多く塗ったりしても、髪の毛の成長が速くなることはほとんどなく、かえって副作用の頻度を上昇させるおそれがあります。また使用を忘れたからといって、次回に倍量使うこともおやめください。

Q. 毎日洗髪した方がよいですか？

A. 1日1回の洗髪がおすすめです。

頭皮は髪の毛の土台です。頭皮を不潔にしていると毛根に脂がたまり、髪の毛の生育や発毛・育毛剤の吸収を妨げたりします。「洗髪すると髪の毛が抜けるから……」といって髪の毛を洗わないようにする方がいますが、正しい洗髪方法を行えば、1日に1回の洗髪が髪の毛のためにおすすめです。洗髪で抜ける毛は一般に成長が終わった毛で、少し引っ張っただけでも抜ける状態になっています。

Q. マッサージはした方がよいですか？

A. リアップX5塗布前に行うことをおすすめします。

マッサージは頭皮の血行を良くするために大切です。頭皮の血行が良くなると、血液中の髪を作るのに必要な栄養が頭皮に行きわたります。リアップX5塗布前の習慣として続けられることをおすすめします。

Q. 整髪料は使ってもよいですか？

A. リアップX5が乾いてからお使いください。

日常のヘアケア習慣を変える必要はありませんが、リアップX5の吸収を妨げないために、リアップX5の塗布後、乾いてから整髪料をお使いください。

お困りのことがあったら

本剤をご使用になられて、好ましくない症状があらわれるなど、何かお気づきの点や不安な点がございましたら、お買い求めのお店又は下記にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

連絡先

大正製薬株式会社 お客様119番室

〒170-8633 東京都豊島区高田3丁目24番1号

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00（土、日、祝日を除く）

◆本品の詳しい情報やヘアケアに関するお役立ち情報は
「リアップホームページ」へ…



<http://www.taisho.co.jp/riup/>

RiUP
X5

この説明書は
必要なときに
読めるよう、
大切に保管
してください。

◆ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
◆本剤の使用により好ましくない症状があらわれた場合には、
直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

お客様119番室／電話 03-3985-1800