

この部分を
引き上げてください。

16枚入 品番RF16

販売名 ロイヒフェルビ温

特長

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

- ロイヒフェルビ温®は、非ステロイド系の鎮痛消炎成分フェルビナクを1枚あたり35mg配合したテープ剤です。
- フェルビナクは痛みの関連物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効果をあらわします。
- こわい温感タイプです。

- 無臭タイプで、人前でも臭いが気になりません。
- 貼りやすいウイングセパレーターを採用しています。セパレーターを中央を開くと翼のように広がり、セパレーターを左右にはがす際の取っ手になります。ひとりでも貼りやすい形状です。
- 基布が伸縮性にすぐれているので、肌によくフィットします。

▲使用上の注意

ⓧしてはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) かぶれによるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことのある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、キズうち。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚に	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、水疱等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリする場合がありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してからご使用ください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部にお貼りください。

■用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいた後や皮膚がぬれている場合は、よく拭き取ってからお貼りください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、同じところを続けて貼らないでください。
- (6) 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

成分・分量

成分・分量(膏体100g中:ただし膏体質量は1g/1枚)
フェルビナク…3.5g

添加物として、流動パラフィン、ステレン・イソブレン・ステレンブロッグ重合体、テルペン樹脂、ジブチルヒドロキシトルエン、香料(ノニル酸ワニリアミド)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため未使用分は元の袋に入れて、開封口をきちんときちり曲げて保管してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装 7cm×10cm…16枚

個箱

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店、又は下記にお願いいたします。

ニチバン株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-377218
受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先:

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎ 0120-149931

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

NB14A03

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

http://www.nichiban.co.jp/

日本製 MADE IN JAPAN ®は登録商標です。