

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。



かきむしり 乾燥肌の治療薬

ヘパソフト

第2類医薬品

乾燥性皮ふ治療薬

販売名:
メンソレータム
ヘパソフトクリーム

かきむしりたくなる かゆい乾燥肌に効く

年齢による皮脂分泌の減少や、乾燥により皮ふのバリア機能が低下した乾燥性皮ふでは、気温の変化や衣服の摩擦など少しの外部刺激でもかゆみを引き起こしやすくなります。

このようなかけばかくほどかゆくなる「かきむしり乾燥肌」には、

かき跡を修復しながらかゆい乾燥肌に効く、「メンソレータム ヘパソフトクリーム」をお使いください。

かきむしる
前に

「メンソレータム ヘパソフトクリーム」の優れた効果


～かき跡を修復しながら、がまんできないかゆい乾燥肌に効いていきます～

ジフェンヒドラミン

かゆみの原因に作用し、がまんできないその場のかゆみを止める。

ヘパリン類似物質

肌(角質層)の天然保湿因子を増加させるとともに角質に潤いを与え、乾燥によるダメージを整えます。



尿素無配合

無着色・無香料

非ステロイド

乾燥性皮ふは体が温まるとかゆみが起きやすくなります。特に体が温まる以下の
ような場面では「メンソレータム ヘパソフトクリーム」のご使用がおすすめです。



お風呂上がり



就寝時



暖房の季節

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないでください。

1. 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
2. わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)
3. アトピー性皮ふ炎の人
(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要がある)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人
- (4) 医師からアトピー性皮ふ炎と診断されたことのある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮ふ(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮ふ)

用法・用量

1日1~数回、適量を患部に塗布してください。

[用法・用量に関する注意]

- (1) 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量	ヘパリン類似物質……………0.3%
	ジフェンヒドラミン……………1%
	添加物として、流動パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、セタノール、グリセリン、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、トリエタノールアミン、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、エデト酸Na、パラベンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401345501