

\* \* 2013年 1 月改訂(住所変更に伴う改訂)

\* 2012年 8 月改訂(事務連絡に伴う改訂)

第②類  
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

## 便秘薬 センナダイオウ錠シンワ

生薬そのまま、自然なお通じが得られます。

### ⚠【使用上の注意】



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
3. 大量に服用しないで下さい。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- \* 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【成分・分量】6錠中

「日局」セ ン ナ 末……………900mg      「日局」ダイオウ末……………450mg  
なお、添加物としてステアリン酸Mg、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、セルロースを含みます。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがあります。これはセンナ及びダイオウの成分によるものであり、異常ではありません。

**【効能・効果】** 便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

**【用法・用量】** 朝夕の空腹時に服用して下さい。

ただし、便秘の症状には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量するようにして下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1～3錠	2回
15歳未満	服用しないで下さい	

※用法・用量を厳守して下さい。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

**\*\*【お問い合わせ先】** 伸和製薬株式会社 情報管理室  
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号  
電 話：03 (3807) 3780  
受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



**\*\*発売元** **伸和製薬株式会社**  
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574番地