

販売名：セバホルンZⅢ

**成分** 本品1日量1本(100mL)中

チアミン硝化物(ビタミンB<sub>1</sub>).....10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)・3mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>).....5mg

ニコチン酸アミド.....12mg

無水カフェイン.....50mg

タウリン(アミノエチルスルホン酸)・・・2,000mg

ニンジンエキス(ニンジン1,443mgに相当)・130mg

オウギエキス(オウギ720mgに相当)・・・120mg

ローヤルゼリー.....100mg

添加物として、安息香酸Na、エデト酸Ca/2Na、香料、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、白糖、DL-リンゴ酸、カラメルを含有する。

<成分に関連する注意>本剤に含まれるリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

**効能** 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

**用法・用量** 成人(15才以上)1日1回 1本(100mL)を服用。15才未満は服用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>

生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**

奈良県御所市西寺田50

副作用被害救済制度の問合せ先

☎ 0120-149-931

## 滋養強壯剤

# 人蔘ドリンク セバホルン<sup>®</sup>ZⅢ

タウリン2000mg ローヤルゼリー



第3類医薬品

### 使用上の注意

#### 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

ホームページ

www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎ (03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **クラシエ薬品株式会社** 東京都港区海岸3-20-20

使用期限

製造番号

®登録商標

OH03-U

18180

