

服用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。裏面の用法・用量に関する注意をよく読んでください。

かんで服用、いちご風味のビタミン剤

パパゼリー5

第Ⅱ類医薬品

ビタミン含有保健剤

パパゼリー5は、ビタミンA、B6、C、D2、Eとバントテン酸カルシウムを配合したかんで簡単に服用していただけるいちご風味の甘いゼリー状ビタミン剤です。お子さまが、かぜなどの発熱や下痢などでぐったりしているときや、食事が進まないときなどの栄養補給に適しています。偏食が気になる育ちざかりのお子さま、虚弱体質の方にもおすすめします。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります。]
次の人服用しないでください。

●本剤は、乳児（1歳未満）に服用させないでください。



相談すること

1.次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊娠3ヶ月以内の妊娠、妊娠していると思われる人、又は妊娠を希望する人。（妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊娠から生まれた児に、先天異常の割合が上昇したとの報告があります。）

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、下痢

3.1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能・効果]

幼小児の発育期・偏食児・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

[用法・用量]

次の量を隨時服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2粒	1回
小児（1歳～14歳）	1粒	1回
1歳未満	服用しないこと	

[用法・用量についての注意]

- (1) 乳児（1歳未満）に服用させないでください。
- (2) 必ずかんで服用してください。
- (3) 定められた用法・用量をお守りください。
- (4) 幼児（1歳～6歳）に服用させる場合には、のどにつかえることのないようよく注意してください。
- (5) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分・分量]

成 分	1日量（2粒中）
ビタミンA油	4mg
ビタミンD ₂	0.01mg
ビタミンE酢酸エステル	5mg
ビタミンB ₆	1mg
ビタミンC	40mg
パントテン酸カルシウム	6mg

添加物として、水アメ、白糖、カンテン、ベクチン、赤色106号、香料、その他2成分を含有する。

[保管及び取扱上の注意]

- (1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限（紙箱又は容器の底に記載しています）の過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 本剤はゼリータイプのため、保管状況によっては変色やひび割れが発生することがあります
が、医薬品の本質には問題ありませんので、そのまま服用ください。

[問い合わせ先] 大木製薬株式会社

☎ 03-3256-5051「お客様相談室」まで。
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

019803