

Compound Iodine Glycerin
50mL複方ヨードグリセリン
日本薬局方

販売元: 日本薬局方

第2類医薬品

d
P

* 使用上の注意のつづき

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮、 ふ	発疹、 発赤、 かゆみ
口	あれ、 しみる、 炎熱感、 刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(成分分量) 100mL中
ヨウ素 1.2g、液状エフェノール 0.5mL、グリセリン 90mL含有
添加物: ヨウ化カリウム、ハッカ水

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/konkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



使用期限

販売登録

P

第2類医薬品

咽喉塗布剤

日本薬局方

複方ヨード・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

50mL

ご使用に際して、外箱の説明文をごお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

□ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。
(5) 口内又はのどのひどいいたれのある人。
(6) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
(7) 患部が広範囲の人。

*以下右側面へ

⑥

製造番号
使用期限

健栄製薬株式会社
大都市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

2405 001

CV-9 1208