

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

肌を治すチカラ
muhi

お肌にしみにいかゆみ止め
液体ムヒベビー®
かゆみ・虫さされ・あせもに

鎮痒消炎剤

販売名：液体ムヒベビー

液体ムヒベビーは、お子さまのお肌の性質とかゆみの特徴にあわせて開発された、すばやい効き目とお肌へのやさしさをあわせもつ、液体タイプのかゆみ止めです。

お子さまのお肌のかゆみを科学した3つの特長

虫さされにすばやい効き目

- お子さまのお肌は大人に比べて抵抗力が弱く、虫さされやちょっとした刺激などに敏感に反応し、かゆみを起こします。液体ムヒベビーは、2%かゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩）と液体ならではの高い浸透力で、すばやくしっかりかゆみを止めます。
- 水分の蒸発による自然でさわやかな清涼感が得られます。

かいてしまったお肌をケア

- かゆみを我慢できないお子さまは、患部をかきむしって症状を悪化させてしまいがちです。液体ムヒベビーは、パンテノール（プロピタミンB₅）が、お肌の正常なはたらきを助けることで、かきこわしなどによる症状の悪化を防ぎます。

敏感お肌におすすめ

- お肌にしみにい処方です。
液体ムヒベビーには、お子さまが苦手なスーツとする成分（アルコールやメントール）を配合していません。刺激感が少なくお肌にしみにい処方ですので、敏感なお肌のお子さまにもお使いいただけます。
- お肌にやさしい弱酸性です。
お子さまのお肌は、大人に比べて雑菌の繁殖や侵入を防ぐ弱酸性の皮脂膜の形成が充分ではありません。液体ムヒベビーは健康なお肌と同じ弱酸性の製剤ですので、お子さまのお肌の弱酸性の皮脂膜による防御機能を損なうことなく、すこやかな状態に保ちます。
- 無香料・無着色です。

本剤にステロイド成分は配合されていません

お子さまだけでなく、お肌の敏感な方や、外出時に薬のにおいが気になる方にも適したかゆみ止めです。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ


3. 5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能 かゆみ、虫さされ、あせも、かぶれ、しっしん、じんましん、皮ふ炎、しもやけ、ただれ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。


容器の使用方法

①



塗布部を患部に数回ゆっくり押し当て、ラバーに薬液を充分しみ込ませてください。(薬液が出にくい場合は、手の甲など肌の固いところに押し当ててください。)

②



薬液がラバーに充分しみ込んだことを確認した後、患部に塗布してください。

●同じ部位に他の軟膏・クリーム剤を併用するとラバーを傷めることがあります。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3カ月以上です。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき 有効成分(100g中)

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	かゆみを止めます。
パンテノール(プロビタミンB ₅)	1.0 g	お肌の正常なはたらきを助けます。

添加物としてリン酸二水素Na、ベンゼトニウム塩化物、ヒドロキシエチルセルロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)液もれを防ぐためキャップをしっかりと閉めてください。

お手当てのポイント

- かきこわす前の早めの治療が効果的です。
- 患部が汚れている場合は、水又はぬるま湯で軽くふいて、清潔にしてから塗布してください。

お子さまが誤って液体ムヒベビーを口にしたら場合

- ①少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ②次の場合には、なるべく早く医師に診てもらってください。
 - ・大量(おおよそ5mL以上)飲み込んだとき
 - ・めまい、はきけ、倦怠感(だるさ)、呼吸異常などがあるとき

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

製造販売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標