

ご使用に際し、この説明書は必ずお読みください。  
また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

「涙に近い一滴」

目のかわき・目の疲れ・コンタクトレンズの不快感に



# 眼涼潤<sup>®</sup>

がんりょうじゅん

13mL 目薬

パソコン等を長時間使用する事により、まばたきの回数が減ってしまうと瞳を守る重要な涙も減少し、ドライアイ(目のかわき)症状、コンタクトレンズの不快感、目の疲れを引き起こしてしまいます。

「眼涼潤」は、そのような涙不足の瞳に潤いを補給し、目のかわき、目の疲れ、コンタクトレンズ装着時の目の不快感を改善します。

## 【特長】

○ヒトの涙に近づけた目薬です。

- ①ナトリウム、カリウム、マグネシウム等の涙のミネラル成分をバランスよく配合しヒトの涙に近づけました。
- ②角膜の機能や透明性を保つ上で大切なカルシウムを配合しています。
- ③pH、浸透圧比をヒトの涙に近づけています。

○涙のようにさらりとし、刺激も少なく、角膜の表面をおおっている涙液層を安定させ、コンタクトレンズを取り外した後やドライアイ(目のかわき)気味の瞳にもやさしいさし心地です。

○アミノ酸類のL-アスパラギン酸カリウムとブドウ糖が、目の酸素補給や栄養補給に寄与し、疲れた目の働きを活発にします。

○どのタイプ(ハード、ソフト、使い捨て、O<sub>2</sub>)のコンタクトレンズにも対応します。

## [使用上の注意]



### 相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
  - (4) 次の診断を受けた人：緑内障。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 目のかすみが改善されない場合。
  - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

## 【効能・効果】

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 【用法·用量】



1日3~6回、1回2~3滴点眼してください。

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - (2) 容器の先をまぶた、まつ毛などに触れさせないでください(目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
  - (3) 点眼用にのみ使用してください。

## ・〈点眼剤の使い方〉

1. 使用する前に手をきれいに洗ってください。  

2. 下まぶたを押し下げ、真上から2~3滴点眼してください。その時、容器の先端がまぶたをやまつ毛に触れないようにご使用ください。ご使用後も、容器の先端・キャップは清潔に取扱ってください。  

3. 点眼後、目を閉じて2~3回まばたきをし、液を目全体にいきわたらせてください。ご使用後は、容器のキャップをきちんとしめて保管してください。  


### 【成分·分量】

有効成分	含有量(1mL中)	はたらき
L-アスパラギン酸カリウム	1.2mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
塩化カリウム	1.27mg	目や角膜に栄養や酸素を運ぶ大切な役割をする涙のミネラル分をこれらの塩類が供給します。ヒトの涙に近似したミネラルバランスが目にうるおいを与え、目の疲れを軽減します。
塩化カルシウム水和物	0.15mg	
塩化ナトリウム	7.33mg	
硫酸マグネシウム水和物	0.1mg	
リン酸水素ナトリウム水和物	2.73mg	
ブドウ糖	0.05mg	涙にも含まれるブドウ糖が目に栄養とうるおいを与え、目の疲れを癒します。

添加物としてエデト酸ナトリウム水和物、乾燥炭酸ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物液を含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
  - (4) 他の人と共用しないでください。
  - (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、できるだけ速やかに使用してください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地  
<http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室： 0120-133250  
受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481