

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときすぐに読めるように大切に保管してください。

血清高コレステロール改善薬 血中の余分な脂質をとる **コレストン**[®]

第3類医薬品

高コレステロールは、自覚症状がなく、自分では気づきにくい症状です。本商品の服用後は定期的に医療機関でコレステロール値の測定をすることをお勧めします。

商品特長

- 『コレストン』は、血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和する医薬品です。
 - 大豆由来成分の「大豆油不けん化物」が腸管からの余分なコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促します。
 - パンテチンは、肝臓におけるコレステロールの代謝を改善します。LDL(悪玉)コレステロールの分解を促し、またHDL(善玉)コレステロールを増加させ、血液中の余分なコレステロールをとり、血管壁への沈着を抑えます。
 - 天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)は過酸化脂質の生成を抑え、血流をスムーズにし、末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和します。
- 『コレストン』はこれら3つの有効成分の力により効果を発揮します。

⚠【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

下痢、軟便
4. 1ヶ月位服用しても症状・コレステロール値の改善がみられない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をしてください。)
5. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。

出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

血清高コレステロールの改善、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

用法・用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

成分・分量

成人1日量(6カプセル)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量 (6カプセル中)
パンテチン	375mg
大豆油不けん化物	600mg
酢酸d- α -トコフェロール	100mg

添加物として、サフラワー油、ポリソルベート80、グリセリン、酸化チタン、サンセッティエローFCF、ゼラチン、D-ソルビトールを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
また、服用のつど瓶のフタをしっかり閉めてください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

本商品についてのお問い合わせは、
お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室 : ☎ 0120-133250
受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:50(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **東海カプセル株式会社** 〒419-0202 静岡県富士市久沢168番地