

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

01

□腔内消炎薬

第3類医薬品

のどの痛み・はれに 不快感に  
ジェルタイプの のどスプレー

## ルル®のどスプレー

### ルルのどスプレーの特徴

のどの痛みやはれの原因は炎症です。ルルのどスプレーはジェルタイプなので抗炎症成分が患部に留まり炎症に効果を発揮します。

ルルのどスプレーの3つのポイント

- 抗炎症成分水溶性アズレンが、のどの炎症をしずめ、痛み・はれをおさえます。
- ジェルタイプの液剤が患部に留まり効果を発揮します。
- すっきり、さわやかなメントール味。



### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 次の症状のある人  
□内のひどいだけ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・  
のどの不快感・のどのあれ・声がれ、  
□内炎

## ■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布して下さい。

キャップをはずし、ノズルを患部に向けて噴射して下さい。

なお、初回使用時は、薬液が出るまで4～5回押して下さい。



### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、声を出しながら噴射して下さい。
2. 使用中、ノズルが口内にふれないようにして下さい。
3. 用法・用量を厳守して下さい。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
5. 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受けて下さい。

## ■ 成分・分量 (100g中)

成 分	分 量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	20mg	粘膜に直接作用し 炎症をしずめ、 痛み・はれなどの 症状を改善します。

添加物：L-メントール、ベンゼトニウム塩化物、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、ステビア抽出物、塩化Na、pH調節剤

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
5. 衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ルルについて詳しくは [www.lulu.jp](http://www.lulu.jp)

01 登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>