

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

ハイオールCプラス

第3類医薬品

L-システイン製剤 代謝を助けるアミノ酸 L-システイン配合

L-システインとは・・・

タンパク質を構成するアミノ酸の一つです。皮膚や肝臓に多く存在し、さまざまな代謝に関与することで、体の健康に大切な働きをしています。

●肌の代謝(ターンオーバー)を助け、シミ・そばかすを治します。

ハイオールCプラスは

- 肌の代謝を助け、過剰にできたメラニンをスムーズに排出
- シミの原因となる過剰なメラニンの生成を抑制

- 肌に沈着してしまった黒色メラニンを無色化
することで、シミ・そばかすを治します。

●体の代謝(エネルギー産生)を助け、全身倦怠(疲れ・だるさ)を改善します。
何らかの原因で体の代謝が滞ると、エネルギーが効率よく産生できず、疲れやだるさを感じるようになります。

ハイオールCプラスは、栄養素をエネルギーに変換する酵素の働きを助け、体内エネルギーの産生をスムーズにすることで疲れやだるさを取り除きます。

●二日酔の原因物質の分解を助け、症状を改善します。

二日酔の原因是、アルコールを代謝する過程で生成されるアセトアルデヒドという物質です。ハイオールCプラスは、アセトアルデヒドの分解を助け、二日酔の症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛



② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

③ しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

功能・效果

- しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
 - 全身倦怠
 - 二日酔
 - にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすり避け

用法·用量

次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	7才~14才	7才未満
1回量	2錠	1錠	×服用しないこと

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
 - (2)食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
 - (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモコシテンブン、フルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロビレングリコール

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に瓶の
フタをよくしめて保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因に
なったり品質が変わることがあります。)

(4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣に
ムラができるたり、変色したりすることがあります。

(5)瓶の中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので取り除いてください。

(6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元
エスエス製薬株式会社
〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>