



患者用服薬注意書

ニンラーロを服用される患者さんへ

● ニンラーロはいつのむ？

ニンラーロは、レブラミド(レナリドミド)、レナデックス(デキサメタゾン)と併用して服用します。
4週間(28日間)を1サイクルとし、

- ニンラーロは毎回**1カプセル**ずつ、**1、8、15日目**に、
- レブラミド(レナリドミド)は、**1~21日目**に、
- レナデックス(デキサメタゾン)は、**1、8、15、22日目**に、

それぞれ服用します。

ニンラーロ、レブラミド(レナリドミド)、レナデックス(デキサメタゾン)の基本的な服用スケジュール

	1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ニンラーロ 1カプセル	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レブラミド (レナリドミド)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
レナデックス (デキサメタゾン)	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-

※身体の状態によって、服用スケジュールが変更されることがありますので、医師の指示にしたがってください。


○: おくすりをのむ日

● ニンラーロはどうやってのむ？

ニンラーロは、食事の前後(食事前の1時間、食事後の2時間)を避け、空腹時に服用してください。
カプセルを開けたり、噛んだり、つぶしたりせず、そのまま水で飲みこんでください。

●のみ忘れたらどうする？

ニンラーロをのみ忘れた場合、次の服用予定まで3日間(72時間以上)時間があれば、1回分をのんでください。
3日間(72時間未満)であれば、すぐにはのまずに、次の服用予定日に1回分をのんでください。



●のみ日を間違えたら？

のみ忘れ以外で、指定された日以外にのんでしまった場合は、ただちに医師または薬剤師にご相談ください。
(例:28日サイクルの1、2、3日にのんだときなど)

数量が少なくなりましたら
記載されている資材No.(1-5-6162)を
弊社MRにご連絡ください。



武田薬品工業株式会社