

## セフォチアム塩酸塩の「使用上の注意」の改訂について

成分名 該当商品名	成分名	該当商品名（承認取得者）
効能・効果	セフォチアム塩酸塩	パンスポリン静注用 0.25g、同静注用 0.5g、同静注用 1g、同静注用 1g バッグ S、同静注用 1g バッグ G、同筋注用 0.25g（武田薬品工業株式会社）、ハロスポア静注用 0.25g、同静注用 0.5g、同静注用 1g（富山化学工業株式会社）他
改訂の概要	適応菌種 セフォチアムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア・レットゲリ、インフルエンザ菌 適応症 敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎	「重大な副作用」の「顆粒球減少、汎血球減少、溶血性貧血、無顆粒球症」の項に「血小板減少」を追記する。
改訂の理由及び調査の結果	国内症例が集積したことから、専門委員の意見も踏まえた調査の結果、改訂することが適切と判断した。	
直近 3 年度の国内副作用症例の集積状況 【転帰死亡症例】	血小板減少関連症例 2 例 （うち、因果関係が否定できない症例 0 例） 【死亡 0 例】	