

統合失調症治療剤ゼプリオン®水懸筋注シリンジを 使用する患者さんにご家族の方へ

ゼプリオン®水懸筋注シリンジの使用後に、体に異常を感じたら、すぐに医療機関を受診してください。

ご家族など身近な人は、患者さんの状態の変化について注意して、もし体に異常が見られたら医療機関へ受診するよう勧めてください。

2013年11月19日の販売開始以降、現在までに、ゼプリオン®水懸筋注シリンジを使用後に死亡した症例が報告されております。現時点では、この薬が原因で死亡したかどうかはわかりません。ご心配な点がございましたら主治医にご相談ください。

- この薬は、投与後の効果が4週間持続します。効果が持続している間は常に副作用が起こる可能性があります。体に異常を感じたら、すぐに医療機関を受診し、この薬を使用していることを医師に伝えてください。

患者向医薬品ガイド

ゼプリオン®水懸筋注に関する患者さんやご家族の方向けとして「患者向医薬品ガイド」が下記に掲載されております。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器総合機構ホームページ」
URL: <http://www.info.pmda.go.jp/>
患者向医薬品ガイド (http://www.info.pmda.go.jp/guide_ippan/guide.html)

ヤンセンファーマ株式会社
メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル: 0120-23-6299
受付時間: 9:00~17:40 (土・日・祝日・会社休日を除く)