

【医薬品名】 オフロキサシン（経口剤）
メシル酸ガレノキサシン水和物
シプロフロキサシン
トスフロキサシントシル酸塩水和物（経口剤）
（小児の用法・用量を有する製剤）
パズフロキサシンメシル酸塩
モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）
レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）
塩酸ロメフロキサシン（経口剤）

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

[慎重投与] の項に

「大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者」

を追記し、[重要な基本的注意] の項に

「大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うとともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリスク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。」

を追記し、[副作用] の「重大な副作用」の項に

「大動脈瘤、大動脈解離：
大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。」

を追記する。

（注）パズフロキサシンメシル酸塩に関して、患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。