

**2025年3月改訂（第3版）

*2024年5月改訂

日本標準商品分類番号

872325

貯法：室温保存

有効期間：3年

H₂受容体拮抗剤

処方箋医薬品^注

日本薬局方 ファモチジン注射液

ファモチジン静注10mg「杏林」

ファモチジン静注20mg「杏林」

FAMOTIDINE Intravenous Solution

	10mg	20mg
承認番号	22600AMX00059000	22600AMX00058000
販売開始	2011年11月	2005年7月

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ファモチジン静注 10mg「杏林」	ファモチジン静注 20mg「杏林」
1管容量	10ml	20ml
有効成分	日局ファモチジン 10mg	日局ファモチジン 20mg
添加剤	エドト酸ナトリウム水和物 ……………2mg 酢酸、リン酸、等張化剤、 pH調整剤	エドト酸ナトリウム水和物 ……………4mg 酢酸、リン酸、等張化剤、 pH調整剤

3.2 製剤の性状

販売名	ファモチジン静注 10mg「杏林」	ファモチジン静注 20mg「杏林」
剤形	水性注射剤	
性状	無色～淡黄色澄明	
pH	6.2～6.8	
浸透圧比	0.9～1.1 (生理食塩液に対する比)	

4. 効能又は効果

○上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）

○Zollinger-Ellison症候群

○侵襲ストレス（手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷）による上部消化管出血の抑制

○麻酔前投薬

5. 効能又は効果に関連する注意

〈侵襲ストレスによる上部消化管出血の抑制〉

手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷により、ストレス潰瘍が発症する可能性が考えられる場合に限り使用すること。なお、広範囲熱傷はBurn Index10以上の熱傷を目安とすること。

6. 用法及び用量

〈上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス（手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷）による上部消化管出血の抑制〉

通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを1日2回（12時間毎）緩徐に静脈内投与する。又は輸液に混合して点滴静注する。なお、年齢・症状により適宜増減する。上部消化管出血及びZollinger-Ellison症候群では、一般的に1週間以内に効果の発現をみる。内服可能となった後は経口投与に切りかえる。侵襲ストレス（手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷）による上部消化管出血の抑制では、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間（手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度）の投与とする。

〈麻酔前投薬〉

通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを麻酔導入1時間前に緩徐に静脈内投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 腎機能低下患者への投与法

ファモチジンは主として腎臓から未変化体で排泄される。腎機能低下患者にファモチジンを投与すると、腎機能の低下とともに血中未変化体濃度が上昇し、尿中排泄が減少するので、次のような投与法を目安とする¹⁾。[9.2参照]

1回20mg1日2回投与を基準とする場合

クレアチニンクリアランス (mL/min)	投与法
Ccr≥60	1回20mg 1日2回
60>Ccr>30	1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回
30≥Ccr	1回10mg 2日に1回 1回5mg 1日1回
透析患者	1回10mg 透析後1回 1回5mg 1日1回

8. 重要な基本的注意

8.1 治療にあたっては経過を十分に観察し、病状に応じ治療上必要最小限の使用（手術侵襲ストレスは3日間程度、その他は7日間程度）にとどめ、本剤で効果がみられない場合には他の療法に切りかえること。なお、血液像、肝機能、腎機能等に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 心疾患のある患者

心血管系の副作用を起こすおそれがある。[11.1.6参照]

9.1.2 薬物過敏症の既往歴のある患者

9.2 腎機能障害患者

血中濃度が持続するので、投与量を減ずるか投与間隔をあけて使用すること。[7.1、11.1.7参照]

9.3 肝機能障害患者

症状が悪化するおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。母乳中に移行することが報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

本剤を減量するか投与間隔を延長するなど慎重に投与すること。本剤は主として腎臓から排泄されるが、高齢者では、腎機能が低下していることが多いため血中濃度が持続するおそれがある。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アゾール系抗真菌薬 イトラコナゾール	左記の薬剤の血中濃度が低下する。	本剤の胃酸分泌抑制作用が左記薬剤の経口吸収を低下させる ^{2)、3)} 。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（各0.1%未満）

ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫〈顔面浮腫、咽頭浮腫等〉、蕁麻疹等）があらわれることがある。

11.1.2 再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、溶血性貧血（いずれも頻度不明）、血小板減少（0.1%未満）

再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、溶血性貧血、血小板減少（初期症状として全身倦怠感、脱力、皮下・粘膜下出血、発熱等）があらわれることがあるので、定期的に血液検査を実施し、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.3 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（いずれも頻度不明）

11.1.4 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

AST・ALT等の上昇、黄疸があらわれることがある。

11.1.5 横紋筋融解症（頻度不明）

高カリウム血症、ミオグロビン尿、血清逸脱酵素の著明な上昇、筋肉痛等が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.6 QT延長、心室頻拍（Torsades de Pointesを含む）、心室細動（いずれも頻度不明）

特に心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）を有する患者においてあらわれやすいので、投与後の患者の状態に十分注意すること。[9.1.1参照]

11.1.7 意識障害、痙攣（いずれも頻度不明）

意識障害、全身痙攣（痙直性、間代性、ミオクローヌス性）があらわれることがある。特に腎機能障害を有する患者においてあらわれやすいので、注意すること。[9.2参照]

11.1.8 間質性腎炎、急性腎障害（いずれも頻度不明）

初期症状として発熱、皮疹、腎機能検査値異常（BUN・クレアチニン上昇等）等が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.9 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.10 不全収縮

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症		発疹・皮疹、蕁麻疹（紅斑）、顔面浮腫	
血液	白血球減少	好酸球増多	
消化器	便秘	下痢・軟便、口渇、悪心・嘔吐、腹部膨満感、食欲不振、口内炎	
循環器		血圧上昇、顔面潮紅、耳鳴	徐脈、頻脈、房室ブロック
肝臓	AST上昇、ALT上昇、A1-P上昇	総ビリルビン上昇、LDH上昇	肝機能異常、黄疸
精神神経系		全身倦怠感、無気力感、頭痛、眠気、不眠	可逆性の錯乱状態、うつ状態、痙攣、意識障害
内分泌系		月経不順、女性化乳房	

発現頻度は、承認時までの臨床試験及び使用成績調査結果に基づいている。

14. 適用上の注意

**14.1 薬剤調製時の注意

インジケーター（酸素検知剤：ピンク色の錠剤）及び脱酸素剤は品質保持を目的に封入しているため、薬液に溶解しないこと。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

本剤の投与が胃癌による症状を隠蔽することがあるので、悪性でないことを確認のうえ投与すること。

16. 薬物動態

16.4 代謝

ヒトにファモチジン投与したときの尿中の代謝物は、S-oxide体のみであり、投与量に対するS-oxide体の割合は静脈内投与で2～8%である⁴⁾。

16.5 排泄

ファモチジン投与後24時間までの未変化体の尿中排泄率は、静脈内投与で71.5～72.3%である⁴⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

ファモチジン20mg静脈内投与したときのパラメータ¹⁾

平均Ccr値 (mL/min/1.48m ²)	t _{1/2β} (h)	AUC (ng・h/mL)	Ctot (mL/min)
98.9 n=7	2.59	857	412
73.8 n=9	2.92	909	381
49.2 n=5	4.72	1424	242
10.3 n=10	12.07	4503	84

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈上部消化管出血〉

17.1.1 国内臨床試験

静脈内投与による一般臨床試験（57例）、用量検討試験（103例）及び二重盲検比較試験（59例）、計219例の概要は次のとおりである^{5)～8)}。

上部消化管出血	<p>止血効果： 静脈内投与による止血効果は91.2%（165/181）を示し、二重盲検比較試験によって本剤の有用性が認められた。用量検討試験及び二重盲検比較試験における1回20mg、1日2回静脈内投与での止血効果は91.0%（91/100）で、投与36時間以内の止血率は66.0%（66/100）、3日以内の止血率は84.0%（84/100）であった。</p> <p>止血維持効果： 静脈内投与での止血後経口投与（1回20mg1日2回）による止血維持効果は良好であった。</p>
---------	--

〈侵襲ストレス（手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷）による上部消化管出血の抑制〉

17.1.2 国内臨床試験

静脈内投与による一般臨床試験（85例）、用量検討試験（189例）及び二重盲検比較試験（209例）、計483例の概要は次のとおりである^{9)～16)}。

侵襲ストレスによる上部消化管出血の抑制	手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・臓器不全・熱傷の侵襲ストレスによる胃酸分泌の亢進を抑制することを目的とした臨床試験における1回20mg、1日2回静脈内投与での有効率は77.4%（250/323）を示し、二重盲検比較試験によって本剤の有用性が認められた。
---------------------	--

〈麻酔前投薬〉

17.1.3 国内臨床試験

静脈内投与による非盲検比較試験81例の概要は次のとおりである¹⁷⁾。

麻酔前投薬	麻酔時における誤嚥性肺炎の防止を目的とした臨床試験において、本剤は1回20mg、静脈内投与において、有意に胃液量を減少させ、胃液pHを上昇させた。その有効性は89.2%（66/74）であった。
-------	--

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ファモチジンはヒスタミンH₂受容体遮断薬である。H₂受容体は胃酸分泌に中心的な役割を果たしているため、これを遮断することにより、強力な胃酸分泌抑制作用をあらわす¹⁸⁾。

18.2 ヒトでの作用

18.2.1 胃酸及びペプシン分泌抑制作用

(1) 基礎及び各種刺激分泌

健康成人又は消化性潰瘍患者における、基礎及び各種刺激剤投与時の2時間胃酸及びペプシン分泌量は、20mg経口投与によりそれぞれ71.6～99.6%、29.5～96.9%抑制される。

	胃酸分泌抑制率(%)	ペプシン分泌抑制率(%)
基礎分泌 ¹⁹⁾	98.0	71.0
テトラガストリン (4μg/kg、筋注) 刺激分泌 ²⁰⁾	94.7	75.1
ベタゾール (1mg/kg、筋注) 刺激分泌 ²⁰⁾	99.6	96.9
インスリン (0.2IU/kg、静注) 刺激分泌 ²¹⁾	71.6	29.5

また、20mg静脈内投与で基礎分泌、テトラガストリン、ベタゾール刺激分泌を抑制する^{22)、23)}。

(2) 夜間分泌

健康成人又は消化性潰瘍患者の午後11時から午前6時までの7時間胃酸及びペプシン分泌量は、20mg経口投与によりそれぞれ91.8%、71.8%抑制される²⁴⁾。

(3) 24時間分泌・胃内pH

健康成人の胃酸分泌量は、20mg経口投与により、午後8時から12時間以上にわたり抑制される。胃内pHは、投与12時間後まで4.2～6.0の範囲で推移する²⁵⁾。

(4) 血中濃度と胃酸分泌抑制作用

血中濃度と胃酸分泌抑制率との間には正の相関関係がみられ、胃酸分泌量を50%抑制するときの血中濃度は13ng/mLである²⁶⁾。

18.2.2 胃粘膜血流量に及ぼす影響

0.1～0.2mg/kgの静脈内投与では健康成人の胃粘膜血流量を増加させる傾向が認められる²⁷⁾。

18.2.3 胃粘液分泌に及ぼす影響

潰瘍患者の胃液中粘液物質濃度に影響を及ぼさない²⁸⁾。

18.2.4 胃内容排出能に及ぼす影響

胃潰瘍、十二指腸潰瘍患者に20mg経口投与した場合、胃排出能に影響を及ぼさない²⁹⁾。

18.2.5 肝血行動態に及ぼす影響

20mg静脈内投与は、健康成人の肝血流量、門脈血流量に影響を及ぼさない³⁰⁾。

18.2.6 血中ガストリン値に及ぼす影響

胃潰瘍、十二指腸潰瘍患者に20mg1日2回、1～2カ月経口投与した場合、血中ガストリン値に影響を及ぼさない³¹⁾。

18.2.7 血中プロラクチン等に及ぼす影響

20mg静脈内投与、20mg1日2回4週間経口投与は、健康成人、消化性潰瘍患者の血中プロラクチン、性腺刺激ホルモン、性ホルモン値に影響を及ぼさない³²⁾。

18.3 動物での作用

18.3.1 H₂受容体拮抗作用

*In vitro*におけるモルモット摘出心房の心拍数及びラット摘出子宮の収縮、並びにイヌ*in vivo*の胃酸分泌を指標にしたH₂受容体拮抗作用は、シメチジンに比し10～148倍強力である^{33)、34)}。

18.3.2 胃酸分泌抑制作用

イヌのヒスタミン刺激時の胃酸分泌抑制効果は、シメチジンに比し作用強度で約40倍強く、持続時間で約1.3～1.5倍長い^{35)、36)}。

また、ラットの各種侵襲ストレスにおける胃酸分泌抑制効果は、ピレンゼピン塩酸塩水和物と同等かあるいはやや強く、シメチジン、ラニチジン塩酸塩より強い³⁷⁾。

18.3.3 胃粘液分泌に及ぼす影響

ラットのストレスによる胃粘膜中糖蛋白質量の減少を有意に抑制する³⁶⁾。

18.3.4 実験潰瘍に対する作用

ラットのインドメタシン、アスピリン、プレドニゾロン、ストレス及び幽門結紮による胃潰瘍あるいはメピリゾールによる十二指腸潰瘍の発生に対してシメチジンよりも強い抑制効果を示す。また、連続投与により酢酸による胃潰瘍及びメピリゾールによる十二指腸潰瘍の治癒を促進し、効力はシメチジンより強い^{38)～40)}。

18.3.5 胃出血に対する作用

脱血及びヒスタミン投与によるラットの胃出血に対し抑制作用を示す³⁶⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：ファモチジン (Famotidine)

化学名：*N*-Aminosulfonyl-3-[[2-(diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl] propanimidamide

分子式：C₈H₁₅N₇O₂S₃

分子量：337.45

性状：白色～帯黄白色の結晶である。


酢酸(100)に溶けやすく、エタノール(95)に溶けにくく、水に極めて溶けにくい。

0.5mol/L塩酸試液に溶ける。

光によって徐々に着色する。

融点：約164℃(分解)

化学構造式：



**20. 取扱い上の注意

20.1 使用時までフィルム包装を開封しないこと。

20.2 フィルム包装開封後は速やかに使用すること。

20.3 フィルム包装が破損又は剥がれている時、インジケーター(酸素検知剤：ピンク色の錠剤)が青紫～青色に変色している時、フィルムの内面に水滴が認められる時は使用しないこと。

22. 包装

〈ファモチジン静注10mg「杏林」〉

10ml×10管 [ポリエチレン容器、脱酸素剤入り]

〈ファモチジン静注20mg「杏林」〉

20ml×10管 [ポリエチレン容器、脱酸素剤入り]

20ml×50管 [ポリエチレン容器、脱酸素剤入り]

23. 主要文献

- 1) 猪爪信夫 他：Prog. Med. 1996；16(11)：2897-2903
- 2) 二木芳人：Today's Therapy. 1994；18(2)：42-45
- 3) Lim S. G., et al.：Aliment. Pharmacol. Ther. 1993；7：317-321
- 4) Echizen H. and Ishizaki T.：Clin. Pharmacokinetics. 1991；21(3)：178-194
- 5) 城所 他：薬理と治療. 1983；11(9)：3659-3674
- 6) 三好秋馬 他：診療と新薬. 1983；20(10)：2123-2132
- 7) 小坂義種 他：薬理と治療. 1983；11(10)：4327-4335
- 8) 城所 他：薬理と治療. 1984；12(1)：333-351
- 9) 田村晃 他：新薬と臨床. 1990；39(12)：2485-2493
- 10) 川島康生 他：新薬と臨床. 1990；39(11)：2238-2248
- 11) 大塚敏文 他：薬理と治療. 1991；19(1)：339-349
- 12) 青木照明 他：医学と薬学. 1991；25(1)：233-242
- 13) 大塚敏文 他：診療と新薬. 1990；27(12)：2235-2254
- 14) 青木照明 他：医学と薬学. 1991；25(2)：499-513
- 15) 大塚敏文 他：診療と新薬. 1991；28(1)：1-12
- 16) 大塚敏文 他：診療と新薬. 1991；28(1)：13-23
- 17) 玉井直 他：臨床薬理. 1987；18(3)：553-564
- 18) 第十八改正日本薬局方解説書, 廣川書店, 2021；C4521-C4524
- 19) 大江慶治 他：内科宝函. 1983；30(11)：365-378
- 20) 大江慶治 他：内科宝函. 1984；31(1)：11-24
- 21) 渡部洋三 他：薬理と治療. 1983；11(9)：3637-3650
- 22) 三好秋馬 他：基礎と臨床. 1983；17(9)：2909-2916
- 23) 三好秋馬 他：基礎と臨床. 1983；17(9)：2917-2927
- 24) 大江慶治 他：内科宝函. 1984；31(2)：51-62

- 25) 池添逸夫 他：日本消化器病学会雑誌. 1983 ; 80(Suppl.) : 694
- 26) Miwa M., et al. : Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol. 1984 ; 22(4) : 214-217
- 27) 宮本二郎 他：薬理と治療. 1983 ; 11(9) : 3651-3658
- 28) 森治樹 他：日本臨床. 1984 ; 42(1) : 150-157
- 29) 原沢茂 他：診療と新薬. 1983 ; 20(9) : 1859-1864
- 30) 大西久仁彦 他：薬理と治療. 1983 ; 11(10) : 4301-4304
- 31) 三好秋馬 他：新薬と臨床. 1983 ; 32(9) : 1383-1395
- 32) 早川滉 他：臨床成人病. 1984 ; 14(4) : 571-577
- 33) 竹田正明 他：基礎と臨床. 1983 ; 17(9) : 2878-2882
- 34) Takeda M., et al. : Eur. J. Pharmacol. 1983 ; 91(4) : 371-376
- 35) Takagi T., et al. : Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 1982 ; 256(1) : 49-58
- 36) 竹田正明 他：基礎と臨床. 1984 ; 18(12) : 6125-6134
- 37) 西田明登 他：基礎と臨床. 1991 ; 25(1) : 223-232
- 38) Takeda M., et al. : Arzneimittel-Forschung. 1982 ; 32(7) : 734-737
- 39) 岡部進 他：応用薬理. 1984 ; 27(3) : 563-569
- 40) Ishihara Y., et al. : Digestion. 1983 ; 27(1) : 29-35

24. 文献請求先及び問い合わせ先

キョーリンリメディオ株式会社 学術部
 〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1
 TEL 0120-960189
 FAX 0120-189099

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

キョーリンリメディオ株式会社

富山県南砺市井波885番地

***26.2 販売元**


杏林製薬株式会社

東京都千代田区大手町一丁目3番7号


ポリエチレン容器の使用方法

ポリエチレン容器の使用方法


①フィルム包装を切り離して下さい。



②フィルム包装を開封口から開封し、容器を取り出して下さい。



③頭部をねじ切って下さい。



④注射筒をセットし、直接吸引することもできます。吸引しにくい場合は、容器を押して下さい。

