

* 2025年12月改訂 (第2版) D16
2023年7月改訂 (第1版)

日本標準商品分類番号
87219

貯 法：凍結を避け5℃以下に保存
有効期間：1年2ヵ月
規制区分：劇薬、処方箋医薬品^(注)

プロスタグランジンE₁ 製剤
日本薬局方 アルプロスタジル注射液

リプル[®]注5 μ g
リプル[®]注10 μ g
Liple[®] INJECTION

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

	注5 μ g	注10 μ g
承認番号	21300AMZ00689	21300AMZ00690
販売開始	1988年11月	1988年11月

1. 警告

〈動脈管依存性先天性心疾患〉
本剤投与により無呼吸発作が発現することがあるので、呼吸管理設備の整っている施設で投与すること。
[9.7.1、11.1.9参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 重篤な心不全の患者[8.2、9.1.1、11.1.3参照]
- 2.2 出血(頭蓋内出血、消化管出血、喀血等)している患者[9.1.5、11.1.6参照]
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5参照]
- 2.4 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名		リプル注5 μ g	リプル注10 μ g
有効成分 (1管中)	日局 アルプロスタジル	5 μ g	10 μ g
添加剤 (1管中)	精製ダイズ油	100mg	200mg
	高度精製卵黄レシチン	18mg	36mg
	オレイン酸	2.4mg	4.8mg
	濃グリセリン	22.1mg	44.2mg
1管中の容量		1mL	2mL

3.2 製剤の性状

販売名	リプル注5 μ g	リプル注10 μ g
性状・剤形	白色・僅かに粘性がある・特異なおいがある・乳濁液	
pH	4.5～6.0	
浸透圧比	約1(生理食塩液に対する比)	

4. 効能又は効果

- 慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善
- 下記疾患における皮膚潰瘍の改善
進行性全身性硬化症
全身性エリテマトーデス
- 糖尿病における皮膚潰瘍の改善
- 振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善
ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復
- 動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存
- 経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善

6. 用法及び用量

効能又は効果	用法及び用量
慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)	通常、成人1日1回1～2mL(アルプロスタジルとして5～10 μ g)をそのまま又は輸液に混和して緩徐に静注、又は点滴静注する。なお、症状により適宜増減する。
進行性全身性硬化症 全身性エリテマトーデス	
糖尿病における皮膚潰瘍	
振動病	
動脈管依存性先天性心疾患	輸液に混和し、開始時アルプロスタジル5ng/kg/minとして持続静注し、その後は症状に応じて適宜増減して有効最小量とする。
経上腸間膜動脈性門脈造影	通常、成人には1回1mL(アルプロスタジルとして5 μ g)を生理食塩液で10mLに希釈し、造影剤注入30秒前に3～5秒間で経カテーテル的に上腸間膜動脈内に投与する。

8. 重要な基本的注意

〈慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、振動病、糖尿病における皮膚潰瘍〉

8.1 本剤による治療は対症療法であり、投与中止後再燃することがあるので注意すること。

8.2 心不全、肺水腫、胸水があらわれることがあるので、循環状態(血圧、脈拍等)を十分に観察すること。特に高齢者は心機能等生理機能が低下しているため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。[2.1、9.1.1、9.8、11.1.3参照]

〈糖尿病における皮膚潰瘍〉

8.3 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法、経口血糖降下剤、インスリン等の治療を行った上での適用を考慮すること。

8.4 外用の糖尿病性潰瘍治療剤では十分な効果が期待されない患者に対して適用を考慮すること。

8.5 投与中は経過を十分に観察し、4週間連日投与して効果が認められない場合には、他の適切な治療に切り替えること。

〈経上腸間膜動脈性門脈造影〉

8.6 肝硬変がある場合には、十分な造影能が得られない可能性がある。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等の患者

9.1.1 心不全の患者(重篤な心不全の患者を除く)

心不全の増強傾向があらわれることがある。[2.1、8.2、11.1.3参照]

9.1.2 緑内障、眼圧亢進のある患者

眼圧を亢進させるおそれがある。

- 9.1.3 胃潰瘍の合併又はその既往歴のある患者
既往のある患者に胃出血をおこすおそれがある。
- 9.1.4 間質性肺炎の患者
間質性肺炎を増悪することがある。[11.1.4参照]
- 9.1.5 出血傾向のある患者
出血を助長するおそれがある。[2.2、11.1.6参照]
〈経上腸間膜動脈性門脈造影〉
- 9.1.6 重度の食道静脈瘤が認められている患者
門脈圧を上昇させるおそれがある。
- 9.2 腎機能障害患者
- 9.2.1 腎不全の患者
腎不全を増悪することがある。
- 9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験(ラット、*in vitro*)で子宮収縮作用が報告されている。[2.3参照]
- 9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが報告されている。
- 9.7 小児等
動脈管依存性先天性心疾患以外の小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
〈動脈管依存性先天性心疾患〉
- 9.7.1 新生児に投与する場合は、以下の事項を考慮すること。
・呼吸管理設備の整っている施設で投与すること。本剤投与により無呼吸発作が発現することがある。[1.、11.1.9参照]
・重篤な疾患を有する新生児への投与なので、観察を十分に行い慎重に投与すること。なお、副作用が発現した場合は、投与中止、注入速度の減速など適切な処置を講ずること。
・有効最小量で維持すること。過量投与により副作用発現率が高まるおそれがある。
・観察を十分に行い、必要以上の長期投与は避けること。長期投与により長管骨膜に肥厚がみられるとの報告がある。
- 9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。[8.2参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗凝血剤 ワルファリンカリウム等	出血傾向の増強をきたすおそれがある。	本剤は血小板凝集抑制作用を有するため、これらの薬剤との併用によりその作用を増強するおそれがある。
血小板機能を抑制する薬剤 アスピリン チクロピジン塩酸塩 シロスタゾール等		
血栓溶解剤 ウロキナーゼ等		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

- 11.1.1 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難、チアノーゼ、血圧低下等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11.1.2 意識消失(頻度不明)
血圧低下に伴い一過性の意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 11.1.3 心不全、肺水腫(いずれも頻度不明)
心不全(増強を含む)、肺水腫、胸水があらわれることがあるので、動悸、胸苦しさ、呼吸困難、浮腫等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[2.1、8.2、9.1.1参照]
- 11.1.4 間質性肺炎(頻度不明)
間質性肺炎(増悪を含む)があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[9.1.4参照]
- 11.1.5 心筋梗塞(頻度不明)
胸痛、胸部圧迫感、心電図異常等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11.1.6 脳出血、消化管出血(いずれも頻度不明)
[2.2、9.1.5参照]
- 11.1.7 無顆粒球症、白血球減少、血小板減少(いずれも頻度不明)
- 11.1.8 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
AST、ALT、Al-P、 γ -GTP等の上昇を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがある。
- 11.1.9 無呼吸発作(12.2%)
新生児に投与した場合、無呼吸発作があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。なお、発現した場合は、減量、注入速度の減速、投与中止など適切な処置を行うこと。[1.、9.7.1参照]

11.2 その他の副作用

	0.1～1%未満	0.1%未満	頻度不明
消化器	嘔気 腹痛 嘔吐 下痢 腹部膨満感・不快感	食欲不振 便秘 口腔腫脹感	口内炎(アフタを含む)
循環器	血圧低下 ^{注)} 血管炎 顔面潮紅 胸部絞扼感 ^{注)}	発赤 胸痛 ^{注)} 動悸 頻脈	血圧上昇 ^{注)}
呼吸器			咳嗽 呼吸困難 喘息 ^{注)}
血液		好酸球增多	
中枢神経系	発熱 頭痛	めまい 倦怠感 しびれ(感)	悪寒 振戦 痙攣
皮膚	発疹 そう痒感	蕁麻疹	発汗
腎臓			腎不全の増悪 ^{注)}
注射部位	血管痛 発赤	こわばり そう痒感	
出血傾向 ^{注)}			出血(鼻出血、眼底出血、結膜出血、皮下出血、血尿等)
その他	熱感	四肢疼痛(増強を含む) 気分不良 浮腫 視力低下 脱毛	低ナトリウム血症 四肢腫脹

注)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること
新生児への投与にあたっては、上記の副作用のほか、低クロール血症(1.3%)、低カルシウム血症(0.5%)、高脂血症(0.2%)があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。
発現頻度は承認時の国内臨床試験及び製造販売後の使用成績調査の結果を合わせて算出した。

14. 適用上の注意

14.1 全般的な注意

凍結したものは使用しないこと。

14.2 薬剤調製時の注意

〈効能共通〉

14.2.1 本剤を輸液以外の他の薬剤と混和しないこと。ただし血漿増量剤(デキストラン、ゼラチン製剤等)との混和は避けること。

14.2.2 本剤を輸液に混和し使用する場合は混和後24時間以内に使用し残液は廃棄すること。

14.2.3 ポリ塩化ビニル製の輸液セット等を使用した場合、可塑剤であるDEHP[di-(2-ethylhexyl) phthalate: フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)]が製剤中に溶出することが報告されている。

〈動脈管依存性先天性心疾患〉

14.2.4 新生児への投与に際しては、持続静注によりDEHPの総溶出量が増加するので、ポリ塩化ビニル製の輸液セット等の使用を避けることが望ましい。

〈経上腸間膜動脈性門脈造影〉

14.2.5 凝集・クリーミングを起こす可能性があるため、造影剤と直接混和しないこと。また、本剤を投与した後、カテーテル内を生理食塩水で洗浄してから造影剤を投与すること。

14.3 薬剤投与時の注意

〈効能共通〉

14.3.1 本剤投与により副作用があらわれた場合には、投与の中止、投与速度の変更など適切な処置を講ずること。

14.3.2 持続投与を行う場合には、ライン内での凝集を防ぐため、必ず単独ラインで投与すること。

14.3.3 本剤は脂肪乳剤を含有しているため、ポリカーボネート製の延長チューブ等を使用した場合、そのコネクター部分にひび割れが発生し、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があるので注意すること。

〈経上腸間膜動脈性門脈造影〉

14.3.4 イヌにアルプロスタジル(PGE₁)として0.1～1.0μg/kgを前腸間膜動脈内投与したところ、投与1分以後に腸管運動が促進された。この腸管運動の促進が血管造影に影響を与える可能性が否定できないため、経上腸間膜動脈性門脈造影に適用する場合、本剤を造影剤注入30秒前に投与すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

本剤の投与により脳梗塞がみられたとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

Lipo PGE₁(脂肪粒子にPGE₁を溶解した製剤)を健康成人に点滴静注で投与した直後の血中PGE₁をRIA2抗体法にて測定したが、微量定量であること、その代謝が速いこと等の理由により信頼性の高い数値を得ることはできなかった¹⁾。

³Hで標識したLipo PGE₁(5μg PGE₁/kg)をラットに静脈内投与後の血液、血漿中放射能濃度は、投与後30秒でそれぞれ24.74ng eq.PGE₁/mL、39.82ng eq.PGE₁/mLを示した後、いずれも4相性の推移で消失し、投与後8時間には投与後30秒の濃度の1%以下であった²⁾。また、イヌでもほぼ同様な推移が認められた²⁾。

16.3 分布

³Hで標識したLipo PGE₁をラットに静脈内投与後の組織内放射能濃度は大部分の組織において5分以内に最高濃度を示し、その後の消失は血漿に比べやや緩慢であった。高濃度を示した組織は、腎、肝及び肺であり、中枢神経系、眼球及び精巣は最も低かった。また、反復投与しても特定組織への残存は認められなかった²⁾。自然発症高血圧ラットへの静脈内投与後の血管内分布は、病変血管において³H-PGE₁に比べ有意に高かった³⁾。

16.4 代謝

³Hで標識したLipo PGE₁をラットに静脈内投与後の血漿中PGE₁未変化体の割合は、³H-PGE₁-CD(PGE₁-

CD:アルプロスタジルアルファデクス)投与時に比べ有意に高かった。主な代謝物は13,14-dihydro-15-keto-PGE₁であった²⁾。

16.5 排泄

³Hで標識したLipo PGE₁をラットに静脈内投与後の主な排泄経路は尿中であり、投与後168時間までに尿中へ59%、糞中へ24%、呼気中へ約8%が回収された。胆汁中へは、48時間までに投与量の約28%が排泄され、その一部は腸肝循環することが示された²⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

承認時に実施された国内の臨床試験における成績は以下のとおりである^{4), 5), 6), 7), 8), 9)}。

疾患名	改善率(%) 【改善以上】
慢性動脈閉塞症における四肢潰瘍、安静時疼痛の改善 [国内第Ⅱ相試験(比較試験及び一般試験)・国内第Ⅲ相試験(二重盲検比較試験及び一般試験)]	52.1 (75/144)
進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデスにおける皮膚潰瘍の改善 [国内第Ⅱ相試験(比較試験及び一般試験)・国内第Ⅲ相試験(二重盲検比較試験及び一般試験)]	75.3 (55/73)
糖尿病における皮膚潰瘍の改善 [国内第Ⅱ相試験(比較試験及び一般試験)・国内第Ⅲ相試験(二重盲検比較試験及び一般試験)]	72.5 (50/69)
振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善、末梢循環・神経・運動機能障害の回復 [国内第Ⅲ相試験(二重盲検比較試験及び一般試験)]	31.8 (27/85)
動脈管依存性先天性心疾患の新生児における動脈管の開存 [国内第Ⅲ相試験(一般試験)]	74.2 (66/89)
経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善 [国内第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験(二重盲検比較試験及び一般試験)]	86.1 (142/165)

承認用量と異なる症例を含む。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤の有効成分はPGE₁であり、PGE₁は血管拡張作用に基づく血流増加作用及び血小板凝集抑制作用を有する。脂肪粒子を薬物担体とすることにより、以下のような特徴が認められた。

- ・ハムスター頬袋微小血管を損傷させた後、Lipo PGE₁を投与した時の方が、損傷前に投与した時より顕著で持続的な血栓形成抑制作用を示した¹⁰⁾。
- ・薬物担体としての脂肪粒子が正常及び糖尿病ラットの腸間膜細動脈、毛細血管内皮細胞及び自然発症高血圧ラットの胸部病変大動脈内皮細胞に付着し、エンドサイトーシスされていることが顕微鏡的に観察された³⁾。
- ・³Hで標識したLipo PGE₁を自然発症高血圧ラットに静脈内投与したときの血管内分布は、病変血管において³H-PGE₁に比べ有意に高かった³⁾。
- ・³Hで標識したLipo PGE₁をラットに静脈内投与後の血漿中PGE₁未変化体の割合は、³H-PGE₁-CD投与時に比べ有意に高かった²⁾。

18.2 血管拡張作用

血流増加作用、血圧降下作用を指標に血管拡張作用をPGE₁-CDと比較検討した結果は以下のとおりである。

- ・正常ラット及びストレプトゾトシン誘発糖尿病ラットにおいて、PGE₁-CDより強い血流増加作用を示し、その作用は糖尿病ラットにおいてより顕著であった¹¹⁾。
- ・イヌにおいて、著明な血圧降下作用を示さない用量でPGE₁-CDより強い血流増加作用を示した¹²⁾。
- ・ストレプトゾトシン誘発糖尿病ラット及び自然発症高血圧ラットにおいて、PGE₁-CDより著明な強い血圧降下作用を示した。これは病態の進行あるいは慢性化に伴いより顕著となった¹¹⁾。

・ラット新生児動脈管に対し、PGE₁-CDより強く持続的な動脈管拡張作用を示した¹³⁾。

18.3 血小板凝集抑制作用

18.3.1 ハムスター頬袋微小血管でのADP誘発血栓形成に対して、正常又は損傷血管のいずれにおいてもPGE₁より強い血栓形成抑制作用及び持続性を示した¹⁰⁾。

18.3.2 ラットのラウリン酸による末梢動脈閉塞症モデルにおいて、PGE₁-CDより強い病態進行の抑制を示した¹⁴⁾。

18.3.3 ラット ex vivo系において、cyclic-AMP量を増加させPGE₁-CDより強い血小板凝集抑制作用を示した¹⁵⁾。

18.4 経上腸間膜動脈性門脈造影能に対する作用

18.4.1 イヌにおいて、前腸間膜動脈内投与により、用量依存的な門脈血流量の増加作用が認められた¹⁶⁾。

18.4.2 イヌにおいて、前腸間膜動脈内投与により、造影剤注入時における造影剤の漏れの減少及び門脈本幹への到達時間の短縮、門脈造影径の増大並びに門脈分枝の識別性の改善が認められた¹⁷⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：アルプロスタジル (alprostadi)


化学名：7-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid

分子式：C₂₀H₃₄O₅

分子量：354.48

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。エタノール(99.5)又はテトラヒドロフランに溶けやすく、アセトニトリルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

構造式：



融点：114～118℃

20. 取扱い上の注意

20.1 凍結を避けて保存すること。

20.2 外箱開封後は遮光して保存すること。

22. 包装

〈リプル注5μg〉

10mL [1mL×10管]

〈リプル注10μg〉

20mL [2mL×10管]

23. 主要文献

- 1) 水島 裕，他：基礎と臨床. 1985；19(11)：5871-5883
- 2) 江角凱夫，他：基礎と臨床. 1986；20(9)：4399-4428
- 3) 名倉一品，他：基礎と臨床. 1986；20(10)：5195-5205
- 4) 勝村達喜，他：循環器科. 1986；20(4)：331-350
- 5) 塩川優一，他：炎症. 1986；6(3)：311-324
- 6) 豊田隆謙，他：医学のあゆみ. 1990；155(11・12)：749-769
- 7) 阿岸祐幸，他：臨床医薬. 1986；2(9)：1269-1289
- 8) 門間和夫，他：小児科臨床. 1986；39(10)：2441-2449
- 9) 橋本 統，他：脈管学. 1995；35(8)：567-581
- 10) Sim AK, et al.：Arzneimittelforschung. 1986；36(8)：1206-1209
- 11) 浜野哲夫，他：基礎と臨床. 1986；20(10)：5145-5154
- 12) 内田 武，他：基礎と臨床. 1986；20(10)：5155-5161
- 13) 古橋忠和，他：基礎と臨床. 1986；20(9)：4296-4300
- 14) Goto J, et al.：Drugs Exp Clin Res. 1986；12(11)：917-921
- 15) 大滝 裕，他：基礎と臨床. 1986；20(10)：5162-5166
- 16) 内田 武，他：基礎と臨床. 1995；29(6)：1483-1487
- 17) 山崎隆三郎，他：基礎と臨床. 1995；29(6)：1501-1513

*24. 文献請求先及び問い合わせ先

田辺ファーマ株式会社 くすり相談センター
〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10
電話 0120-753-280

26. 製造販売業者等

*26.1 製造販売

田辺ファーマ株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10