

貯法：室温保存
有効期間：3年

■ 501 ■

漢方製剤

ツムラ紫雲膏

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 重度（重症）の熱傷・外傷のある患者〔当該症状が悪化するおそれがある。〕
2.3 化膿性の創傷で高熱のある患者〔当該症状が悪化するおそれがある。〕
2.4 患部の湿潤やただれのひどい患者〔当該症状が悪化するおそれがある。〕

3. 組成・性状**3.1 組成**

販売名	ツムラ紫雲膏
有効成分	本品100g中 日局ゴマ油 …… 100.0g 日局トウキ …… 10.0g 日局シコン …… 10.0g 上記の割合で得た油製エキス71.2gと 日局サラシミツロウ・27.0g 日局豚脂 …… 1.8g を含有する。
添加剤	なし

3.2 製剤の性状

剤形	軟膏剤
色	赤紫色
におい	特異なにおい
識別コード	ツムラー501

4. 効能又は効果

火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷

6. 用法及び用量

外用

患部を清潔にしたのち、1日数回適量を直接患部に塗布、あるいはガーゼにのばして貼付する。

8. 重要な基本的注意

本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.7 小児等**

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、痒痒等

14. 適用上の注意**14.1 薬剤投与時の注意**

目には使用しないこと。

18. 薬効薬理**18.1 作用機序**

作用機序が明確でない。

18.2 創傷治癒促進作用第3度熱傷受傷マウスに塗布したところ、表皮再生が促進した¹⁾。**20. 取扱い上の注意**

衣類に付着すると赤紫色に着色し、脱色しにくいので、注意すること。

22. 包装

500g〔ボトル〕

23. 主要文献

1) 平馬直樹ほか:和漢医薬学会誌. 1986;3 (3) :370-371

24. 文献請求先及び問い合わせ先株式会社ツムラ お客様相談窓口
東京都港区赤坂2-17-11 〒107-8521
TEL: 0120-329-970 FAX: 03-5574-6610**26. 製造販売業者等**26.1 製造販売元
株式会社ツムラ
東京都港区赤坂2-17-11