

* 2026 年 8 月改訂(第 3 版)
2024 年 11 月改訂(第 2 版)

日本標準商品分類番号
871141

貯法：室温保存
有効期間：3 年

	50mg	100mg	200mg
承認番号	30200AMX00730	30200AMX00728	30200AMX00729
販売開始	2011 年 11 月	2001 年 10 月	

小児用解熱鎮痛剤

アセトアミノフェン坐剤

アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「シオエ」
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「シオエ」
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「シオエ」

Acetaminophen Suppositories for Pediatric 50mg・100mg・200mg “SIOE”

1. 警告

- 1.1 本剤により重篤な肝機能障害が発現するおそれがあるので注意すること。[2. 1、8. 6、9. 3. 1、11. 1. 3 参照]
- 1.2 本剤とアセトアミノフェンを含む他の薬剤（一般用医薬品を含む）との併用により、アセトアミノフェンの過量投与による重篤な肝機能障害が発現するおそれがあることから、これらの薬剤との併用を避けること。[7. 5、8. 4、13. 2 参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 重篤な肝機能障害のある患者 [1.1、9.3.1、11.1.3 参照]
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	アセトアミノフェン坐剤 小児用 50mg「シオエ」	アセトアミノフェン坐剤 小児用 100mg「シオエ」	アセトアミノフェン坐剤 小児用 200mg「シオエ」
有効成分	1 個中 日本薬局方アセトアミノフェン 50mg	1 個中 日本薬局方アセトアミノフェン 100mg	1 個中 日本薬局方アセトアミノフェン 200mg
添加剤	ハードファット		

3.2 製剤の性状

販売名	アセトアミノフェン坐剤 小児用 50mg「シオエ」	アセトアミノフェン坐剤 小児用 100mg「シオエ」	アセトアミノフェン坐剤 小児用 200mg「シオエ」
性状	乳白色の紡すい形坐剤である。		
外形			
全長	20mm	25mm	26mm
直径	8mm	8mm	10mm
重量	700mg	980mg	1,300mg
識別コード	③108	③106	③107

4. 効能又は効果

小児科領域における解熱・鎮痛

6. 用法及び用量

通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重 1kg あたり 1 回 10～15mg を直腸内に挿入する。投与間隔は 4～6 時間以上とし、1 日総量として 60mg/kg を限度とする。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、成人の用量を超えない。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 1 回投与量の目安は下記のとおり。[14.1.2 参照]

体重	1 回用量			
	アセトアミノフェン量	50mg	100mg	200mg
5kg	50～75mg	1～1.5 個	0.5 個	-
10kg	100～150mg	2～3 個	1～1.5 個	0.5 個
20kg	200～300mg	-	2～3 個	1～1.5 個
30kg	300～450mg	-	-	1.5～2 個

7.2 「小児科領域における解熱・鎮痛」の効能・効果に対する 1 回あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして 500mg、1 日あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして 1,500mg である。

注）本剤は小児用解熱鎮痛剤である。

7.3 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、原則として長期投与を避けること（原則として 5 日以内に限ること）。

7.4 他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。

7.5 総合感冒剤や解熱鎮痛剤等の配合剤を併用する場合は、アセトアミノフェンが含まれていないか確認し、含まれている場合は併用を避けること。[1.2、8.4 参照]

7.6 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者に対する 1 回あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして 300mg 以下とすること。[9.1.6 参照]

8. 重要な基本的注意

8.1 解熱鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。

8.2 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。

- ・発熱、疼痛の程度を考慮し投与すること。
- ・原因療法があればこれを行うこと。

- 8.3 過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う高齢者及び小児等又は消耗性疾患の患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。
- 8.4 本剤とアセトアミノフェンを含む他の薬剤（一般用医薬品を含む）との併用により、アセトアミノフェンの過量投与による重篤な肝機能障害が発現するおそれがあることから、アセトアミノフェンを含む他の薬剤と併用しないよう患者に指導すること。[1.2、7.5、13.2 参照]
- 8.5 アセトアミノフェンの高用量投与により副作用として腹痛・下痢がみられることがある。本剤においても同様の副作用があらわれるおそれがあり、上気道炎等に伴う消化器症状と区別できないおそれがあるので、観察を十分行い慎重に投与すること。
- 8.6 重篤な肝機能障害が発現するおそれがあるため、長期投与する場合にあっては定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。[1.1、11.1.3 参照]
- 8.7 慢性疾患に対し本剤を用いる場合には、薬物療法以外の療法も考慮すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

- * 9.1.1 **重篤な腎障害・肝障害（重篤な肝障害を除く）・敗血症・栄養障害等によるピログルタミン酸蓄積の素因のある患者**
ピログルタミン酸の排泄障害又はグルタチオン欠乏が生じているため、本剤投与によりピログルタミン酸の蓄積が促進された結果、アニオンギャップ開大性代謝性アシドーシスが発現するおそれがある。
- 9.1.2 **血液の異常又はその既往歴のある患者**
症状が悪化又は再発を促すおそれがある。[11.1.5 参照]
- 9.1.3 **出血傾向のある患者**
血小板機能異常が起こることがある。
- 9.1.4 **心機能異常のある患者**
症状が悪化又は心不全が増悪するおそれがある。
- 9.1.5 **気管支喘息のある患者**
症状が悪化するおそれがある。[11.1.4 参照]
- 9.1.6 **アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者**
アスピリン喘息の発症にプロスタグランジン合成阻害作用が関与していると考えられ、症状が悪化又は再発を促すおそれがある。[7.6、11.1.4 参照]
- 9.1.7 **アルコール多量常飲者**
肝機能障害があらわれやすくなる。[10.2 参照]
注）本剤は小児用解熱鎮痛剤である。
- 9.1.8 **絶食・低栄養状態・摂食障害等によるグルタチオン欠乏、脱水症状のある患者**
肝機能障害があらわれやすくなる。
- 9.1.9 **感染症を合併している患者**
必要に応じて適切な抗菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与すること。感染症を不顕性化するおそれがある。[10.2 参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 腎機能障害又はその既往歴のある患者

投与量の減量、投与間隔の延長を考慮すること。症状が悪化又は再発を促すおそれがある。
[11.1.7 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝機能障害患者

投与しないこと。重篤な転帰をとるおそれがある。
[1.1、2.1、11.1.3 参照]

9.3.2 肝機能障害又はその既往歴のある患者（重篤な肝機能障害のある患者を除く）

肝機能が悪化するおそれがある。[11.1.3 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、次のリスクを考慮し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

- ・妊娠後期の女性への投与により胎児に動脈管収縮を起こすことがある。
- ・妊娠後期のラットに投与した実験で、弱い胎仔の動脈管収縮が報告されている¹⁾。
注）本剤は小児用解熱鎮痛剤である。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
注）本剤は小児用解熱鎮痛剤である。

9.7 小児等

- 9.7.1 低出生体重児、新生児及び3ヵ月未満の乳児を対象とした有効性・安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
- 9.7.2 副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。

9.8 高齢者

- 9.8.1 少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。副作用があらわれやすい。
- 9.8.2 副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。
注）本剤は小児用解熱鎮痛剤である。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リチウム製剤 炭酸リチウム	他の非ステロイド性消炎鎮痛剤（インドメタシン、イブプロフェン等）で、リチウム中毒を呈したとの報告がある。	非ステロイド性消炎鎮痛剤は腎のプロスタグランジン合成を抑制することにより、炭酸リチウムの排泄が減少し、血中濃度が上昇すると考えられている。
チアジド系利尿剤 ヒドロクロ チアジド等	他の非ステロイド性消炎鎮痛剤（インドメタシン等）で、チアジド系利尿剤の作用を減弱することが報告されている。	非ステロイド性消炎鎮痛剤は腎のプロスタグランジン合成を抑制して水、塩類貯留が生じ、チアジド系利尿剤の排泄作用に拮抗すると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アルコール (飲酒) [9.1.7 参照]	アルコール多量常飲者がアセトアミノフェンを服用したところ肝不全を起こしたとの報告がある。	アルコール常飲による CYP2E1 の誘導により、アセトアミノフェンから肝毒性を持つ <i>N</i> -アセチル- <i>p</i> -ベンゾキノニンイミンへの代謝が促進される。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン カルリウム	クマリン系抗凝血剤の作用を増強することがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	本剤が血漿蛋白結合部位において競合することで、抗凝血剤を遊離させ、その抗凝血作用を増強させる。
カルバマゼピン フェノバルビタール フェニトイン プリミドン リファンピシン イソニアジド	これらの薬剤の長期連用者は、肝機能障害を生じやすくなるとの報告がある。	これらの薬剤の代謝酵素誘導作用により、アセトアミノフェンから肝毒性を持つ <i>N</i> -アセチル- <i>p</i> -ベンゾキノニンイミンへの代謝が促進される。
抗生物質、抗菌剤 [9.1.9 参照]	過度の体温下降を起こす頻度が高くなることから、併用する場合には観察を十分にを行い、慎重に投与すること。	機序は不明である。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

- * 11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明)
ショック、アナフィラキシー (呼吸困難、全身潮紅、血管性浮腫、蕁麻疹等) があらわれることがある。
- 11.1.2 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症 (いずれも頻度不明)
- 11.1.3 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸 (いずれも頻度不明)
劇症肝炎、AST、ALT、 γ -GTP の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。[1.1、2.1、8.6、9.3.1、9.3.2 参照]
- 11.1.4 喘息発作の誘発 (頻度不明)
[9.1.5、9.1.6 参照]
- 11.1.5 顆粒球減少症 (頻度不明)
[9.1.2 参照]
- 11.1.6 間質性肺炎 (頻度不明)
咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やかに胸部 X 線、胸部 CT、血清マーカー等の検査を実施すること。異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 11.1.7 間質性腎炎、急性腎障害 (いずれも頻度不明)
[9.2.1 参照]

11.1.8 薬剤性過敏症候群 (頻度不明)

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス 6 (HHV-6) 等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、チアノーゼ
血液 ^{注)}	血小板減少
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、軟便、便秘

注) 症状 (異常) があらわれた場合には投与を中止すること。

13. 過量投与

13.1 症状

肝臓、腎臓、心筋の壊死が起こったとの報告がある。

13.2 処置

解毒 (肝機能障害の軽減等) には、アセチルシステインの投与を考慮すること。[1.2 参照]

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

- 14.1.1 本剤を使用する前は、できるだけ排便をすませておくこと。
- 14.1.2 本剤を取り出すには、まず 1 個分の容器を切り離し、上端の合わせ目から引裂いて、坐剤を取り出す。なお、1/2 個を用いる場合には、坐剤を斜めに切断する。[7.1 参照]
- 14.1.3 容器から坐剤を取り出した後、太い方から肛門内に深く挿入すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

- 15.1.1 類似化合物 (フェナセチン) の長期投与により、血色素異常を起こすことがある。
- 15.1.2 腎盂及び膀胱腫瘍の患者を調査したところ、類似化合物 (フェナセチン) を長期・大量に使用 (例: 総服用量 1.5~27kg、服用期間 4~30 年) していた人が多いとの報告がある。
- 15.1.3 非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

15.2 非臨床試験に基づく情報


類似化合物 (フェナセチン) を長期・大量投与した動物実験で、腫瘍発生が認められたとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 生物学的同等性試験

〈アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「シオエ」〉
アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「シオエ」とアルピニー坐剤 50 を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 個（アセトアミノフェンとして 50mg）を健康成人男子に空腹時直腸内投与して血漿中アセトアミノフェン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された²⁾。




	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
アセトアミノフェン 坐剤小児用 50mg 「シオエ」	2583.5 ±592.1	383.8 ±81.1	2.6±0.5	3.0±0.6
アルピニー坐剤 50	2608.2 ±597.9	378.4 ±97.1	2.8±0.7	3.3±1.0

(Mean±S.D., n=14)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

〈アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「シオエ」〉
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「シオエ」とアンヒバ坐剤小児用 200mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 個（アセトアミノフェンとして 200mg）を健康成人男子に空腹時直腸内投与して血漿中アセトアミノフェン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。



	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC ₀₋₂₄ (μg・hr/mL)	Cmax (μg/mL)	Tmax (hr)
アセトアミノフェン 坐剤小児用 200mg 「シオエ」	11.51±0.63	2.21±0.12	1.38±0.11
アンヒバ坐剤小児用 200mg	11.16 ±0.57	2.28 ±0.15	1.29 ±0.11

(Mean±S.E., n=12)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.3 分布

16.3.1 ヒト 9 例にアセトアミノフェン 1g を経口投与し、45 分後に血液中及び血漿中のアセトアミノフェン濃度を測定したところ、血液/血漿の濃度比は全例でほぼ 1 (0.95~1.17) であった⁴⁾。

16.3.2 イヌにアセトアミノフェン 300mg/kg を経口投与したとき、投与 2 時間後におけるアセトアミノフェンの組織/血漿中濃度比は、ほとんどの組織でほぼ 1 であった。また、脂肪においては他の組織より低い値であった⁴⁾。

16.3.3 血漿蛋白結合率は 25~30% であった⁵⁾。

16.4 代謝

グルクロン酸抱合及び硫酸抱合により代謝される⁵⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅲ相試験（スルピリン坐剤との二重盲検比較試験）

38.5℃以上の発熱を有する小児患者 132 例を対象としてアセトアミノフェン坐剤又はスルピリン坐剤を投与した。有効性判定は下表のとおりであり、アセトアミノフェン群が有意に優れていた。

表 1：有効性判定結果

	著効	有効	やや有効	無効	悪化	U 検定
アセトアミノフェン群 (N=67)	38 (56.7%)	16 (80.6%)	9 (94.0%)	4	0	P<0.05
スルピリン群 (N=65)	25 (38.5%)	14 (60.0%)	18 (87.7%)	8	0	

()：累積%

両群ともに副作用は認められなかった⁶⁾。

- 17.1.2 国内第Ⅲ相試験（オキシフェンブタゾン坐剤との二重盲検試験）
38.0℃以上の発熱を有する小児患者 120 例を対象としてアセトアミノフェン坐剤又はオキシフェンブタゾン坐剤を投与した。有効性判定は下表のとおりであった。

表 2：有効性判定結果

	著効	有効	やや有効	無効	悪化	U 検定
アセトアミノフェン群 (N=60)	34 (56.7%)	15 (81.7%)	10 (98.3%)	1	0	N.S.
オキシフェンブタゾン群 (N=60)	31 (51.7%)	9 (66.7%)	13 (88.3%)	7	0	

()：累積%

両群ともに副作用は認められなかった⁷⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

シクロオキシゲナーゼ阻害作用はほとんどなく、視床下部の体温調節中枢に作用して皮膚血管を拡張させて体温を下げる。鎮痛作用は視床と大脳皮質の痛覚閾値を高めることによると推定される⁵⁾。

18.2 解熱作用

- 18.2.1 38.0℃以上の発熱患児にアセトアミノフェン坐剤を投与し体温変化を検討した結果、体温は投与後 30 分以内に下降し始め、1～2 時間後にピークに達し 4 時間後まで効果が持続した⁸⁾。

- 18.2.2 腸チフス・パラチフスワクチンあるいはポリサッカライド発熱ウサギにおいてアセトアミノフェン坐剤（200mg）はスルピリン坐剤（200mg）、アスピリン坐剤（200mg）及びインドメタシン坐剤（50mg）とほぼ同等の解熱効果を示した。なお、アセトアミノフェン坐剤（200mg）は正常体温に影響を及ぼさなかった⁹⁾。


- 18.2.3 腸チフス・パラチフスワクチン発熱ウサギに対し、アセトアミノフェン坐剤 32 日間連続投与後の解熱効果は単回投与時と変わらなかった⁹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：アセトアミノフェン（Acetaminophen）

化学名：N-（4-Hydroxyphenyl）acetamide

化学構造式：



分子式：C₈H₉NO₂

分子量：151.16

性 状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。

メタノール又はエタノール（95）に溶けやすく、水にやや溶けにくく、ジエチルエーテルに極めて溶けにくい。

水酸化ナトリウム試液に溶ける。

融 点：169～172℃

22. 包装

- 〈アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「シオエ」〉
100 個 [5 個（プラスチックコンテナ）×20]
〈アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「シオエ」〉
100 個 [5 個（プラスチックコンテナ）×20]
〈アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「シオエ」〉
100 個 [5 個（プラスチックコンテナ）×20]

23. 主要文献

- 1) 門間和夫ほか：小児科の進歩. 1983；2：95 - 101
- 2) 社内資料：生物学的同等性試験（50mg）
- 3) 社内資料：生物学的同等性試験（200mg）
- 4) JR Gwilt, et al.：J Pharmacol. 1963；15（7）：440 - 444
- 5) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店. 2021：C-146 - C-150
- 6) 吉田清三ほか：現代の診療. 1977；19（10）：123 - 130
- 7) 栗山達ほか：現代の診療. 1977；19（12）：219 - 223
- 8) 野呂忠夫ほか：医学と薬学. 1982；7（7）：1937 - 1940
- 9) 松原一誠ほか：現代の診療. 1979；21（6）：215 - 223

24. 文献請求先及び問い合わせ先

シオエ製薬株式会社 製品情報担当
〒661-0976
兵庫県尼崎市潮江 3 丁目 1 番 11 号
TEL 06（6470）2102
FAX 06（6499）8132

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

シオエ製薬株式会社

兵庫県尼崎市潮江 3 丁目 1 番 11 号

26.2 販売

日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門町 14