

貯 法：室温保存

徐放性気道潤滑去痰剤

有効期間：3年

アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠

アンブロキソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg 「ニプロ」*Ambroxol Hydrochloride Sustained-Release OD Tablets*

承認番号	22600AMX00377
販売開始	2014年6月


2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状**3.1 組成**

販売名	有効成分	添加剤
アンブロキソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg「ニプロ」	1錠中 アンブロキソール塩酸塩 45mg	結晶セルロース、ポビドン、クロスポビドン、ヒプロメロース、スクラロース、エチルセルロース、没食子酸プロピル、マクロゴール 6000、含水二酸化ケイ素、D-マンニトール、カルメロース、アセスルファムカリウム、ステアリン酸マグネシウム、香料

3.2 製剤の性状

販売名	性状	外形・大きさ		
		直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)
アンブロキソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg「ニプロ」	白色の素錠で、微黄白色～淡黄白色の斑点がある（徐放口腔内崩壊錠）			
		10.0	6.0	460
識別コード NP-143				

4. 効能・効果

下記疾患の去痰

急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難

6. 用法・用量

通常、成人には1回1錠（アンブロキソール塩酸塩として45mg）を1日1回経口投与する。

7. 用法・用量に関連する注意

早朝覚醒時に喀痰喀出困難を訴える患者には、夕食後投与が有用である。〔17.1.1 参照〕

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.5 妊婦**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験（ラット）で母乳中へ移行することが報告されている。

9.8 高齢者

減量が必要な場合には、他の剤形（徐放性製剤を除く）を使用すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用**11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）**

発疹、顔面浮腫、呼吸困難、血圧低下等があらわれることがある。

11.1.2 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）**11.2 その他の副作用**

種類	頻度	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
消化器		胃不快感	胃痛、腹部膨満感、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、便秘、食思不振、消化不良（胃部膨満感、胸やけ等）	
過敏症			発疹、蕁麻疹、蕁麻疹様紅斑、そう痒	血管浮腫（顔面浮腫、眼瞼浮腫、口唇浮腫等）
肝臓			肝機能障害（AST上昇、ALT上昇等）	
その他			口内しびれ感、上肢のしびれ感	めまい

注）発現頻度は錠、液、シロップ及び徐放カプセルの承認時までの臨床試験及び使用成績調査を含む。

14. 適用上の注意**14.1 薬剤交付時の注意****14.1.1 PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。** PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。**14.1.2 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。****16. 薬物動態****16.1 血中濃度****16.1.1 生物学的同等性試験**健康成人男性にアンブロキソール塩酸塩として45mgを含むアンブロキソール塩酸塩小型徐放錠1錠とアンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg 1カプセルを、無作為割付け、2剤2期クロスオーバー法により絶食（n=18）又は食後（n=20）単回経口投与した。血漿中アンブロキソール未変化体濃度を測定し、薬物動態パラメータ（AUC_t及びC_{max}）について統計解析を行った結果、対数値の平均値の差の90%信頼区間は、いずれの摂食条件でもすべて生物学的同等性の判定基準 log（0.80）～log（1.25）の範囲内であることから両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

血漿中アンブロキシソール未変化体濃度の薬物動態パラメータ

		AUC _{0-48hr} ^{注1)} (ng・h/mL)	C _{max} ^{注1)} (ng/mL)	t _{max} ^{注2)} (h)	t _{1/2} ^{注1)} (h)
絶食	徐放剤 (n=18)	579.462 ± 166.839	28.985 ± 7.027	6.0	12.149 ± 3.368
	徐放カプセル (n=18)	645.866 ± 234.574	27.641 ± 6.854	4.0	11.531 ± 3.051
食後	徐放剤 (n=20)	689.543 ± 237.718	35.256 ± 10.069	6.0	12.178 ± 2.835
	徐放カプセル (n=20)	697.838 ± 219.157	30.955 ± 9.140	6.0	13.384 ± 5.355

注1) 平均値±標準偏差

注2) 中央値

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


16.1.2 生物学的同等性試験

アンブロキシソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg 「ニプロ」とムコソルバン L カプセル 45mg のそれぞれ 1 錠又は 1 カプセル（アンブロキシソール塩酸塩として 45mg）を、クロスオーバー法により健康成人男子に絶食（水あり、水なし）又は食後（水なし）に単回経口投与して血漿中アンブロキシソール濃度を測定した。得られたそれぞれの薬物動態パラメータ（AUC_{0-48hr}、C_{max}）について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された^{2) - 4)}。

薬物動態パラメータ（絶食時・水あり投与）

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-48hr} (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
アンブロキシソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg 「ニプロ」	984.2 ± 306.0	65.5 ± 23.1	4.2 ± 0.9	10.2 ± 2.1
ムコソルバン L カプセル 45mg	1088.7 ± 325.9	62.3 ± 21.4	4.3 ± 1.0	12.6 ± 4.7

(Mean ± S.D., n=20)




血漿中アンブロキシソール濃度推移（絶食時・水あり投与）

薬物動態パラメータ（絶食時・水なし投与）

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-48hr} (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
アンブロキシソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg 「ニプロ」	949.7 ± 192.2	53.4 ± 13.4	5.2 ± 2.1	11.2 ± 3.3
ムコソルバン L カプセル 45mg	956.3 ± 225.9	50.5 ± 14.5	5.4 ± 2.1	11.5 ± 3.9

(Mean ± S.D., n=20)




血漿中アンブロキシソール濃度推移（絶食時・水なし投与）

薬物動態パラメータ（食後・水なし投与）

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-48hr} (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
アンブロキシソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg 「ニプロ」	971.2 ± 329.4	60.7 ± 19.3	6.7 ± 1.7	9.5 ± 1.7
ムコソルバン L カプセル 45mg	1038.2 ± 229.0	58.4 ± 15.9	7.1 ± 1.6	11.8 ± 6.3

(Mean ± S.D., n=20)



血漿中アンブロキシソール濃度推移（食後・水なし投与）

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内臨床試験（早朝覚醒時に喀痰喀出困難を訴える患者）

早朝覚醒時に喀痰喀出困難を訴える患者を対象に行った二重盲検試験で、アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45mg の夕食後 1 回投与の有効性が認められた⁵⁾。[7. 参照]

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

アンブロキシロール塩酸塩は、肺表面活性物質の分泌促進作用、気道液の分泌促進作用、線毛運動亢進作用が総合的に作用して喀痰喀出効果を示すものと考えられる。この際、肺表面活性物質の役割としては、線毛の存在しない肺胞や呼吸細気管支を含め気道中の粘性物質を排出しやすくするものと考えられている^{6) -10)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：アンブロキシロール塩酸塩(Ambroxol Hydrochloride)


化学名：*trans*-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]

cyclohexanol hydrochloride

分子式： $C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$

分子量：414.56

構造式：



融点：約 235℃ (分解)

性状：・白色の結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。

・メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール (99.5) にやや溶けにくく、酢酸 (100) に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

20. 取扱い上の注意

アルミピロー開封後は、湿気を避けて保存すること。

22. 包装

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

500錠 [10錠 (PTP) × 50、乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) 慶松元興ほか：新薬と臨牀. 2014; 63(12): 1964-1980. (L20220825)
- 2) 社内資料：生物学的同等性試験 (絶食時・水あり投与)
- 3) 社内資料：生物学的同等性試験 (絶食時・水なし投与)
- 4) 社内資料：生物学的同等性試験 (食後・水なし投与)
- 5) 長岡 滋ほか：Therapeutic Research. 1993; 14(2): 617-646. (L20220827)
- 6) 長岡 滋ほか：薬理と治療. 1981; 9(5): 1845-1854. (L20220818)
- 7) 千田勝一ほか：薬理と治療. 1981; 9(2): 483-486. (L20220819)
- 8) 前多治雄ほか：薬理と治療. 1981; 9(2): 487-490. (L20220820)
- 9) Curti PC.: Pneumonologie. 1972; 147(1): 62-74. (L20220821)
- 10) Curti PC, et al.: Arzneimittel-Forsch. 1978; 28(5a): 922-925. (L20220822)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室

〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号

TEL 0120-226-898

FAX 050-3535-8939

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



NIPRO

ニプロ株式会社

大阪府摂津市千里丘新町3番26号