

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

## 抗精神病剤

日本薬局方ハロペリドール錠

**ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」**  
**ハロペリドール錠 1mg「アメル」**  
**ハロペリドール錠 1.5mg「アメル」**  
**ハロペリドール錠 2mg「アメル」**  
**ハロペリドール錠 3mg「アメル」**

日本薬局方ハロペリドール細粒

**ハロペリドール 細粒 1%「アメル」**

Haloperidol Tablets 「AMEL」  
Haloperidol Fine Granules 「AMEL」

	錠0.75mg	錠1mg	錠1.5mg	錠2mg	錠3mg
承認番号	22500AMX01012	22500AMX01015	22500AMX01013	22500AMX01014	22500AMX01017
販売開始	1981年9月	2001年7月	1981年9月	2001年7月	1981年9月

劇薬  
処方箋医薬品  
注意－医師等の処方箋により使用すること

	細粒1%
承認番号	22500AMX01011
販売開始	1981年9月

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）  
2.1 昏睡状態の患者 [昏睡状態が悪化するおそれがある。]  
2.2 バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者 [中枢神経抑制作用が増強される。]  
2.3 重症の心不全患者 [心筋に対する障害作用や血圧降下が報告されている。]  
2.4 パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者 [錐体外路症状が悪化するおそれがある。]  
2.5 本剤の成分又はブチロフェノン系化合物に対し過敏症の患者  
\* 2.6 アドレナリンを投与中の患者（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く）[10.1 参照]  
2.7 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」	ハロペリドール錠 1mg「アメル」
有効成分	1錠中、日局ハロペリドール 0.75mg を含有する。	1錠中、日局ハロペリドール 1mg を含有する。
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、カルナウバロウ
販売名	ハロペリドール錠 1.5mg「アメル」	ハロペリドール錠 2mg「アメル」
有効成分	1錠中、日局ハロペリドール 1.5mg を含有する。	1錠中、日局ハロペリドール 2mg を含有する。

販売名	ハロペリドール錠 1.5mg「アメル」	ハロペリドール錠 2mg「アメル」
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、カルナウバロウ	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、アラビアゴム末、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク

販売名	ハロペリドール錠 3mg「アメル」	ハロペリドール細粒 1%「アメル」
有効成分	1錠中、日局ハロペリドール 3mg を含有する。	1g 中、日局ハロペリドール 10mg を含有する。
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、カルナウバロウ	乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース

#### 3.2 製剤の性状

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」	素錠		HP0.75 /Kw
	白色	直径：約 6.0mm 厚さ：約 2.2mm 質量：約 80mg	

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
ハロペリドール錠 1mg「アメル」	フィルムコーティング錠		HP1 /Kw HP1
	白色	直径：約 6.1mm 厚さ：約 2.8mm 質量：約 88mg	
ハロペリドール錠 1.5mg「アメル」	割線入り素錠		HP1.5 /Kw
	白色	直径：約 6.2mm 厚さ：約 2.1mm 質量：約 80mg	
ハロペリドール錠 2mg「アメル」	割線入り素錠		HP2 /Kw HP2
	白色	直径：約 6.2mm 厚さ：約 2.0mm 質量：約 80mg	
ハロペリドール錠 3mg「アメル」	フィルムコーティング錠		HP3 /Kw HP3
	白色～淡黄白色	直径：約 6.1mm 厚さ：約 3.3mm 質量：約 88mg	

販売名	剤形・色
ハロペリドール細粒 1%「アメル」	細粒剤 白色

#### 4. 効能又は効果

統合失調症、うつ病

#### 6. 用法及び用量

ハロペリドールとして、通常成人1日0.75～2.25mgからはじめ、徐々に增量する。

維持量として1日3～6mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

#### 8. 重要な基本的注意

8.1 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

8.2 本剤は制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので、注意すること。[\[11.1.3 参照\]](#)

\* 8.3 本剤の急激な增量により悪性症候群が起こることがあるので、本剤を增量する場合は慎重に行うこと。[\[11.1.1 参照\]](#)

#### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

##### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 心・血管疾患、低血圧、又はこれらの疑いのある患者（重症の心不全患者を除く）

一過性の血圧降下があらわれることがある。

9.1.2 QT延長を起こしやすい患者

低カリウム血症のある患者等では、QT延長が発現するおそれがある。[\[10.2、11.1.2 参照\]](#)

9.1.3 てんかん等の痙攣性疾患、又はこれらの既往歴のある患者

痙攣閾値を低下させことがある。

9.1.4 甲状腺機能亢進状態にある患者

錐体外路症状が起こりやすい。

\* 9.1.5 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者、脳に器質的障害のある患者

悪性症候群が起こりやすい。[\[11.1.1 参照\]](#)

#### 9.1.6 高温環境下にある患者

体温調節中枢を抑制するため、高熱反応が起こるおそれがある。

#### 9.1.7 不動状態、長期臥床、肥満、脱水状態等の患者

肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されている。[\[11.1.8 参照\]](#)

#### 9.3 肝機能障害患者

血中濃度が上昇するおそれがある。

#### 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。催奇形性を疑う症例がある。動物実験で口蓋裂（マウス）、脳奇形（ハムスター）等の催奇形性及び着床数の減少、胎児吸収の増加（マウス）、流産率の上昇（ラット）等の胎児毒性が報告されている。また、妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戻、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれたとの報告がある。[\[2.7 参照\]](#)

#### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ヒト母乳中へ移行し、哺乳中の児の血中に検出されたと報告されている。

#### 9.7 小児等

小児に抗精神病薬を投与した場合、錐体外路症状、特にジスキネジアが起こりやすいとの報告がある。

#### 9.8 高齢者

少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。錐体外路症状等の副作用があらわれやすい。

#### \* 10. 相互作用

本剤は、主として薬物代謝酵素 CYP2D6 及び CYP3A4 で代謝される。[\[16.4.1 参照\]](#)

#### 10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アドレナリン (アナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く) ボスマシン [2.6 参照]	アドレナリンの作用を逆転させ、重篤な血圧降下を起こすことがある。	アドレナリンはアドレナリン作動性α、β-受容体の刺激剤であり、本剤のα-受容体遮断作用により、β-受容体刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強される。

#### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アドレナリン含有歯科麻酔剤 リドカイン・アドレナリン	重篤な血圧降下を起こすことがある。	アドレナリンはアドレナリン作動性α、β-受容体の刺激剤であり、本剤のα-受容体遮断作用により、β-受容体刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強されるおそれがある。
中枢神経抑制剤 バルビツール酸誘導体等	中枢神経抑制作用が増強することがあるので、減量するなど注意すること。	本剤及びこれらの薬剤の中枢神経抑制作用による。
アルコール	相互に作用を増強することがある。	アルコールは中枢神経抑制作用を有する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* リチウム	心電図変化、重症の錐体外路症状、持続性のジスキネジア、突発性の悪性症候群、非可逆性の脳障害を起こすとの報告があるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	機序は不明であるが、併用による抗ドバミン作用の増強等が考えられている。
抗コリン作用を有する薬剤 抗コリン作動性 抗パーキンソン剤 フェノチアジン系化合物 三環系抗うつ剤等	腸管麻痺等の抗コリン系の副作用が強くあらわれることがある。また、精神症状が悪化したとの報告がある。	併用により抗コリン作用が強くあらわれる。
抗ドバミン作用を有する薬剤 ベンザミド系薬剤 メトクロプラミド スルピリド チアブリド等 ドンペリドン等	内分泌機能異常、錐体外路症状が発現することがある。	併用により抗ドバミン作用が強くあらわれる。
タンドスピロン	錐体外路症状を増強するおそれがある。	タンドスピロンは弱い抗ドバミン(D <sub>2</sub> )作用を有する。
ドバミン作動薬 レボドバ製剤 プロモクリップチン等	これらの薬剤のドバミン作動薬としての作用が減弱することがある。	ドバミン作動性神経において、作用が拮抗することによる。
薬物代謝酵素(主にCYP3A4)を誘導する薬剤 カルバマゼピン リファンビシン等	本剤の作用が減弱することがある。	薬物代謝酵素誘導作用により、本剤の血中濃度が低下する。
CYP3A4を阻害する薬剤 イトラコナゾール等	本剤の作用が増強し、副作用が発現するおそれがある。	薬物代謝酵素阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する。
CYP2D6を阻害する薬剤 キニジン プロメタジン クロルプロマジン等	本剤の作用が増強し、副作用が発現するおそれがある。	薬物代謝酵素阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する。
QT延長を起こすことが知られている薬剤 [9.1.2、11.1.2 参照]	QT延長を起こすおそれがある。	併用によりQT延長作用が相加的に増加するおそれがある。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### \* 11.1.1 悪性症候群 (頻度不明)

無動緘默、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それにひきづき発熱がみられる場合は、投

与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇がみられることが多い、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下や、筋強剛を伴う嚥下困難から嚥下性肺炎が発現することがある。

なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎障害へと移行し、死亡した例が報告されている。[\[8.3、9.1.5 参照\]](#)

#### 11.1.2 心室細動、心室頻拍 (いずれも頻度不明)

心室細動、心室頻拍 (Torsades de pointes を含む)、QT延長があらわれることがある。[\[9.1.2、10.2 参照\]](#)

#### 11.1.3 麻痺性イレウス (頻度不明)

腸管麻痺（食欲不振、恶心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうつ滞等の症状）をきたし、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には、投与を中止すること。なお、この恶心・嘔吐は、本剤の制吐作用により不顕性化することもあるので注意すること。[\[8.2 参照\]](#)

#### 11.1.4 遅発性ジスキネジア (頻度不明)

長期投与により、遅発性ジスキネジア（口周部の不随意運動、四肢の不随意運動等を伴うことがある。）があらわれ、投与中止後も持続することがある。抗パーキンソン剤を投与しても、症状が軽減しない場合があるので、このような症状があらわれた場合には、本剤の投与継続の必要性を、他の抗精神病薬への変更も考慮して慎重に判断すること。

#### 11.1.5 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) (頻度不明)

低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、水分摂取の制限など適切な処置を行うこと<sup>1)</sup>。

#### 11.1.6 無顆粒球症、白血球減少、血小板減少 (いずれも頻度不明)

#### 11.1.7 横紋筋融解症 (頻度不明)

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

#### 11.1.8 肺塞栓症、深部静脈血栓症 (いずれも頻度不明)

肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫等が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。[\[9.1.7 参照\]](#)

#### 11.1.9 肝機能障害、黄疸 (いずれも頻度不明)

AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

## 11.2 その他の副作用

	5%以上 <sup>注1)</sup>	5%未満 <sup>注1)</sup>	頻度不明
循環器		血圧降下、起立性低血圧	心電図異常 (QT間隔の延長、T波の変化等)、頻脈
肝臓			肝機能異常
錐体外路症状 <sup>注2)</sup>	パーキンソン症候群 (振戦(11.9%)、筋強剛、流涎、寡動、歩行障害、仮面様顔貌、嚥下障害等)、アカシジア(静坐不能)	ジスキネジア (口周部、四肢等の不随意運動等)、ジストニア (痙攣性斜頸、顔面・喉頭・頸部の攣縮、後弓反張、眼球上転発作等)	
眼		眼の調節障害	長期又は大量投与による角膜・水晶体の混濁、角膜等の色素沈着

	5%以上 <sup>注1)</sup>	5%未満 <sup>注1)</sup>	頻度不明
過敏症		発疹、じん麻疹、そう痒感、光線過敏症	
血液		貧血、白血球減少	
消化器		食欲不振、恶心・嘔吐、便秘、下痢、口渴	
内分泌		月経異常、体重増加	女性型乳房、乳汁分泌、高プロラクチン血症、インボテンス、持続勃起
呼吸器		呼吸困難	喉頭痙攣
精神神經系	不眠(16.1%)、焦燥感、神経過敏	眼気、眩暈、頭痛・頭重、不安、幻覚、興奮、痙攣、性欲異常	過鎮静、抑うつ、知覚変容発作
その他		脱力感・倦怠感・疲労感、発熱、発汗、潮紅、鼻閉	浮腫、排尿困難、体温調節障害

注1) 発現頻度は国内文献の集計結果に基づく。

注2) 異常が認められた場合には、必要に応じて抗パーキンソン剤投与など適切な処置を行うこと。

### 13. 過量投与

#### 13.1 症状

主な症状は、低血圧、過度の鎮静、重症の錐体外路症状（筋強剛、振戦、ジストニア症状）等である。また、呼吸抑制及び低血圧を伴う昏睡状態や心電図異常（Torsades de pointesを含む）があらわれることがある。小児では血圧上昇があらわれたとの報告もある。

#### 13.2 処置

低血圧や循環虚脱があらわれた場合には、輸液、血漿製剤、アルブミン製剤、ノルアドレナリン等の昇圧剤（アドレナリンは禁忌）等の投与により血圧の確保等の処置を行う。また、重症の錐体外路症状に対しては、抗パーキンソン剤を投与する。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縫隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

#### 15. その他の注意

##### 15.1 臨床使用に基づく情報

###### 15.1.1 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。

15.1.2 外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外効能・効果）を有する高齢患者を対象とした 17 の臨床試験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群と比較して死亡率が 1.6～1.7 倍高かったとの報告がある。また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報告がある。

##### 15.2 非臨床試験に基づく情報

雌マウスに長期間経口投与した試験において、臨床最大通常用量の 10 倍 (1.25mg/kg/日) 以上で乳腺腫瘍の発生頻度が、また、40 倍 (5mg/kg/日) 以上で下垂体腫瘍の発生頻度が、対照群に比し高いとの報告がある。

### 16. 薬物動態

#### 16.4 代謝

##### 16.4.1 代謝酵素

CYP2D6, CYP3A4<sup>2),3)</sup>[10. 参照]

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

ブチロフェノン誘導体であるが、フェノチアジン系薬物と同様にドバミン D<sub>2</sub> 受容体遮断作用により統合失調症の陽性症状を改善する<sup>4)</sup>。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

#### 一般名

ハロペリドール (Haloperidol)

#### 化学名

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one

#### 分子式

C<sub>21</sub>H<sub>23</sub>ClFNO<sub>2</sub>

#### 分子量


375.86

#### 性状

白色～微黄色の結晶又は粉末である。

酢酸 (100) に溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、2-プロパノール又はエタノール (99.5) に溶けにくく、水にほとんど溶けない。

#### 構造式



#### 融点

150～154°C

### 20. 取扱い上の注意

#### 〈錠 0.75mg、錠 1.5mg、錠 2mg〉

PTP 包装は個装箱開封後、バラ包装は開栓後、遮光して保存すること。

#### 〈細粒 1%〉

アルミ袋開封後は遮光して保存すること。

### 22. 包装

#### 〈ハロペリドール錠 0.75mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

1,000錠 [瓶、バラ]

#### 〈ハロペリドール錠 1mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

1,000錠 [瓶、バラ]

#### 〈ハロペリドール錠 1.5mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

1,000錠 [瓶、バラ]

#### 〈ハロペリドール錠 2mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

1,000錠 [瓶、バラ]

#### 〈ハロペリドール錠 3mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

1,000錠 [瓶、バラ]

#### 〈ハロペリドール細粒 1% 「アメル」〉

500g [アルミ袋、バラ]

### 23. 主要文献

1) Matuk F. & Kalyanaraman K. : Arch. Neurol. 1977 ; 34 : 374-375

2) Tyndale R. F., et al. : Br. J. Clin. Pharmacol. 1991 ; 31 : 655-660

3) Fang J., et al. : Cell. Mol. Neurobiol. 1997 ; 17 : 227-233

4) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021 ; C-4180

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口

〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4

TEL 0120-041-189

FAX 06-6121-2858

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

共和薬品工業株式会社

大阪市北区中之島3-2-4