

貯 法：室温保存  
有効期間：錠3年、  
散4年  
規制区分：処方箋医薬品<sup>注</sup>

パーキンソン症候群治療剤  
ビペリデン塩酸塩錠・散

# ビペリデン塩酸塩錠 1mg「ヨシトミ」 ビペリデン塩酸塩散 1%「ヨシトミ」

Biperiden Hydrochloride TABLETS · POWDER 「YOSHITOMI」

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

	錠1mg	散1%
承認番号	23000AMX00165	23000AMX00164
販売開始	1975年1月	1975年1月

## 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 閉塞隅角緑内障の患者[抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させことがある。]  
2.2 本剤の成分に対し過敏症の患者  
2.3 重症筋無力症の患者[本剤の抗コリン作用により症状が悪化するおそれがある。]

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

販売名	ビペリデン塩酸塩錠1mg 「ヨシトミ」	ビペリデン塩酸塩散1% 「ヨシトミ」
有効成分	(1錠中) 日局 ビペリデン 塩酸塩 1mg	(1g中) 日局 ビペリデン 塩酸塩 10mg
添加剤	セルロース、トウモロコ シデンプン、乳糖水和 物、無水ケイ酸、メチル セルロース、硬化油	セルロース、トウモロコ シデンプン、無水ケイ 酸、メチルセルロース

### 3.2 製剤の性状

販売名	ビペリデン塩酸塩錠1mg 「ヨシトミ」	ビペリデン塩酸塩散1% 「ヨシトミ」	
性状・剤形	白色・素錠(割線入り)	白色・においなし・味 は僅かに苦い・細粒状 の散剤	
外形			
識別コード	Y-TA1		
サイズ	直径 (mm) 6.5	厚さ (mm) 2.3	重量 (mg) 100

## 4. 効能又は効果

- 特発性パーキンソニズム
- その他のパーキンソニズム(脳炎後、動脈硬化性、中毒性)
- 向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア(遅発性を除く)・アカシジア

## 5. 効能又は効果に関する注意

- 抗パーキンソン剤はフェノチアジン系薬剤、ブチロフェノン系薬剤、レセルピン誘導体等による口周部等の不随意運動(遅発性ジスキネジア)を通常軽減しない。場合によっては、このような症状を増悪顕著化させることがある。

## 6. 用法及び用量

ビペリデン塩酸塩として、通常成人1回1mg1日2回よりはじめ、その後漸増し、1日3~6mgを分割経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

## 7. 用法及び用量に関する注意

本剤の投与は、少量から開始し、観察を十分に行い、慎重に維持量まで增量すること。また、他剤から本剤に切

り替える場合には、他剤を徐々に減量しながら本剤を增量するのが原則である。

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤投与中は定期的に隅角検査及び眼圧検査を行うことが望ましい。  
8.2 本剤の大量投与により、パーキンソン症状の増悪がみられることがあるので、このような場合には減量するなど適切な処置を行うこと。  
8.3 本剤により気分高揚等が出現したとする報告があり、依存形成につながるおそれがあるので、慎重に投与すること。[11.1.2参照]  
8.4 眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者  
9.1.1 開放隅角緑内障の患者  
抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。  
9.1.2 前立腺肥大など尿路に閉塞性疾患のある患者  
排尿障害が発現又は悪化することがある。  
9.1.3 胃腸管に閉塞性疾患のある患者  
腸管麻痺が発現又は悪化するおそれがある。  
9.1.4 不整脈又は頻拍傾向のある患者  
不整脈等の循環器系の副作用を起こすおそれがある。  
9.1.5 てんかんの患者  
発作の誘因となるおそれがある。  
9.1.6 高温環境にある患者  
発汗抑制が起こりやすい。  
9.1.7 動脈硬化性パーキンソン症候群の患者  
精神神経系の副作用が起こりやすい。  
9.1.8 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者  
悪性症候群が起こりやすい。[11.1.1参照]  
9.2 腎機能障害患者  
代謝・排泄機能が低下しているため、副作用が起こりやすい。  
9.3 肝機能障害患者  
代謝・排泄機能が低下しているため、副作用が起こりやすい。  
9.4 妊婦  
妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。  
9.5 授乳婦  
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。  
9.6 小児等  
小児等には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 9.8 高齢者

せん妄、不安等の精神症状及び抗コリン作用による口渴、排尿困難、便秘等があらわれやすい。

## 10. 相互作用

### 10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗コリン作用を有する薬剤 フェノチアジン系薬剤 ブチロフェノン系薬剤 三環系抗うつ剤 等	腸管麻痺(食欲不振、恶心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等の症状)をきたし、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。 なお、この恶心・嘔吐はフェノチアジン系薬剤等の制吐作用により不顕性化することもあるので、注意すること。	併用により抗コリン作用が強くあらわれる。
中枢神經抑制剤 バルビツール酸誘導体 フェノチアジン系薬剤 三環系抗うつ剤 モノアミン酸化酵素阻害剤 等	眠気、精神運動機能低下、幻覚、妄想等があらわれることがあるので、減量するなど注意すること。	併用により中枢神經抑制作用又は抗コリン作用が強くあらわれる。
他の抗パーキンソン剤 レボドパ アマンタジン プロモクリプチン 等	幻覚、妄想等の精神神經系の副作用が増強することがある。	ドバミン過剰及びアセチルコリン系神經機能低下が考えられている。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 悪性症候群(頻度不明)

抗精神病薬、抗うつ剤及びドバミン作動系抗パーキンソン剤との併用において、本剤及び併用薬の減量又は中止により、発熱、無動緘默、意識障害、強度の筋強剛、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、体温冷却、水分補給等の全身管理及び本剤の投与量を一旦もとに戻した後慎重に漸減するなどの適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇があらわれることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下があらわれることがある。[9.1.8参照]

#### 11.1.2 依存性(頻度不明)

[8.3参照]

#### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
精神神經系	幻覚、せん妄、精神錯乱、不安、嗜眠、記憶障害
消化器	口渴、恶心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、便秘、口内炎
泌尿器	排尿困難、尿閉
過敏症	発疹
循環器	血圧低下、血圧上昇
眼	眼の調節障害
肝臓 <sup>(注)</sup>	肝障害

注)投与中は定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。

## 13. 過量投与

### 13.1 症状

主な症状は抗コリン作用に基づくものである。口渴、体温上昇、頻脈、不整脈、尿閉、興奮、幻覚、妄想、錯乱、痙攣、呼吸抑制等があらわれることがある。

### 13.2 処置

中枢神經興奮症状に対してはジアゼパム、短時間作用型のバルビツール酸系薬剤の投与を行う。抗コリン作用を有する抗精神病薬は症状を悪化させがあるので投与しないこと。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

中枢ムスカリン受容体を遮断することにより、相対的に亢進している線条体アセチルコリン神經の機能を抑える。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：ビペリデン塩酸塩(Biperiden Hydrochloride)


化学名：1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol monohydrochloride

分子式：C<sub>21</sub>H<sub>29</sub>NO · HCl

分子量：347.92

性状：白色～帯褐黃白色の結晶性の粉末である。ギ酸に溶けやすく、水、メタノール又はエタノール(95)に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

構造式：



融点：約270°C (分解).

## 20. 取扱い上の注意

開封後は遮光して保存すること。

## 22. 包装

〈ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」〉

100錠[10錠(PTP)×10]、1,000錠[10錠(PTP)×100]、1,000錠[バラ]

〈ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」〉

100g[アルミ袋]

## \*24. 文献請求先及び問い合わせ先

田辺ファーマ株式会社 くすり相談センター

〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10

電話 0120-753-280

## 26. 製造販売業者等

### \*26.1 製造販売元

田辺ファーマ株式会社

大阪市中央区道修町3-2-10