

\*2026年2月改訂（第2版）  
2023年12月改訂（第1版）

貯法：室温保存

有効期間：3年

|            |
|------------|
| 日本標準商品分類番号 |
| 87625      |

|      |                  |
|------|------------------|
| 承認番号 | 30300AMX00306000 |
| 販売開始 | 2016年9月          |

抗ウイルス化学療法剤  
バラシクロビル塩酸塩顆粒  
**バラシクロビル顆粒50%「SPKK」**  
**VALACICLOVIR GRANULES 50%「SPKK」**

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分あるいはアシクロビルに対し過敏症の既往歴のある患者

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 販売名  | バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」                                                                     |
| 有効成分 | 1g 中<br>日局バラシクロビル塩酸塩 556mg<br>(バラシクロビルとして 500mg)                                        |
| 添加剤  | 結晶セルロース（粒）、ポビドン、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、軽質無水ケイ酸 |

### 3.2 製剤の性状

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 販売名   | バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」                   |
| 剤形・性状 | 白色～微黄白色の顆粒剤である。においはないか、わずかに特異なにおいがある。 |

## 4. 効能又は効果

- 単純疱疹
- 造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制
- 带状疱疹
- 水痘
- 性器ヘルペスの再発抑制

## 5. 効能又は効果に関連する注意

### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

- 5.1 本剤の投与により、セックスパートナーへの感染を抑制することが認められている。ただし、本剤投与中もセックスパートナーへの感染リスクがあるため、コンドームの使用等が推奨される。[17.3 参照]
- 5.2 性器ヘルペスの発症を繰り返す患者（免疫正常患者においては、おおむね年6回以上の頻度で再発する者）に対して投与すること。[17.1.8、17.1.9 参照]

## 6. 用法及び用量

### 〔成人〕

#### 〈単純疱疹〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

#### 〈造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日まで経口投与する。

#### 〈带状疱疹〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

#### 〈水痘〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

#### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、HIV感染症の患者（CD4リンパ球数

100/mm<sup>3</sup>以上）にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

### 〔小児〕

#### 〈単純疱疹〉

通常、体重10kg未満の小児には体重1kg当たりバラシクロビルとして1回25mgを1日3回、体重10kg以上の小児には体重1kg当たりバラシクロビルとして1回25mgを1日2回経口投与する。ただし、1回最高用量は500mgとする。

#### 〈造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制〉

通常、体重10kg未満の小児には体重1kg当たりバラシクロビルとして1回25mgを1日3回、体重10kg以上の小児には体重1kg当たりバラシクロビルとして1回25mgを1日2回造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日まで経口投与する。ただし、1回最高用量は500mgとする。

#### 〈带状疱疹〉

通常、小児には体重1kg当たりバラシクロビルとして1回25mgを1日3回経口投与する。ただし、1回最高用量は1000mgとする。

#### 〈水痘〉

通常、小児には体重1kg当たりバラシクロビルとして1回25mgを1日3回経口投与する。ただし、1回最高用量は1000mgとする。

#### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

通常、体重40kg以上の小児にはバラシクロビルとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、HIV感染症の患者（CD4リンパ球数100/mm<sup>3</sup>以上）にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

### 〈効能共通〉

- 7.1 本剤の投与は、発病初期に近いほど効果が期待できるので、早期に投与を開始することが望ましい。
- 7.2 腎障害を有する成人患者におけるクレアチニンクリアランスに応じた本剤の投与間隔及び投与量の目安は下表のとおりである。また、血液透析を受けている患者に対しては、患者の腎機能、体重又は臨床症状に応じ、クレアチニンクリアランス10mL/min未満の目安よりさらに減量（250mgを24時間毎等）することを考慮すること。また、血液透析日には透析後に投与すること。なお、腎障害を有する小児患者における本剤の投与間隔及び投与量調節の目安は確立していない。[8.2、9.2.1、9.8、13.1、16.6.1、16.6.3 参照]

|                                             | クレアチニンクリアランス（mL/min） |              |              |             |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                             | ≥50                  | 30～49        | 10～29        | <10         |
| 単純疱疹<br>造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制 | 500mgを12時間毎          | 500mgを12時間毎  | 500mgを24時間毎  | 500mgを24時間毎 |
| 带状疱疹<br>水痘                                  | 1000mgを8時間毎          | 1000mgを12時間毎 | 1000mgを24時間毎 | 500mgを24時間毎 |

|             |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 性器ヘルペスの再発抑制 | 500mgを24時間毎<br>なお、HIV 感染症の患者（CD4 リンパ球数 100/mm <sup>3</sup> 以上）には、500mgを12時間毎 | 500mgを24時間毎<br>なお、HIV 感染症の患者（CD4 リンパ球数 100/mm <sup>3</sup> 以上）には、500mgを12時間毎 | 250mgを24時間毎<br>なお、HIV 感染症の患者（CD4 リンパ球数 100/mm <sup>3</sup> 以上）には、500mgを24時間毎 | 250mgを24時間毎<br>なお、HIV 感染症の患者（CD4 リンパ球数 100/mm <sup>3</sup> 以上）には、500mgを24時間毎 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### 〈単純疱疹〉

7.3 本剤を5日間使用し、改善の兆しが見られないか、あるいは悪化する場合には、他の治療に切り替えること。ただし、初発型性器ヘルペスは重症化する場合があるため、本剤を10日間まで使用可能とする。

#### 〈帯状疱疹〉

7.4 目安として、皮疹出現後5日以内に投与を開始することが望ましい。

7.5 本剤を7日間使用し、改善の兆しが見られないか、あるいは悪化する場合には、他の治療に切り替えること。

#### 〈水痘〉

7.6 目安として、皮疹出現後2日以内に投与を開始することが望ましい。

7.7 成人においては本剤を5～7日間、小児においては本剤を5日間使用し、改善の兆しが見られないか、あるいは悪化する場合には、他の治療に切り替えること。

#### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

7.8 免疫正常患者において、性器ヘルペスの再発抑制に本剤を使用している際に再発が認められた場合には、1回500mg1日1回投与（性器ヘルペスの再発抑制に対する用法及び用量）から1回500mg1日2回投与（単純疱疹の治療に対する用法及び用量）に変更すること。治癒後は必要に応じ1回500mg1日1回投与（性器ヘルペスの再発抑制に対する用法及び用量）の再開を考慮すること。また、再発抑制に対して本剤を投与しているにもかかわらず頻回に再発を繰り返すような患者に対しては、症状に応じて1回250mg1日2回又は1回1000mg1日1回投与に変更することを考慮すること。[17.1.8、17.1.9 参照]

7.9 本剤を1年間投与後、投与継続の必要性について検討することが推奨される。[17.1.8、17.1.9 参照]

### 8. 重要な基本的注意

#### 〈効能共通〉

8.1 各効能又は効果に対し設定された用法及び用量で投与した場合、本剤投与時のアシクロビル曝露は、アシクロビル経口製剤投与時よりも高いことから、副作用の発現に留意すること。

8.2 意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。[7.2、9.2.1 参照]

#### 〈水痘〉

8.3 治療上の有益性と危険性を勘案して投与すること。本剤の使用経験は少ない。

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

##### 9.1.1 免疫機能の低下した患者

水痘の治療において、悪性腫瘍、自己免疫性疾患などの免疫機能の低下した患者に対する有効性及び安全性は確立していない。本剤の使用経験がない。

9.1.2 脱水症状をおこしやすいと考えられる患者（腎障害のある患者又は腎機能が低下している患者、高齢者、水痘患者等）適切な水分補給を行うこと。[9.2.1、9.8 参照]

#### 9.2 腎機能障害患者

##### 9.2.1 腎障害のある患者、腎機能が低下している患者

投与間隔及び投与量を調節し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。本剤の活性代謝物であるアシクロビルの

曝露量が増加した場合には、精神神経症状や腎機能障害が発現する危険性が高い。適切な減量投与が行われなかったために過量投与の状態となった腎障害患者において、精神神経症状や腎機能障害が発現した症例が報告されている。[7.2、8.2、9.1.2、11.1.3、11.1.4、13.1、16.6.1 参照]

### 9.3 肝機能障害患者

#### 9.3.1 肝障害のある患者

肝障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。[16.6.2 参照]

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。活性代謝物のアシクロビルにおいて、動物実験（ラット）の妊娠10日目に、母動物に腎障害のあらわれる大量（200mg/kg/day 以上）を皮下投与した実験では、胎児に頭部及び尾の異常が認められたと報告されている<sup>1)</sup>。

### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤投与後、活性代謝物のアシクロビルがヒト乳汁中へ移行することが報告されている。[16.3.2 参照]

### 9.7 小児等

9.7.1 動物実験（ラット）でバラシクロビルを経口投与したときの活性代謝物であるアシクロビルの曝露量は、成熟動物に比べて幼若動物で大きいことが報告されている。

9.7.2 低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

投与間隔及び投与量を調節し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。本剤は、活性代謝物のアシクロビルに変換された後、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いため血中アシクロビル濃度が高濃度で持続し、精神神経症状や腎機能障害が発現する危険性が高い。適切な減量投与が行われなかったために過量投与の状態となった高齢者において、精神神経症状や腎機能障害が発現した症例が報告されている。[7.2、9.1.2、11.1.3、11.1.4、13.1、16.6.3 参照]

### 10. 相互作用

活性代謝物のアシクロビルは、OAT1、MATE1 及び MATE2-K の基質である。[16.7.1 参照]

#### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等           | 臨床症状・措置方法                                                                                                                       | 機序・危険因子                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| プロベネシド         | 本剤の活性代謝物のアシクロビルの排泄が抑制され、アシクロビルの平均血漿中濃度曲線下面積（AUC）が48%増加するとの報告がある <sup>2)</sup> 。特に腎機能低下の可能性のある患者（高齢者等）には慎重に投与すること。               | プロベネシドは尿細管分泌に関わる OAT1 及び MATE1 を阻害するため、活性代謝物のアシクロビルの腎排泄が抑制されると考えられる。        |
| シメチジン          | 本剤の活性代謝物のアシクロビルの排泄が抑制され、アシクロビルの AUC が27%増加するとの報告がある <sup>2)</sup> 。特に腎機能低下の可能性のある患者（高齢者等）には慎重に投与すること。                           | シメチジンは尿細管分泌に関わる OAT1、MATE1 及び MATE2-K を阻害するため、活性代謝物のアシクロビルの腎排泄が抑制されると考えられる。 |
| ミコフェノール酸 モフェチル | 本剤の活性代謝物のアシクロビルとの併用により、アシクロビル及びミコフェノール酸 モフェチル代謝物の排泄が抑制され、両方の AUC が増加するとの報告がある <sup>3)</sup> 。特に腎機能低下の可能性のある患者（高齢者等）には慎重に投与すること。 | 活性代謝物のアシクロビルとミコフェノール酸 モフェチル代謝物が尿細管分泌で競合すると考えられる。                            |

| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法                                                     | 機序・危険因子                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| テオフィリン | 本剤の活性代謝物のアシクロビルとの併用により、テオフィリンの中毒症状があらわれることがある <sup>4)</sup> 。 | 機序は不明であるが、本剤の活性代謝物のアシクロビルがテオフィリンの代謝を阻害するためテオフィリンの血中濃度が上昇することが考えられる。 |

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

アナフィラキシーショック、アナフィラキシー（呼吸困難、血管性浮腫等）があらわれることがある。

#### 11.1.2 汎血球減少（0.73%）、無顆粒球症（0.24%）、血小板減少（0.36%）、播種性血管内凝固症候群（DIC）（頻度不明）、血小板減少性紫斑病（頻度不明）

#### 11.1.3 急性腎障害（0.12%）、尿管間質性腎炎（頻度不明） [9.2.1、9.8、13.1 参照]

#### 11.1.4 精神神経症状（1.09%）

意識障害（昏睡）、せん妄、妄想、幻覚、錯乱、痙攣、てんかん発作、麻痺、脳症等があらわれることがある。一般に精神神経症状は本剤の投与中止により回復する。[9.2.1、9.8、13.1 参照]

#### \* 11.1.5 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、多形紅斑（いずれも頻度不明）

#### 11.1.6 呼吸抑制、無呼吸（いずれも頻度不明）

#### 11.1.7 間質性肺炎（頻度不明）

#### 11.1.8 肝炎、肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

#### 11.1.9 急性膀胱炎（頻度不明）

### 11.2 その他の副作用

|        | 0.5%以上         | 0.5%未満 | 頻度不明            |
|--------|----------------|--------|-----------------|
| 過敏症    |                |        | 発疹、蕁麻疹、痒疹、光線過敏症 |
| 肝臓     | 肝機能検査値の上昇      |        |                 |
| 消化器    | 腹痛、下痢、腹部不快感、嘔気 | 嘔吐     |                 |
| 精神神経系  | 頭痛             | めまい    | 意識低下            |
| 腎臓・泌尿器 | 腎障害            | 排尿困難   | 尿閉              |

## 13. 過量投与

### 13.1 症状

急性腎障害、精神神経症状（錯乱、幻覚、激越、意識低下、昏睡等）が報告されている。[7.2、9.2.1、9.8、11.1.3、11.1.4 参照]

### 13.2 処置

血液透析により、アシクロビルを血中より除去することができる。[16.6.1 参照]

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、バラシクロビル（錠剤）高用量（8g/日）を用い、重度の免疫不全患者（特に進行性 HIV 感染症患者）における CMV 感染症予防に対する臨床試験が実施されている。この試験において、バラシクロビルが長期間にわたり投与された患者で、腎不全、微小血管溶血性貧血及び血小板減少（ときに併発）の発現が認められている。また、これらの症状はバラシクロビルの投与を受けていない同じ基礎疾患、合併症等を有する患者においても発現が認められている。

### 15.2 非臨床試験に基づく情報

#### 15.2.1 Ames 試験及びラット骨髓細胞染色体異常試験では陰性であったが、マウス骨髓小核試験では、高用量（経口投与、

500mg/kg、アシクロビルのヒト血漿中濃度の 26～51 倍相当）において小核出現頻度の軽度増加を認めた。

#### 15.2.2 マウスリンフォーマ細胞を用いた遺伝子突然変異試験では、代謝活性化系の存在下で 1000 $\mu$ g/mL 以上の濃度において弱い遺伝毒性（変異コロニー頻度の増加）を示した。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回投与

6 例の健康成人にバラシクロビル 500mg 又は 1000mg（錠剤）を単回経口投与した場合、その活性代謝物であるアシクロビルに主に肝臓において速やかに代謝され、血漿中アシクロビル濃度推移及び薬物動態パラメータは下記のとおりであった<sup>5)</sup>。




図 健康成人にバラシクロビル 500mg 又は 1000mg を単回経口投与した場合の血漿中バラシクロビル及びアシクロビル濃度

| バラシクロビル投与量 | 例数 | 単回経口投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ          |                          |                                        |                          |
|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|            |    | C <sub>max</sub><br>( $\mu$ g/mL) | T <sub>max</sub><br>(hr) | AUC <sub>0-∞</sub><br>( $\mu$ g·hr/mL) | t <sub>1/2</sub><br>(hr) |
| 500mg      | 6  | 3.66±0.83                         | 1.50±0.63                | 12.74±2.77                             | 2.96±0.41                |
| 1000mg     | 6  | 5.84±1.08                         | 2.17±0.61                | 22.26±5.73                             | 3.55±0.27                |

平均値±標準偏差

#### 16.1.2 反復投与

バラシクロビル 500mg を 1 日 2 回（12 時間毎）又は 1000mg（錠剤）を 1 日 3 回（8 時間毎）6 日間反復経口投与した場合、数回の投与で血漿中アシクロビル濃度は定常状態に達し、トラフ濃度の平均はそれぞれ 0.22～0.29  $\mu$ g/mL 及び 0.94～1.18  $\mu$ g/mL であり蓄積性は認められなかった<sup>5)</sup>。

#### 16.1.3 生物学的同等性

12 例の健康成人にバラシクロビル 500mg（顆粒剤 1g 又は錠剤 1 錠）を単回経口投与した場合、その活性代謝物である血漿中アシクロビル濃度の推移及び薬物動態パラメータは下記のとおりであった。両製剤は生物学的に同等である。




図 健康成人にバラシクロビル 500mg（顆粒剤 1g 又は錠剤 1 錠）を単回経口投与した場合の血漿中アシクロビル濃度



| パラシクロビル<br>投与量 | 投与<br>製剤 | 例数 | 単回経口投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ     |              |                                                            |                          |
|----------------|----------|----|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                |          |    | Cmax<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | Tmax<br>(hr) | AUC <sub>0-∞</sub><br>( $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ ) | t <sub>1/2</sub><br>(hr) |
| 500mg          | 顆粒剤 1g   | 12 | 3.66±0.73                    | 1.63±0.38    | 12.62±2.04                                                 | 3.08±0.53                |
|                | 錠剤 1錠    | 12 | 3.70±1.01                    | 1.63±0.43    | 11.98±2.51                                                 | 3.27±0.71                |

平均値±標準偏差

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

食事によりアシクロビルの最高血漿中濃度到達時間は僅かに遅延したが、AUCに有意な差を認めなかった<sup>6)</sup> (外国人データ)。

16.2.2 バイオアベイラビリティ

健康成人にパラシクロビル 1000mg を単回経口投与した場合のアシクロビルの生物学的利用率は 54.2%であった<sup>7)</sup> (外国人データ)。

16.3 分布

16.3.1 血漿蛋白結合率

*In vitro*でのパラシクロビル及びアシクロビル (活性代謝物) の血漿蛋白結合率は、それぞれ 13.5～17.9 及び 22～33%であった<sup>8)</sup>。

16.3.2 乳汁中濃度

ヒトにパラシクロビル 500mg 経口投与後、アシクロビルの乳汁中 Cmax は、母体血清中 Cmax の 0.5～2.3 倍 (中央値: 1.4) を示し、アシクロビルの乳汁中 AUC は、母体血清中 AUC の 1.4～2.6 倍 (中央値: 2.2) を示した<sup>9)</sup> (外国人データ)。<sup>[9.6 参照]</sup>

16.4 代謝

ヒト肝において、パラシクロビルの加水分解活性は高かった<sup>10)</sup>。

16.5 排泄

6 例の健康成人にパラシクロビル 1000mg (錠剤) を単回経口投与した場合、主な排泄経路は尿中であり、24 時間以内の尿中に未変化体、アシクロビル及び 9-カルボキシメトキシメチルグアニン (既知のアシクロビルの代謝物) がそれぞれ投与量の 0.4%、43.1% 及び 5.0%排泄された<sup>5)</sup>。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

透析患者 (クレアチニンクリアランス値平均 0.93mL/min) にパラシクロビル 1000mg を単回経口投与した場合の薬物動態パラメータは以下のとおりであった<sup>11)</sup>。また、4 時間の透析により血漿中のアシクロビルは約 70%が除去された。<sup>[7.2、9.2.1、13.2 参照]</sup>

| 被験者     | 例数 | 単回経口投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ     |                             |                          |                                                            |
|---------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|         |    | Cmax<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | Tmax <sup>注1)</sup><br>(hr) | t <sub>1/2</sub><br>(hr) | AUC <sub>0-∞</sub><br>( $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ ) |
| 腎機能障害患者 | 18 | 10.60±4.22                   | 2.00<br>(1.00-4.00)         | 22.2±5.0                 | 249.43±105.09                                              |

平均値±標準偏差、注1) 中央値 (範囲)

16.6.2 肝機能障害患者

健康成人及び肝機能障害患者にパラシクロビル 1000mg を単回経口投与した場合、アシクロビルの薬物動態パラメータに大きな違いは認められず、パラシクロビルは肝機能障害患者においても十分にアシクロビルへ加水分解された。この結果から、肝機能障害患者における用量調節は必要ないと考えられる (外国人データ)。<sup>[9.3.1 参照]</sup>

| 被験者                     | 例数 | Cmax<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | Tmax <sup>注1)</sup><br>(hr) | t <sub>1/2</sub><br>(hr) | AUC <sub>0-∞</sub><br>( $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ ) | CL/F<br>(mL/min) |
|-------------------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 健康成人                    | 12 | 4.79±1.24                    | 1.50<br>(0.50-2.50)         | 2.95±0.36                | 17.40±4.34                                                 | 703±175          |
| 肝機能障害 (中度)<br>(重度・腹水なし) | 12 | 7.75±2.45<br>*               | 1.01<br>(0.75-2.50)         |                          | 23.41±5.53*                                                |                  |
| (重度・腹水あり)               | 8  | 5.21±1.32                    | 1.50<br>(0.75-3.05)         | 2.93±0.39                | 22.31±11.56                                                | 518±117          |
|                         | 4  | 4.23±2.21                    | 1.50<br>(1.00-2.00)         | 2.70±0.40                | 19.42±6.99                                                 | 628±254          |

平均値±標準偏差、注1) 中央値、\*健康成人に対して有意差有り (p<0.05、分散分析)

16.6.3 高齢者

高齢者 (平均 72 歳、クレアチニンクリアランス値平均 57mL/min) にパラシクロビルを経口投与した場合、健康成人に比べ血漿中アシクロビルの Cmax 及び AUC はそれぞれ 15～20%及び 30～50%増

加した。この変化は高齢者での加齢に伴う腎機能低下によると考えられた<sup>12)</sup> (外国人データ)。<sup>[7.2、9.8 参照]</sup>

16.6.4 小児等

小児水痘患者 (1～9 歳) にパラシクロビル 25mg/kg (顆粒剤 50mg/kg)<sup>注)</sup> を 1 日 3 回 5 日間反復経口投与した場合の初回投与時の血漿中アシクロビル濃度推移及び薬物動態パラメータ、ならびに投与 5 日目の血漿中アシクロビル濃度は下記のとおりであった。投与 5 日目の血漿中アシクロビル濃度に反復投与による蓄積性は認められなかった<sup>13)</sup>。

注) 水痘における本剤の承認用量は、通常、小児には体重 1kg 当たりパラシクロビルとして 1 回 25mg を 1 日 3 回経口投与である。




図 小児水痘患者 (1～9 歳) にパラシクロビル 25mg/kg を 1 日 3 回 5 日間反復経口投与した場合の血漿中アシクロビル濃度

| 投与量<br>(mg/kg) | 年齢<br>(歳) | 例数                | 初回投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ       |                             |                                                            |                          |
|----------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                |           |                   | Cmax<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | Tmax <sup>注1)</sup><br>(hr) | AUC <sub>0-∞</sub><br>( $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ ) | t <sub>1/2</sub><br>(hr) |
| 25             | 1-9       | 11 <sup>注2)</sup> | 6.21±2.46                    | 1.03<br>(1.00-4.08)         | 16.90±6.99                                                 | 1.34±0.29                |

平均値±標準偏差

注1) 中央値 (最小値-最大値)

注2) AUC<sub>0-∞</sub>及び t<sub>1/2</sub>については、9 例

16.7 薬物相互作用

16.7.1 *In vitro*

本剤の活性代謝物であるアシクロビルは、OAT1、OAT2、MATE1 及び MATE2-K の基質であった<sup>14)-17)</sup>。<sup>[10、参照]</sup>

16.7.2 吸収過程における相互作用 (*in situ*)

ラット小腸にパラシクロビル 0.01mM を含む緩衝液を灌流した時、パラシクロビルの小腸透過係数はペプチドトランスポーター (PEPT) 1 の基質として知られる β-ラクタム系抗生物質 (アモキシシリン、アンピシリン、セファドロキシル、セファラジン; 各々 5mM) の高濃度の共存下で有意に低下したことから、パラシクロビルの吸収過程には PEPT1 が関与していることが示された<sup>18)</sup>。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈単純疱疹〉

17.1.1 国内第Ⅱ相試験

成人単純疱疹患者を対象とした本剤の用量設定試験 (計 56 施設、152 例) の結果は以下のとおりである<sup>19)</sup> (錠剤の成績)。

本剤の有効率 (1 回 500mg 1 日 2 回 5 日間投与) は 90.0% (36/40 例) であった。

本剤との関連性が疑われた副作用 (臨床検査値異常を含む) の発現状況は以下のとおりである。

| 安全性解析対象症例数 | 発現症例数 (件) | 主な種類 (件)                                                             |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 131        | 21 (27)   | ALT 上昇 (4)、頭痛 (2)、眠気 (2)、白血球減少 [血液] (2)、好酸球増多 (2)、AST 上昇 (2)、尿蛋白 (2) |

17.1.2 国内第Ⅲ相試験

成人単純疱疹患者を対象とした本剤のアシクロビル対照二重盲検比較試験 (計 59 施設、300 例、アシクロビル投与群: 1 回 200mg 1 日 5 回 5 日間投与) の結果は以下のとおりである<sup>20)</sup> (錠剤の成績)。

本剤の有効率 (1 回 500mg 1 日 2 回投与) は 95.9% (141/147 例) であった。

本剤又はアシクロビルとの関連性が疑われた副作用（臨床検査値異常を含む）の発現状況は以下のとおりである。

| 安全性解析対象症例数 |     | 発現症例数 (件) | 主な種類 (件)                                                        |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 本剤投与群      | 149 | 33 (55)   | 眠気 (7)、頭痛 (6)、白血球増多 [尿中] (5)、軟便 (3)、血小板増多 (3)                   |
| アシクロビル投与群  | 148 | 39 (50)   | 白血球増多 [尿中] (4)、不快感 [胃] (3)、下痢 (3)、嘔気 (3)、カリウム上昇 [血清] (3)、頭痛 (3) |

## 〈造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制〉

### 17.1.3 国内第Ⅲ相試験

成人及び小児造血幹細胞移植患者を対象とした本剤の非対照非盲検試験（計 11 施設、40 例）の結果（臨床効果）は以下のとおりである<sup>21)</sup>（錠剤及び顆粒剤の成績）。

成人には本剤を 1 回 500mg 1 日 2 回、小児には 1 回 25mg/kg 1 日 2 回（1 回最高用量は 500mg）<sup>注)</sup>、造血幹細胞移植施行 7 日前より施行後 35 日までの計 43 日間投与することにより、投与期間中の単純疱疹の発症を認めなかった。本試験において、副作用はみられなかった。

注) 造血幹細胞移植患者における本剤の承認用量は、通常、体重 10kg 未満の小児には 1 回 25mg/kg を 1 日 3 回、体重 10kg 以上の小児には 1 回 25mg/kg を 1 日 2 回経口投与である。

## 〈帯状疱疹〉

### 17.1.4 国内第Ⅱ相試験

皮疹出現後 72 時間以内の成人帯状疱疹患者を対象とした本剤の用量設定試験（計 56 施設、183 例）の結果は以下のとおりである<sup>22)</sup>（錠剤の成績）。

本剤の有効率（1 回 1000mg 1 日 3 回 7 日間投与）は 89.1%（49/55 例）であった。

本剤との関連性が疑われた副作用（臨床検査値異常を含む）の発現状況は以下のとおりである。

| 安全性解析<br>対象症例数 | 発現症<br>例数<br>(件) | 主な種類 (件)                                                                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172            | 35 (54)          | ALT 上昇 (9)、AST 上昇 (7)、BUN 上昇 (4)、白血球増多〔血液〕(3)、食欲不振 (2)、胃痛 (2)、不快感〔胃〕(2)、単球減少 (2)、総コレステロール減少 (2) |

### 17.1.5 国内第Ⅲ相試験

皮疹出現後 72 時間以内の成人帯状疱疹患者を対象とした本剤のアシクロビル対照二重盲検比較試験（計 58 施設、202 例、アシクロビル投与群：1 回 800mg 1 日 5 回 7 日間投与）の結果は以下のとおりである<sup>23)</sup>（錠剤の成績）。

本剤の有効率（1 回 1000mg 1 日 3 回投与）は 87.3%（89/102 例）であった。


本剤又はアシクロビルとの関連性が疑われた副作用（臨床検査値異常を含む）の発現状況は以下のとおりである。

| 安全性解析対象症例数 |     | 発現症例数 (件) | 主な種類 (件)                                                                                           |
|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本剤投与群      | 102 | 26 (39)   | ALT 上昇 (5)、BUN 上昇 (3)、血清クレアチニン上昇 (3)、倦怠感 (2)、腹痛 (2)、不快感 [胃] (2)、下痢 (2)、尿糖 (2)、AST 上昇 (2)、急性腎障害 (1) |
| アシクロビル投与群  | 98  | 22 (32)   | 倦怠感 (2)、腹部膨満感 (2)、ALT 上昇 (2)、尿蛋白 (2)、血小板増多 (2)、BUN 上昇 (1)                                          |

### 17.1.6 海外臨床試験

無作為化二重盲検比較試験において、50 歳以上の免疫機能が正常な成人帯状疱疹患者を対象に、本剤 1000mg 1 日 3 回 7 日間投与（384 例）又は 14 日間投与（381 例）、アシクロビル 800mg 1 日 5 回 7 日間投与（376 例）した 3 群間で帯状疱疹に伴う疼痛の消失推移を比較した。その結果、本剤 7 日間投与群及び 14 日間投与群はアシクロビル投与群に比べ PHN（帯状疱疹後神経痛、Post Herpetic Neuralgia）を含む帯状疱疹に伴う疼痛消失までの期間を有意に短縮した（ $p=0.001$  及び  $p=0.03$ 、Cox 比例ハザードモデル）。また、疼痛消失までの日数（中央値）は本剤 7 日間投与群で 38 日、本剤 14 日間投与群で 44 日、アシクロビル 7 日間投与群で 51 日であ

った。なお、本剤 7 日間投与群と 14 日間投与群の間には、有意な差が認められなかった<sup>24)</sup>（錠剤の成績）。




## 〈水痘〉

### 17.1.7 国内臨床試験

本剤の非対照非盲検試験（計 10 施設、43 例）の結果は以下のとおりである<sup>13)</sup>。

小児水痘患者に本剤を 1 回 25mg/kg 1 日 3 回、5 日間投与することにより、前胸部の皮疹数は、顕著な増加を認めることなく、投与 2 日目以後は減少を続ける推移を示した。なお、本試験の結果とアシクロビルを 1 回 20mg/kg 1 日 4 回、5 日間投与した試験における前胸部の皮疹数の推移とを比較した結果は以下のとおりである。



| バラシクロビル試験 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 投与後日数     | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 例数        | 41   | 41   | 41   | 41   | 41   | 41   | 40   |
| 平均値       | 30.7 | 54.6 | 57.0 | 49.4 | 40.9 | 35.1 | 26.4 |

| アシクロビル試験 |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 投与後日数    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 例数       | 51   | 22   | 28   | 38   | 27   | 25   | 19   |
| 平均値      | 45.5 | 38.1 | 48.1 | 51.5 | 36.7 | 25.3 | 18.2 |

本剤との関連性が疑われた副作用（臨床検査値異常を含む）の発現状況は以下のとおりである。

| 安全性解析対象症例数 | 発現症例数 (件) | 種類 (件)                       |
|------------|-----------|------------------------------|
| 43         | 2 (3)     | ALT 増加 (1)、AST 増加 (1)、便秘 (1) |

## 〈生殖器ヘルペスの再発抑制〉

### 17.1.8 海外臨床試験

成人免疫正常患者及び HIV に重複感染し免疫不全状態にある成人患者を対象とした用量設定試験の結果は以下のとおりである<sup>25) 26)</sup>（錠剤の成績）。[5.2、7.8、7.9 参照]

生殖器ヘルペスの未再発率、プラセボ群又はアシクロビル投与群と比較した再発リスク低下率は以下のとおりであった。

|        |         |                           | 未再発率                                           | 再発リスク低下率 (95%信頼区間)          |
|--------|---------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 免疫正常患者 | 52 週間投与 | 年間 6 回以上生殖器ヘルペスの再発を繰り返す患者 | 本剤 500mg 1 日 1 回投与群 (266 例)<br>プラセボ投与群 (134 例) | 40%<br>5.4%                 |
|        |         |                           |                                                | 71% <sup>注 1)</sup> (63~78) |

|          |         |                     |                                     |     |                                |
|----------|---------|---------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------|
| HIV 感染患者 | 48 週間投与 | 1 年以内に性器ヘルペスが再発した患者 | 本剤 500mg 1 日 2 回投与群 (355 例)         | 82% | 27% <sup>注 2)</sup><br>(-6~50) |
|          |         |                     | アシクロビル 1 回 400mg 1 日 2 回投与群 (349 例) | 78% |                                |

注 1) プラセボ投与群との比較

注 2) アシクロビル 1 回 400mg 1 日 2 回投与群との比較

なお、年間 6 回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す免疫正常患者に対して、本剤 1000mg 1 日 1 回投与<sup>注)</sup> (269 例) 又は本剤 250mg 1 日 2 回投与 (274 例) した場合の、52 週間投与時の未再発率は、それぞれ 48%、51%であり、プラセボ群と比較した再発リスク低下率 (95%信頼区間) は、それぞれ 78% (71~83)、79% (73~84) であった。  
注) 性器ヘルペスの再発抑制における本剤の承認用量は、通常、1 回 500mg を 1 日 1 回経口投与である。

本剤との関連性が疑われた副作用 (臨床検査値異常を含む) の発現状況は以下のとおりである。

|          |         |                          |                                    | 安全性解析対象症例数 | 発現症例数 (件) | 主な種類 (例数)                                           |
|----------|---------|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 免疫正常患者   | 52 週間投与 | 年間 6 回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者 | 本剤 500mg 1 日 1 回投与群                | 266        | 88 (178)  | 頭痛 (34)、嘔気 (20)、口内乾燥 (7)、下痢 (7)、腹痛 (6)              |
|          |         |                          | 本剤 1000mg 1 日 1 回投与群 <sup>注)</sup> | 269        | 96 (173)  | 頭痛 (34)、嘔気 (22)、下痢 (12)、腹痛 (11)、消化不良 (8)、浮動性めまい (6) |
|          |         |                          | 本剤 250mg 1 日 2 回投与群 <sup>注)</sup>  | 274        | 87 (173)  | 頭痛 (31)、嘔気 (13)、下痢 (9)、無力症 (8)、腹痛 (7)               |
| HIV 感染患者 | 48 週間投与 | 1 年以内に性器ヘルペスが再発した患者      | 本剤 500mg 1 日 2 回投与群                | 355        | 94 (191)  | 嘔気 (24)、下痢 (22)、頭痛 (19)、発疹 (14)、腹痛 (11)、嘔吐 (8)      |

#### 17.1.9 海外臨床試験

成人免疫正常患者及び HIV に重複感染し免疫不全状態にある成人患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験の結果は以下のとおりである<sup>27),28)</sup> (錠剤の成績)。[5.2、7.8、7.9 参照]  
性器ヘルペスの未再発率、プラセボ群又はアシクロビル投与群と比較した再発リスク低下率は以下のとおりであった。

|          |         |                          |                             | 未再発率 | 再発リスク低下率 (95%信頼区間)             |
|----------|---------|--------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|
| 免疫正常患者   | 16 週間投与 | 年間 8 回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者 | 本剤 500mg 1 日 1 回投与群 (288 例) | 69%  | 85% <sup>注 1)</sup><br>(79~89) |
|          |         |                          | プラセボ投与群 (94 例)              | 9.5% |                                |
| HIV 感染患者 | 6 ヶ月間投与 | 年間 4 回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者 | 本剤 500mg 1 日 2 回投与群 (194 例) | 81%  | 80% <sup>注 1)</sup><br>(70~87) |
|          |         |                          | プラセボ投与群 (99 例)              | 37%  |                                |

注 1) プラセボ投与群との比較


本剤との関連性が疑われた副作用 (臨床検査値異常を含む) の発現状況は以下のとおりである。

|          |         |                          |                     | 安全性解析対象症例数 | 発現症例数 (件) | 主な種類 (例数)                     |
|----------|---------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 免疫正常患者   | 16 週間投与 | 年間 8 回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者 | 本剤 500mg 1 日 1 回投与群 | 288        | 66 (112)  | 頭痛 (21)、嘔気 (16)、腹痛 (7)、下痢 (6) |
| HIV 感染患者 | 6 ヶ月間投与 | 年間 4 回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者 | 本剤 500mg 1 日 2 回投与群 | 194        | 23 (-)    | 頭痛 (9)、下痢 (5)、嘔気 (4)          |

#### 17.2 製造販売後調査等

##### 〈帯状疱疹〉

国内において実施された特定使用成績調査において、成人帯状疱疹患者に本剤を投与 (平均 2944mg/日×7.2 日) した 316 例の帯状疱疹に伴う疼痛の消失推移を検討した。その結果、疼痛消失までの日数 (中央値) は 35 日であり、PHN 移行率 (皮疹発現 90 日後の疼痛残存率) は 24.7% (78/316 例) であった (錠剤の成績)。



#### 17.3 その他

海外において実施された、性器ヘルペスの年間再発回数が 9 回以下の成人免疫正常患者を対象としたプラセボ対照無作為化二重盲検比較試験 (1484 例) の結果は以下のとおりである<sup>29)</sup> (錠剤の成績)。  
[5.1 参照]

8 ヶ月投与時のセックスパートナーへの HSV-2 による性器ヘルペス初感染発症率は、本剤 1 回 500mg 1 日 1 回投与群で 0.5% (4/743 例)、プラセボ投与群で 2.2% (16/741 例) であった。  
本剤との因果関係が疑われた副作用 (臨床検査値異常を含む) の発現状況は以下のとおりである。

| 安全性解析対象症例数 | 発現症例数 (件) | 主な種類 (例数)       |
|------------|-----------|-----------------|
| 519        | 63 (118)  | 頭痛 (30)、下痢 (11) |

注) 性器ヘルペスの再発抑制における本剤の承認用量は、通常、1 回 500mg を 1 日 1 回経口投与である。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

バラシクロビルはアシクロビルの L-バリルエステルであり、経口投与後、主に肝初回通過効果によりアシクロビルに変換されて抗ウイルス作用を発現する。アシクロビルは、単純ヘルペスウイルスあるいは水痘・帯状疱疹ウイルスが感染した細胞内に入ると、ウイルス性チミジンキナーゼにより一リン酸化された後、細胞性キナーゼによりリン酸化され、アシクロビル三リン酸 (ACV-TP) となる。ACV-TP は正常基質である dGTP と競合してウイルス DNA ポリメラーゼによりウイルス DNA の 3'末端に取り込まれると、ウイルス DNA 鎖の伸長を停止させ、ウイルス DNA の複製を阻害する<sup>30)~35)</sup>。

アシクロビルリン酸化の第一段階である一リン酸化は感染細胞内に存在するウイルス性チミジンキナーゼによるため、ウイルス非感染細胞に対する障害性は低いものと考えられる。

#### 18.2 抗ウイルス作用

##### 18.2.1 単純ヘルペスウイルスに対する作用

バラシクロビルの活性代謝物であるアシクロビルは、単純ヘルペスウイルス 1 型及び 2 型の *in vitro* における増殖を抑制し、IC<sub>50</sub> はそれぞれ 0.01 ~ 1.25 µg/mL 及び 0.01 ~ 3.20 µg/mL であった<sup>36),37)</sup>。また、単純ヘルペスウイルス 1 型を鼻面に接種したマウ



スに、バラシクロビル 1mg/mL を飲水に溶解し 4 日間投与すると、皮膚の病巣の悪化が抑制された。

### 18.2.2 水痘・带状疱疹ウイルスに対する作用

バラシクロビルの活性代謝物であるアシクロビルは、水痘・带状疱疹ウイルスの *in vitro* における増殖を抑制し、 $IC_{50}$  は 0.17～7.76  $\mu$ g/mL であった<sup>30),38),39)</sup>。また、サル水痘ウイルスを気道に接種したサルにバラシクロビル 200 及び 400mg/kg/日を 1 日 3 回に分割し連続 10 日間経口投与したところ、皮疹の発現が抑制され、血中ウイルス価が減少した。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

### 一般名称

バラシクロビル塩酸塩 (Valaciclovir Hydrochloride)

### 化学名

2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl L-valinate monohydrochloride

### 分子式

$C_{13}H_{20}N_6O_4 \cdot HCl$


### 分子量

360.80

### 性状

白色～微黄白色の結晶性の粉末である。水に溶けやすく、エタノール (99.5) に極めて溶けにくく、0.05mol/L 塩酸試液に溶ける。

### 化学構造式



## 22. 包装

50g [瓶、バラ]

## 23. 主要文献

- 1) Stahlmann R, et al. : Infection. 1987 ; 15 : 261-262
- 2) De Bony F, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 2002 ; 46 : 458-463
- 3) Bullingham RES, et al. : Clin Pharmacokinet. 1998 ; 34 : 429-455
- 4) Maeda Y, et al. : Biol Pharm Bull. 1996 ; 19 : 1591-1595
- 5) 東 純一ほか：臨床医薬. 1998 ; 14 : 2683-2700
- 6) Obenshain MK, et al. : Pharm Res. 1994 ; 11 (Suppl. 10) : S435
- 7) Soul-Lawton J, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 1995 ; 39 : 2759-2764
- 8) Perry CM, et al. : Drugs. 1996 ; 52 : 754-772
- 9) Sheffield JS, et al. : Am J Obstet Gynecol. 2002 ; 186 : 100-102
- 10) Burnette TC, et al. : J Biol Chem. 1995 ; 270 : 15827-15831
- 11) Hara K, et al. : Drug Metab Pharmacokinet. 2008 ; 23 : 306-312
- 12) Wang LH, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 1996 ; 40 : 80-85
- 13) 浅野喜造ほか：臨床医薬. 2007 ; 23 : 183-200
- 14) Cheng Y, et al. : Drug Metab Dispos. 2012 ; 40 : 617-624
- 15) Takeda M, et al. : J Pharmacol Exp Ther. 2002 ; 300 : 918-924
- 16) Nies AT, et al. : Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2012 ; 8 : 1565-1577
- 17) Tanihara Y, et al. : Biochem Pharmacol. 2007 ; 74 : 359-371
- 18) Sinko PJ, et al. : Biopharm Drug Dispos. 1998 ; 19 : 209-217
- 19) 新村真人ほか：臨床医薬. 2002 ; 18 : 1131-1154
- 20) 川島 真ほか：臨床医薬. 2002 ; 18 : 1155-1175
- 21) 陶山和明ほか：臨床医薬. 2014 ; 30 : 583-591
- 22) 新村真人ほか：臨床医薬. 1998 ; 14 : 2833-2866
- 23) 新村真人ほか：臨床医薬. 1998 ; 14 : 2867-2902
- 24) Beutner KR, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 1995 ; 39 : 1546-1553
- 25) Reitano M, et al. : J Infect Dis. 1998 ; 178 : 603-610
- 26) Conant MA, et al. : Int J STD AIDS. 2002 ; 13 : 12-21
- 27) Patel R, et al. : Genitourin Med. 1997 ; 73 : 105-109

- 28) DeJesus E, et al. : J Infect Dis. 2003 ; 188 : 1009-1016
- 29) Corey L, et al. : N Engl J Med. 2004 ; 350 : 11-20
- 30) Biron KK, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 1980 ; 18 : 443-447
- 31) Furman PA, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 1981 ; 20 : 518-524
- 32) St Clair MH, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 1980 ; 18 : 741-745
- 33) Biron KK, et al. : Herpesvirus NY, NY : Alan R Liss, Inc. 1984 : 677-685
- 34) Furman PA, et al. : J Virol. 1979 ; 32 : 72-77
- 35) Miller WH, et al. : J Biol Chem. 1980 ; 255 : 7204-7207
- 36) Al-Hasani AM, et al. : J Antimicrob Chemother. 1986 ; 18 (Suppl. B) : 113-119
- 37) McLaren C, et al. : Am J Med. 1982 ; 73 (1A) : 376-379
- 38) Machida H : Antimicrob Agents Chemother. 1986 ; 29 : 524-526
- 39) 武藤茂生ほか：小児科臨床. 1983 ; 36 : 2785-2790

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ

〒105-6333 東京都港区虎ノ門1-23-1

TEL 0120-982-001

FAX 03-6257-3633

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売

## サンドファーマ株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1

URL: <https://www.sandoz.jp/>

### 26.2 販売

## サンド株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1

URL: <https://www.sandoz.jp/>