

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	21900AMX00634000
販売開始	1986年10月

漢方製剤
クラシエ 十味敗毒湯 エキス錠
ジュウ ミ ハイ ドク トウ

貯法：室温保存
有効期間：3年

EKT-6

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	クラシエ十味敗毒湯エキス錠		
有効成分	本品1日量（18錠）中	日局サイコ	2.5g 日局カンゾウ 1.5g
	日局キヨウ	2.5g 日局ショウキヨウ 1.0g	
	日局センキュウ	2.5g 日局ケイガイ 1.5g	
	日局ブクリョウ	2.5g 日局ドクカツ 1.5g	
	日局ボウフウ	2.5g 日局オウヒ 2.5g	
	上記の混合生薬より抽出した十味敗毒湯エキス 粉末3,200mgを含有する。		
添加剤	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、 日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケ イ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミニマ グネシウム		

3.2 製剤の性状

剤形	素錠		
色	淡褐色～褐色		
におい	わずかに特異なにおい		
味	苦い		
外形	表面	裏面	側面
直径	9.2mm		
厚さ	4.9mm		
質量	330mg		
識別コード	EKT-6		

4. 効能又は効果

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急
性湿疹、水虫

6. 用法及び用量

通常、成人1日18錠を2～3回に分割し、食前又は食間に経
口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を
考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症
状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避
けること。

8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム
値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、
11.1.2 参照]

8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に
注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 著しく体力の衰えている患者
皮膚症状が悪化するおそれがある。

9.1.2 著しく胃腸の虚弱な患者

食欲不振、胃部不快感、恶心、下痢等があらわれるおそれ
がある。

9.1.3 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者

これらの症状が悪化するおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の
有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与す
ること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の
継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下して
いる。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・ 危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益氣湯 抑肝散 等	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低 カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわ れやすくなる。	グリチルリチ ン酸は尿細管 でのカリウム 排泄促進作用 グリチルリチ ン酸及びその塩 類を含有する製剤 グリチルリチ ン酸一アンモニ ウム・グリシン・L-シ スティン グリチルリチ ン酸一アンモニ ウム・グリシン・DL-メ チオニン配合錠 等
[8.2、11.1.1、11.1.2 参照]		カリウム血症 の結果として、 ミオパチーがあら われやすくなる。 [8.2、11.1.1、11.1.2 参照]

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適
切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、
浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれること
があるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリ
ウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参
照]

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれること
があるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・
麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリ

ウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒、尋麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、下痢等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

252錠（3錠×6連包×14シート）[分包]

1,764錠（3錠×6連包×98シート）[分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

〈文献請求先〉

クラシエ薬品株式会社 医薬学術統括部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03 (5446) 3352 FAX 03 (5446) 3371

〈製品情報お問合せ先〉

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03 (5446) 3334 FAX 03 (5446) 3374

〈受付時間〉 10:00~17:00 (土、日、祝日、弊社休業日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地(郵便番号635-0051)

26.2 発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)