**2025年11月改訂(第4版)

*2024年5月改訂(第3版、効能変更)

貯 法:室温保存 有効期間:5年 抗悪性腫瘍剤 —MEK阻害剤ビニメチニブ錠

日本標準商品分類番号 874291

承認番号 23100AMX00006000 販売開始 2019年2月

劇薬、処方箋医薬品注)

メクトビ®錠15mg

MEKTOVI® Tablets

注)注意-医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん 化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤 の使用が適切と判断される症例についてのみ投与するこ と。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性 及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3. 1 組成

有効成分	1 錠中 ビニメチニブ 15mg
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロース ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケ イ酸、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マ クロゴール4000、酸化チタン、タルク、黄色三二 酸化鉄、黒酸化鉄

3.2 製剤の性状

フィルムコーティング錠			
表面	裏面	側面	
	15		
約12.3			
約5.3			
約4.2			
約 247.7			
黄色~暗黄色			
♠ 15			
		表面 裏面 15 約12.3 約5.3 約4.2 約247.7 黄色~暗黄色	

4. 効能又は効果

- OBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫
- ○がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒 切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
- *Oがん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治 切除不能な甲状腺癌
- *OBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌

5. 効能又は効果に関連する注意 〈効能共通〉

5.1 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である:

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html

〈BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫〉

- 5.2 [17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.1 条昭]
- 5.3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
- 〈がん化学療法後に増悪した BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉
- 5. 4「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。 [17.1.2 参照]
- 5.5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
- 5.6 本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。
- *〈がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌〉
- *5.7 放射性ヨウ素による治療の適応となる患者においては、 当該治療を優先すること。
- *5.8 臨床試験に組み入れられた患者の病理組織型等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。 [17.1.3 参照]

6. 用法及び用量

*〈BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫、がん 化学療法後に増悪した BRAF遺伝子変異を有する根治切除不 能な甲状腺癌、BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲 状腺未分化癌〉

エンコラフェニブとの併用において、通常、成人にはビニメチニブとして1回45mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する

〈がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

エンコラフェニブ及びセツキシマブ (遺伝子組換え) との 併用において、通常、成人にはビニメチニブとして1回 45mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適 官減量する。

7. 用法及び用量に関連する注意

- * 〈BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫、がん 化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不 能な甲状腺癌、BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な甲 状腺未分化癌〉
- 7.1 本剤投与により副作用が発現した場合には、下記の基準を参考に、本剤を休薬、減量又は中止すること。
- **7.2** エンコラフェニブを休薬又は中止した場合には、本剤を それぞれ休薬又は中止すること。

減量して投与を継続する場合の投与量

減量レベル*1	投与量
通常投与量	45mg 1 日 2 回
1段階減量	30mg 1 日 2 回
2段階減量	15mg 1 日 2 回
3段階減量	投与中止

※1:減量を要した副作用がGrade 1以下に回復し、他に合併する副作用が ない場合には、減量時と逆の段階を経て増量可能

副作用発現時の用量調節基準

副作用	程度**2	処置		
網膜疾患、	Grade 2	Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する		
ぶどう膜炎		場合、同量又は1段階減量して投与。		
	Grade 3	Grade 2以下に回復するまで休薬。 再開する		
		場合、1段階減量して投与。Grade 3が継続		
		する場合、投与中止。		
	Grade 4	投与中止。		
網膜静脈 閉塞	Grade 1以上	投与中止。 		
眼障害(上	Grade 3	Grade 1以下に回復するまで休薬。28日以内		
記以外)		で回復し再開する場合、1段階減量して投		
		与。28日以内で回復しない場合、投与中止。		
	Grade 4	投与中止。		
AST増加、	Grade 2(血清ビリ	Grade 1以下に回復するまで休薬。14日以内		
ALT増加	ルビン上昇を伴わ	で回復し再開する場合、同量で投与。14日		
	ない場合)	超で回復し再開する場合、1段階減量して投		
		与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に		
		1段階減量して投与。		
	Grade 2(血清ビリ	Grade 1以下に回復するまで休薬。7日以内		
	ルビン上昇を伴う場	で回復し再開する場合、1段階減量して投		
	合)	与。7日以内で回復しない場合、投与中止。		
	Grade 3(血清ビリ	Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する		
	ルビン上昇を伴わ	場合、1段階減量して投与。		
	ない場合)	In text. I		
	Grade 3(血清ビリルビン上昇を伴う場	投与中止。		
血清CK上	合)及びGrade 4 Grade 3(筋症状又	 Grade 1以下に回復するまで休薬。 28日以内		
皿佣UK工 昇	はクレアチニント	で回復し再開する場合、1段階減量して投		
) 11	昇を伴う場合)及	「		
	ザGrade 4	一子。20日以内(国接しない場合、技子中止。		
駆出率減	左室駆出率が投与	│ │回復するまで休薬。28日以内で回復し再開		
少	前より10%以上減	する場合、1段階減量して投与。28日以内で		
	少、又は正常下限	回復しない場合、投与中止。		
	を下回る場合			
	Grade 3-4	投与中止。		
心電図QT	500msを超えるQTc	QTc値が500msを下回るまで休薬。再開す		
延長	値が認められ、かつ	る場合、1段階減量して投与。ただし、再発		
	投与前からの変化	した場合、投与中止。		
	が60ms以下の場合			
	500msを超えるQTc	投与中止。		
	値が認められ、かつ			
	投与前からの変化			
	が60msを超える場			
	合			
皮膚炎	Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以		
		下に回復するまで休薬。再開する場合、同		
		量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回		
		復後に1段階減量して投与。		
	Grade 3	Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する		
		場合、同量で投与。ただし、再発した場合、		
		休薬し回復後に1段階減量して投与。		
		投与中止。		
上記以外の 副作用	Grade 2	Grade 2が継続する場合、休薬又は減量を 考慮。		
	Grade 3	Grade 1以下に回復するまで休薬を考慮。28		
		日以内で回復し再開する場合、1段階減量し		
		て投与することを考慮。		
1	Grade 4	投与中止。		
		休薬し回復後に1段階減量して投与。 投与中止。 Grade 2が継続する場合、休薬又は減量 考慮。 Grade 1以下に回復するまで休薬を考慮。		
	0.1.4	て投与することを考慮。		
	Trade 4	17 子中 IF 。		

※2: Grade は NCI-CTCAE に準じる。

〈がん化学療法後に増悪した BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

- 7.3 本剤投与により副作用が発現した場合には、下記の基準 を参考に、本剤を休薬、減量又は中止すること。
- 7.4 エンコラフェニブを休薬又は中止した場合には、本剤を それぞれ休薬又は中止すること。

減量して投与を継続する場合の投与量

減量レベル*3	投与量
通常投与量	45mg 1 日 2 回
1段階減量	30mg 1 日 2 回
2段階減量	15mg 1 日 2 回
3段階減量	投与中止

※3:減量を要した副作用が Grade 1以下に回復し、他に合併する副作用が ない場合には、減量時と逆の段階を経て増量可能

副作用発現時の用量調節基準

	程度**4	処置
網膜疾患、	Grade 2	Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する
ぶどう膜炎		場合、同量又は1段階減量して投与。
	Grade 3	Grade 2以下に回復するまで休薬。 再開する
		場合、1段階減量して投与。Grade 3が継続
		する場合、投与中止。
	Grade 4	投与中止。
網膜静脈 閉塞	Grade 1以上	投与中止。
眼障害(上 記以外)	Grade 3	Grade 1以下に回復するまで休薬。21日以内 で回復し再開する場合、1段階減量して投 与。21日以内で回復しない場合、投与中止。
	Grade 4	投与中止。
AST增加、	Grade 2(血清ビリ	Grade 1以下に回復するまで休薬。14日以内
ALT增加	ルビン上昇を伴わ	で回復し再開する場合、同量で投与。14日
	ない場合)	超で回復し再開する場合、1段階減量して投 与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に 1月の既は場合、休薬
	Grade 2(血清ビリ	1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。7日以内
	ルビン上昇を伴う場	で回復し再開する場合、1段階減量して投
	合)	与。7日以内で回復しない場合、投与中止。
	Grade 3(血清ビリ	Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する
	ルビン上昇を伴わ	場合、1段階減量して投与。
	ない場合)	TATION ED CIX TO
	Grade 3(血清ビリ	
	ルビン上昇を伴う場	2 7 1 1120
	合)及びGrade 4	
血清CK上	Grade 3(筋症状又	Grade 1以下に回復するまで休薬。21日以内
昇	はクレアチニン上	で回復し再開する場合、1段階減量して投
	昇を伴う場合)及	与。21日以内で回復しない場合、投与中止。
	びGrade 4	
駆出率減	左室駆出率が投与	回復するまで休薬。21日以内で回復し再開
少	前より10%以上減	する場合、1段階減量して投与。21日以内で
	少、又は正常下限	回復しない場合、投与中止。
	を下回る場合	
	Grade 3-4	投与中止。
心電図QT	500msを超えるQTc	QTc値が500msを下回るまで休薬。再開す
延長	値が認められ、かつ	る場合、1段階減量して投与。ただし、再発
	投与前からの変化	した場合、投与中止。
	が60ms以下の場合	
	500msを超えるQTc	投与中止。
	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ	投与中止。
	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化	投与中止。
	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場	投与中止。
中國火	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合	
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、
皮膚炎	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。
	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。投与中止。
上記以外の	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。投与中止。Grade 2が継続する場合、休薬又は減量を
	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2 Grade 3	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 投与中止。 Grade 2が継続する場合、休薬又は減量を考慮。
上記以外の	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。投与中止。Grade 2が継続する場合、休薬又は減量を考慮。Grade 1以下に回復するまで休薬を考慮。21
上記以外の	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2 Grade 3	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 投与中止。 Grade 2が継続する場合、休薬又は減量を考慮。 Grade 1以下に回復するまで休薬を考慮。21日以内で回復し再開する場合、1段階減量し
上記以外の	500msを超えるQTc 値が認められ、かつ 投与前からの変化 が60msを超える場 合 Grade 2 Grade 3	症状が継続又は悪化する場合、Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 Grade 1以下に回復するまで休薬。再開する場合、同量で投与。ただし、再発した場合、休薬し回復後に1段階減量して投与。 投与中止。 Grade 2が継続する場合、休薬又は減量を考慮。

※4: Grade は NCI-CTCAE に準じる。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 重篤な眼障害が報告されているので、定期的に眼の異常 の有無を確認すること。また、眼の異常が認められた場合 には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導するこ と。[11.1.1 参照]
- 8.2 肝機能障害があらわれることがあるので、本剤投与中は

定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を確認すること。 [11.1.3 参照]

- 8.3 心機能障害があらわれることがあるので、本剤投与開始 前及び本剤投与中は適宜心機能検査(心エコー等)を行い、 患者の状態(左室駆出率(LVEF)の変動を含む)を確認す ること。[9.1.1、11.1.2 参照]
- 8.4 横紋筋融解症があらわれることがあるので、本剤投与中は定期的に CK、クレアチニン等の検査を行い、筋肉痛、脱力感、 CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等に十分注意すること。 [11.1.4 参照]
- 8.5 高血圧クリーゼがあらわれることがあるので、血圧の推 移等に十分注意して投与すること。「11.1.5 参照」
- 8.6 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電 解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に 観察すること。[11.1.7 参照]
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9. 1. 1 心疾患又はその既往歴のある患者 症状が悪化するおそれがある。[8.3、11.1.2 参照]
- 9.3 肝機能障害患者
- 9.3.1 中等度以上の肝機能障害のある患者

本剤の減量を考慮するとともに、患者の状態をより慎重に 観察し、副作用の発現に十分注意すること。本剤の血中濃 度が上昇するとの報告がある。[16.6.1 参照]

*9.4 生殖能を有する者

妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後2日間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。[9.5参照]

9. 5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。ラットを用いた動物試験において臨床曝露量の10倍に相当する用量から胎児体重の低値及び骨化遅延、ウサギを用いた動物試験において臨床曝露量の1.4倍に相当する用量から流産、着床後胚損失率の増加、生存胎児数の減少及び胎児体重の低値、1.9倍に相当する用量で催奇形性(心室中隔欠損及び血管異常)が認められた。[9.4参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。乳汁移行に関するデータはないが、本剤はBCRPの基質であるため、乳汁移行の可能性がある。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

*11.1.1 眼障害

網膜障害 (17.0%)、ぶどう膜炎 (虹彩炎、虹彩毛様体炎を含む) (2.1%) 等の眼障害があらわれることがある。[8.1 参照]

*11.1.2 心機能障害

左室機能不全 (0.7%)、駆出率減少 (4.8%) 等の心機能障害 があらわれることがある。[8.3、9.1.1 参照]

*11.1.3 肝機能障害

AST (5.3%)、ALT (6.9%)、 γ -GTP (6.7%)、ビリルビン (0.7%) 等の上昇を伴う肝機能障害があらわれることがある。[8.2 参照]

11. 1. 4 横紋筋融解症 (0.2%)

[8.4 参照]

*11. 1. 5 高血圧 (3.2%)、高血圧クリーゼ (0.2%) [8.5 参照]

*11.1.6 出血

消化管出血(3.7%)等の出血があらわれることがある。

11. 1. 7 腫瘍崩壊症候群 (頻度不明)

異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置 (生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行 うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観 察すること。[8.6 参照]

11.2 その他の副作用

		5%以上	5%未満
	血液及び リンパ系障害	貧血	リンパ球減少、好中球減少
	心臓障害		動悸、期外収縮、僧帽弁閉鎖不全 症
	耳及び 迷路障害		耳鳴、回転性めまい
	眼障害	霧視	眼瞼炎、色視症、眼乾燥、眼の障害、眼刺激、羞明、硝子体浮遊物、 変視症、視力障害、結膜炎
*	胃腸障害	下痢(39.9%)、 悪心(33.9%)、 嘔吐(21.1%)、 腹痛、便秘、 口内炎	腹部不快感、腹部膨満、大腸炎、口 内乾燥、消化不良、鼓腸、胃食道逆 流性疾患、膵炎、アミラーゼ増加
*	全身障害	疲労(26.1%)、 無力症、発熱	悪寒、冷感、インフルエンザ様疾患、 浮腫(末梢性浮腫等)、末梢腫脹、全 身健康状態低下、乾燥症、倦怠感
	免疫系障害		過敏症
	感染症及び 寄生虫症		毛包炎、爪真菌症、咽頭炎、ヘルペ ス感染、カンジダ感染、胃腸炎
	代謝及び 栄養障害	食欲減退	高コレステロール血症、血中リン減 少、高カリウム血症、高トリグリセリド 血症、高尿酸血症、低アルブミン血 症、リパーゼ増加、低ナトリウム血症
	筋骨格系及び 結合組織障害	関節痛、筋痙 縮、筋肉痛、 血中CK増加	関節炎、背部痛、筋力低下、成長痛、 筋骨格痛、四肢痛、頚部痛、四肢不 快感
	精神·神経系 障害	味覚異常、頭痛	顔面麻痺、視野欠損、不安、不眠症、睡眠障害、異常感覚、錯感覚、 失神、傾眠、末梢性ニューロパチー、 浮動性めまい、嗜眠
*	腎及び 尿路障害	血中クレアチニ ン増加	頻尿、急性腎障害
	呼吸器、胸郭 及び縦隔障害		咳嗽、呼吸困難、胸水
*	皮膚及び皮下 組織障害	ざ瘡様皮膚炎 (27.3%)、発疹 (湿疹、丘疹 等)(27.1%)、 脱毛症、皮膚 乾燥、過角化、 そう痒症	皮膚炎、毛髪障害、毛質異常、多 汗症、寝汗、光線過敏性反応、蕁 麻疹、尋常性白斑、皮膚腫瘤、皮膚 色素減少、皮膚色素過剰、脂肪織 炎、紅斑、掌蹠角皮症、皮膚剥脱
	血管障害		低血圧、ほてり
	その他		体重減少、体重増加、アクロコルドン、 メラノサイト性母斑、脂漏性角化症、 乳頭腫、扁平上皮癌

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう 指導すること。 PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食 道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤 な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.2 非臨床試験に基づく情報

15.2.1 ラットにおいて、臨床曝露量の4.4 倍に相当する用量から血中リンの高値を伴う諸臓器(腺胃、下垂体等)の鉱

質沈着が認められた。


15. 2. 2 *In vitro* 光毒性試験において陽性結果が得られた。また、マウスを用いた動物試験において光感作性が認められた。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16. 1. 1 反復投与

日本人の固形がん患者にビニメチニブ 45mg を 1日1回又は 1日2回反復投与した*1ときのビニメチニブの血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータを以下に示す。ビニメチニブの血漿中濃度は 14日以内に定常状態に達し、累積係数は 1.80 倍であった 1)。



試験日 (日)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	AUC _{0-12h} (ng·hr/mL)	AUC₀-∞ (ng·hr/mL)	T _{1/2} (hr)
1	559 ± 145	1.5	2030	2650	8.24
(n=9)		(0.5, 4)	± 475	± 698	±3.78
15	805 ± 274	1.5	3670	3380	4.11
(n=9)		(0.5, 2)	± 1100	± 370*2	±1.13

平均値 ± 標準偏差、Tmaxは中央値(最小値、最大値) ※1:1日目は1回投与し、2日目以降15日目まで1日2回投与した。 ※2:n=5

16. 2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人 (12 例) にビニメチニブ 45mg を空腹又は食後 (高脂肪食) に単回投与 $^{(\pm)}$ したとき、空腹時と比較して、食後投与時のビニメチニブの Cmax 及び AUC_0 ∞はそれぞれ 0.828 及び 0.993 倍であった $^{(2)}$ (外国人データ)。

16.3 分布

ビニメチニブのヒト血漿中蛋白結合率は97.2%、ヒト血液/血漿中濃度比は0.718であった³⁾ (in vitro)。

16.4 代謝

16. 4. 1 In vitro

ビニメチニブの主な代謝経路は UGT1A1 によるグルクロン 酸抱合であり、CYP1A2 及び CYP2C19 による N- 脱メチル 化も一部関与する $^{4,5)}$ 。

16. 4. 2 In vivo

16 5 排泄

健康成人 (6 例) に 14 C-ビニメチニブ 45 mg を単回投与 $^{(2)}$ したとき、投与後 360 時間までに投与放射能量の $^{62.3\%}$ が糞中に、 $^{31.4\%}$ が尿中に排泄された。尿中には投与後 360 時間までに投与放射能量の $^{6.5\%}$ が未変化体として排泄された 60 (外国人データ)。

16.6 特定の背景を有する患者

16. 6. 1 肝機能障害患者

肝機能障害患者**3 (軽度:6例、中等度:6例、重度:5例) 又は肝機能正常者(10例)にビニメチニブ45mg(重度肝機 能障害患者は15mg)を単回投与^{注)}したとき、軽度、中等度及び重度肝機能障害患者の血漿中非結合形ビニメチニブの投与量で補正したAUCo-120hは、肝機能正常者のそれぞれ1.22、3.80及び3.48倍であった。また、軽度、中等度及び重度肝機能障害患者の血漿中非結合形ビニメチニブの投与量で補正したCmaxは、肝機能正常者のそれぞれ1.28、2.63及び2.68倍であった⁷⁾(外国人データ)。[9.3.1参照]

※3: NCI-ODWG(National Cancer Institute - Organ Dysfunction Working Group)基準による分類(2011年8月時点)

16. 6. 2 腎機能障害患者

ビニメチニブの消失に腎排泄の寄与は小さい。重度腎機能障害患者(eGFR \leq 29mL/min/1.73m²、6例)又は腎機能正常者(6例)にビニメチニブ 45mg を単回投与 $^{(1)}$ したとき、重度腎機能障害患者の血漿中非結合形ビニメチニブの Cmax 及び AUCo $_{\odot}$ は、腎機能正常者のそれぞれ 1.43 及び 1.53 倍であった $^{(3)}$ (外国人データ)。

16.7 薬物相互作用

16.7.1 その他

(1) ラベプラゾールとの併用

健康成人 (15 例) にビニメチニブ 45mg をラベプラゾール 20mg と併用投与 $^{(\pm)}$ したとき、ビニメチニブ単独投与時と比較して、ビニメチニブの Cmax 及び AUC_0 ~はそれぞれ 82.6 及び 104.2% であり、ラベプラゾール併用による胃内 pH 上昇はビニメチニブの薬物動態に影響を及ぼさなかった $^{(9)}$ (外国人データ)。

(2) ミダゾラムとの併用

健康成人 (11 例) にビニメチニブ 30mg を 1 日 2 回 2 週間反復投与 $^{(\pm)}$ した後にミダゾラム 4mg を併用投与したとき、ミダゾラム単独投与時と比較して、ビニメチニブ 2 週間投与後のミダゾラムの Cmax 及び AUCo $_{\infty}$ はそれぞれ 0.925 及び 1.10 倍であり、ビニメチニブの明確な CYP3A4 誘導作用は認められなかった $^{(10)}$ (外国人データ)。

(3) In vitro

ビニメチニブは CYP2B6 を可逆的に阻害し、Ki 値は 1.73 μ mol/L であった $^{11)}$ 。ビニメチニブは P-gp 及び BCRP の基質である $^{12,\,13)}$ 。

(4) In vivo

ビニメチニブは主に UGT1A1 により代謝される。ビニメチニブの薬物動態は、UGT1A1 阻害作用を有するエンコラフェニブとの併用による大きな影響を受けなかった。なお、UGT1A1 を介した臨床薬物相互作用試験は実施していない。

*注) 本剤の承認された用法及び用量は、以下の通りである。

〈BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫、がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌、BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌〉

エンコラフェニブとの併用において、通常、成人にはビニメチニブと して1回45mgを1日2回経口投与する。

〈がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

エンコラフェニブ及びセツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはビニメチニブとして1回45mgを1日2回経口投与する。

17. 臨床成績


17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫〉

17. 1. 1 国際共同第Ⅲ相試験 (CMEK162B2301 試験)

BRAF V600E/K変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫患者577例(日本人患者11例を含む。本剤とエンコラフェニブ併用投与群192例、ベムラフェニブ群191例、エンコラフェニブ単独投与群194例)を対象に、ベムラフェニブを対照として本剤(1回45mgを1日2回)とエンコラフェニブ(450mgを1日1回)を併用投与したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である中央判定による無増悪生存期間(中央値[95%信頼区間])の主要解析結果は、本剤とエンコラフェニブの併用投与群で14.9 [11.0~18.5] カ月、ベムラフェニブ群で7.3 [5.6~8.2] カ月であり、本剤と

エンコラフェニブの併用投与はベムラフェニブに対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比 0.54 [95% 信頼区間: $0.41\sim0.71$]、p<0.0001 [層 別 \log -rank 検 定]、2016 年 5月19日データカットオフ) 14 。また、安全性評価対象となった192 例中 169 例(88.0%)に副作用(臨床検査値の異常を含む)が認められた。主な副作用は、悪心 59 例(30.7%)、下痢52 例(27.1%)、疲 労 48 例(25.0%)、血中 CK 増 m 41 例(21.4%)であった。[5.2 参照]



併用投与群 192 171 151 128 107 92 87 70 57 41 28 14 4 0 エンコラフェニブ群 194 162 125 99 84 71 68 55 41 28 17 10 1 0 ベムラフェニブ群 191 149 101 75 56 45 36 32 23 18 13 10 4 3


〈がん化学療法後に増悪した BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

17. 1. 2 国際共同第Ⅲ相試験(ARRAY-818-302 試験)

at risk数

- 次治療又は二次治療後に増悪した BRAF V600E 変異を有 する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者665例 (日本人患者20例を含む)を対象に、FOLFIRI*1及びセツ キシマブ※2の併用投与又はイリノテカン※3及びセツキシマ ブ※2の併用投与(対照群)を対照として①エンコラフェニ ブ※4、本剤※5及びセツキシマブ※2の併用投与(3剤群)又 は②エンコラフェニブ※4及びセツキシマブ※2の併用投与 (2剤群) 注) の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目 である全生存期間及び奏効率の結果※6を以下に示す。対照 群に対して3剤群及び2剤群は、全生存期間を統計学的に有 意に延長し、奏効率は統計学的に有意に高値であった (2019年2月11日データカットオフ)¹⁵⁾。また、3剤群及び 2剤群においてそれぞれ安全性評価対象となった222例中 208 例 (93.7%) 及び 216 例中 191 例 (88.4%) に副作用 (臨 床検査値の異常を含む)が認められた。主な副作用は、3剤 群で下痢118例(53.2%)、ざ瘡様皮膚炎107例(48.2%)、悪 心79例(35.6%)、疲劳61例(27.5%)、嘔吐57例(25.7%)、 2 剤群でざ瘡様皮膚炎60 例 (27.8%)、疲労49 例 (22.7%)、 悪心44例(20.4%)であった。「5.4参照]

- ※1:2週間を1サイクルとして、第1日目に①イリノテカン180mg/m²を90分かけて静脈内投与、②ホリナート400mg/m²を120分かけて静脈内投与、③フルオロウラシル400mg/m²を急速静脈内投与した後、フルオロウラシル2,400mg/m²を46~48時間かけて静脈内投与
- ※2:初回のみ400mg/m²を120分かけて、その後250mg/m²を60分かけて毎週静脈内投与
- ** *3:2週間を1サイクルとして、第1日目に180mg/m²を90分かけて 静脈内投与
 - ※4:300mgを1日1回投与
 - ※5:1回45mgを1日2回投与
 - ※6:本試験では、主要目的として、対照群に対する3剤群の奏効率 及び全生存期間の優越性が検証された後、階層的な検定手順に 従い、副次目的である対照群に対する2剤群の全生存期間及び 奏効率の解析が実施された。



		3剤群	2剤群	対照群
	症例数	224例	220例	221例
	中央値(月)	9.0	8.4	5.4
全生存期間	[95%信頼区間]	[8.0, 11.4]	[7.5, 11.0]	[4.8, 6.6]
土工行列间	ハザード比*7	0.52	0.60	
	[95%信頼区間]	[0.39, 0.70]	[0.45, 0.79]	-
	p值**8	< 0.0001	0.0002	
奏効率**9	症例数*10	111例	113例	107例
	奏効率(%)	26.1	20.4	1.9
	[95%信頼区間]	[18.2, 35.3]	[13.4, 29.0]	[0.2, 6.6]
	p値 ^{※11}	< 0.0001	< 0.0001	-

※7: 層別 Cox 比例ハザードモデル (対照群との比較)

※8: 層別 log-rank 検定 (対照群との比較)

※9: RECIST ガイドライン 1.1 版に基づく中央判定による CR 又は PR ※10: 本試験に最初に登録された 331 例が解析対象とされた

※11: Cochran-Mantel-Haenszel 検定 (対照群との比較)

なお、部分集団解析による 2 剤群に対する 3 剤群のハザード比 [95% 信頼区間]*12 は、ECOG PS 1 の集団 (3 剤 群 109 例、2 剤群 107 例)で 0.71 [0.51, 0.99]、転移臓器数≥3 の集団 (3 剤 群 111 例、2 剤 群 103 例)で 0.63 [0.45, 0.90]、CRP値>1mg/dLの集団 (3 剤 群 95 例、2 剤 群 79 例)で 0.65 [0.46, 0.92]、原発巣が未切除又は不完全切除の集団 (3 剤群 91 例、2 剤群 97 例)で 0.55 [0.38, 0.79]であり、3 剤群で OSが良好な傾向が認められた。一方、ECOG PS 0 の集団 (3 剤群 115 例、2 剤群 113 例 : 0.99 [0.66, 1.47])、転移臓器数≤2の集団 (3 剤群 113 例、2 剤群 122 例、2 剤群 139 例); 1.02 [0.71, 1.46])、原発巣が完全切除の集団 (3 剤群 133 例、2 剤群 123 例); 1.00 [0.71, 1.41])では、2 剤群と3 剤群の OSは同程度であった(2019 年8月15日データカットオフ)。

※12:全体集団において単変量 Cox 回帰モデル等により同定された、 OS に影響を及ぼすと考えられる5つの患者背景因子 (CRP値 >1 mg/dL、肝転移あり、CEA値> $5\mu g/L$ 、CA19-9値>35U/mL 及び転移臓器数≥3) で調整した結果

*〈がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌、BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌〉

*17.1.3 国内第 II 相試験 (ONO-7702/7703-03 試験)

VEGFR-TKIに不応、不耐又は不適応**¹³のBRAF V600遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌患者22例(分化型甲状腺癌(いずれも乳頭癌)患者17例[VEGFR-TKIに対する不適応例1例含む]、甲状腺未分化癌患者5例[VEGFR-TKIに対する不適応例1例含む])を対象に、本剤(1回45mgを1日2回)とエンコラフェニブ(450mgを1日1回)を併用投与したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全体集団における奏効率(RECIST ガイドライン1.1版に基づく独立中央判定によるCR又はPR)は54.5%(95%信頼区間:32.2~75.6%)であった(2022年10月26日データカットオフ)¹⁶。また、安全性評価対象となった22例中20例(90.9%)に副作用(臨床検査値の異常を含む)が認められた。主な副作用は、悪心10例(45.5%)、手掌・足底発赤知覚不全症候群6例(27.3%)、食欲減

退6例 (27.3%)、漿液性網膜剥離5例 (22.7%)、疲労5例 (22.7%) であった。[5.8参照]

	全体 (n=22)	分化型甲状腺癌 (n=17)	甲状腺未分化癌 (n=5)
完全奏効 (CR)	0	0	0
部分奏効 (PR)	12 (54.5%) **14	8 (47.1%)	4 (80.0%)
安 定 (SD)	10 (45.5%)	9 (52.9%)	1 (20.0%)
進 行 (PD)	0	0	0

- ※13:1 剤以上の VEGFR-TKI(レンバチニブ、ソラフェニブ、バンデタニブ等)に対して不応若しくは不耐となった、又は VEGFR-TKI による治療が不適応と判断された患者が対象とされた。また、VEGFR-TKI による治療が不適応の分化型甲状腺癌患者では、放射性ヨウ素による治療歴がある、又はヨウ素の取込みが認められず放射性ヨウ素による治療に不適応であることが必須とされた。
- ※14: VEGFR-TKI に対して不適応と判断された分化型甲状腺癌患者1 例及び甲状腺未分化癌患者1 例を含む。
- 注)本剤の承認されたがん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の用法及び用量は「エンコラフェニブ及びセツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはビニメチニブとして1回45mgを1日2回経口投与する。」である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ビニメチニブは、ヒト MEK1 及び MEK2 の活性化及びキナーゼ活性を阻害した $^{17)}$ 。また、ビニメチニブは、BRAF V600E 変異を有するヒト悪性黒色腫由来細胞株(A375、COLO 800 等)において、MAPK 経路のシグナル伝達分子 (ERK) のリン酸化を阻害した $^{18)}$ 。

18. 2 抗腫瘍効果

18. 2. 1 In vitro

ビニメチニブは、BRAF V600E 変異を有するヒト悪性黒色腫由来細胞株 (A375、COLO 800等)、BRAF V600D 変異を有するヒト悪性黒色腫由来WM-115 細胞株、BRAF V600K 変異を有するヒト悪性黒色腫由来IGR-1 細胞株及びBRAF V600E 変異を有するヒト結腸・直腸癌由来細胞株 (COLO 205、HT-29等)の増殖を抑制した ^{19,20)}。また、ビニメチニブとBRAF 阻害剤であるエンコラフェニブとの併用により、各薬剤単独と比較して、BRAF V600E 変異を有するヒト悪性黒色腫由来細胞株 (A375、COLO 800等)、BRAF V600K 変異を有するヒト悪性黒色腫由来 IGR-1 細胞株、BRAF V600E 変異を有するヒト結腸・直腸癌由来細胞株 (COLO 205、HT-29等)に対する増殖抑制作用が増強した ^{21,22)}。

18. 2. 2 *In vivo*

ビニメチニブは、A375 細胞株及び COLO 205 細胞株を皮下移植したヌードマウスにおいて、腫瘍増殖抑制作用を示した $^{2324)}$ 。また、ビニメチニブとエンコラフェニブとの併用により、各薬剤単独と比較して BRAF V600E 変異を有するヒト悪性黒色腫患者由来 HMEX1906 腫瘍組織片を皮下移植したヌードマウスにおける腫瘍増殖抑制作用が増強した $^{25)}$ 。さらに、ビニメチニブ、エンコラフェニブ及びセッキシマブの併用により、エンコラフェニブ又はセッキシマブ単独と比較して、HT-29 細胞株を皮下移植したヌードマウスにおける腫瘍増殖抑制作用が増強した $^{26)}$ 。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名:ビニメチニブ (Binimetinib)

化学名:5-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-*N*-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1*H*-benzimidazole-6carboxamide

分子式:C17H15BrF2N4O3

分子量:441.23

性 状:本品は白色〜灰白色の粉末であり、エタノール (99.5) に溶けにくく、水にほとんど溶けない。

化学構造式:

*21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

30 錠 [10 錠 (PTP) ×3] 100 錠 [10 錠 (PTP) ×10]

23. 主要文献

- 1) 小野薬品工業:国内第I相(CMEK162X1101)試験成績(社 内資料:2019年1月8日承認、CTD2.7.6.8、CTD2.7.2.2.2.2)
- 2) 小野薬品工業:海外第 I 相 (CMEK162A2103) 試験成績 (社内資料; 2019年1月8日承認、CTD2.7.6.16)
- 3) 小野薬品工業: In vitro血漿蛋白結合及び血球移行性(社内資料: 2019年1月8日承認、CTD2.6.4.4)
- 4) 小野薬品工業: In vitro代謝(社内資料; 2019年1月8日承認、CTD2.6.4.5)
- 5) 小野薬品工業:代謝酵素の推定(社内資料;2019年1月8 日承認、CTD2.6.4.5)
- 6) 小野薬品工業:海外マスバランス (CMEK162A2102) 試験成績 (社内資料: 2019年1月8日承認、CTD2.7.6.5)
- 7) 小野薬品工業: 肝機能障害患者における海外第I相 (CMEK162A2104) 試験成績 (社内資料; 2019年1月8日 承認、CTD2.7.6.12、CTD2.7.2.2.2.2)
- 8) 小野薬品工業: 腎機能障害患者における海外第 I 相 (ARRAY-162-106) 試験成績 (社内資料: 2019年1月8日 承認、CTD2.7.6.11)
- 9) 小野薬品工業:海外第I相(ARRAY-162-105) 試験成績 (社内資料:2019年1月8日承認、CTD2.7.6.15)
- 10) 小野薬品工業:海外第 I 相 (CMEK162A2105) 試験成績(社 内資料:2019年1月8日承認、CTD2.7.6.17、CTD2.7.2.2.2.2)
- 11) 小野薬品工業: CYP阻害作用(社内資料; 2019年1月8日 承認、CTD2.6.4.5)
- 12) 小野薬品工業: P-gp基質検討(社内資料:2019年1月8日 承認、CTD2.64.7)
- 13) 小野薬品工業: BCRP基質検討(社内資料; 2019年1月8日承認、CTD2.6.4.7)
- 14) 小野薬品工業: 国際共同第Ⅲ相 (CMEK162B2301) 試験成績(社内資料; 2019年1月8日承認、CTD2.7.6.19、CTD2.7.6.20)
- 15) 小野薬品工業: 国際共同第Ⅲ相 (ARRAY-818-302) 試験 成績(社内資料: 2020年11月27日承認、CTD2.7.6.6)
- *16) 小野薬品工業: 国内第Ⅱ相(ONO-7702/7703-03) 試験成績(社内資料)
 - 17) 小野薬品工業: MEKに対する阻害活性(社内資料: 2019 年1月8日承認、CTD2.6.2.2)
 - 18) 小野薬品工業:ERKのリン酸化に対する阻害作用(社内 資料;2019年1月8日承認、CTD2.6.2.2)
 - 19) 小野薬品工業:BRAF変異ヒト悪性黒色腫細胞の増殖に対 する抑制作用(社内資料;2019年1月8日承認、CTD2.6.2.2)
 - 20) 小野薬品工業: BRAF変異ヒト結腸・直腸癌細胞の増殖に対 する抑制作用(社内資料: 2020年11月27日承認、CTD2.6.2.2)
 - 21) 小野薬品工業:BRAF変異ヒト悪性黒色腫細胞の増殖に対するエンコラフェニブとの併用効果(社内資料;2019年1月8日承認、CTD2.6.2.2)
 - 22) 小野薬品工業:BRAF変異ヒト結腸・直腸癌細胞の増殖に

対するエンコラフェニブとの併用効果(社内資料;2020 年11月27日承認、CTD2.6.2.2)

- 23) 小野薬品工業:BRAF変異ヒト悪性黒色腫細胞移植マウス における抗腫瘍効果(社内資料;2019年1月8日承認、
- 24) 小野薬品工業: BRAF変異ヒト結腸・直腸癌細胞移植マウス における抗腫瘍効果(社内資料;2020年11月27日承認、
- 25) 小野薬品工業:BRAF変異ヒト悪性黒色腫細胞移植マウス におけるエンコラフェニブとの併用効果(社内資料;2019 年1月8日承認、CTD2.6.2.2)
- 26) 小野薬品工業:BRAF変異ヒト結腸・直腸癌細胞移植マウス におけるエンコラフェニブ及びセツキシマブとの併用効果 (社内資料; 2020年11月27日承認、CTD2.6.2.2)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小野薬品工業株式会社 くすり相談室 〒541-8564 大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号 電話 0120-626-190

26. 製造販売業者等

26. 1 製造販売



26. 2 提携

