

セネガシロップ<sup>®</sup>セネガシロップ「ケンエー」  
Senega Syrup「KENEL」

日本標準商品分類番号

872231

承認番号 16100AMZ01541

販売開始 1986年3月

## 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者 [10.1参照]

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

|      |   |
|------|---|
| 有効成分 | 100mL中<br>日局 セネガ 4g                       |
| 添加剤  | 白糖、安息香酸ナトリウム、ブチルパラベン、<br>プロピレングリコール、エタノール |

## 3.2 製剤の性状

|    |  |
|----|--|
| 性状 | 黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特<br>異なおいがあり、味は甘い。 |
|----|--|

## 4. 効能又は効果

下記疾患に伴う喀痰喀出困難

急性気管支炎、感冒、上気道炎

## 6. 用法及び用量

セネガシロップとして、通常成人1日10～35mLを3回に分割  
経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性  
が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又  
は中止を検討すること。

## 10. 相互作用

## 10.1 併用禁忌(併用しないこと)

| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法  | 機序・危険因子                    |
|--|--|----------------------------|
| ジスルフィラム<br>(ノックピン)<br>シアナミド<br>(シアナマイド)<br>カルモフル<br>プロカルバジン塩<br>酸塩<br>[2.参照] | これらの薬剤との<br>アルコール反応<br>(顔面潮紅、血圧降<br>下、悪心、頻脈、め<br>まい、呼吸困難、視<br>力低下等)を起こ<br>すおそれがある。 | 本剤はエタノール<br>を含有しているた<br>め。 |

## 10.2 併用注意(併用に注意すること)

| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法   | 機序・危険因子                    |
|--|---|----------------------------|
| N-メチルテトラゾ<br>ールチオメチル基<br>を有するセフェム<br>系抗生物質<br>セフメノキシム<br>塩酸塩<br>セフォペラゾン<br>ナトリウム<br>セフミノクスナ<br>トリウム水和物<br>セフメタゾール<br>ナトリウム<br>ラタモキシセフ<br>ナ<br>トリウム<br>メトロニダゾール | これらの薬剤との<br>アルコール反応<br>(顔面潮紅、悪心、<br>頻脈、多汗、頭痛<br>等)を起こすおそ<br>れがある。 | 本剤はエタノール<br>を含有しているた<br>め。 |

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、  
異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行  
うこと。

## 11.2 その他の副作用

|                   | 頻度不明          |
|-------------------|---------------|
| 消化器 <sup>注)</sup> | 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振 |

注) 大量投与によりあらわれることがある。

## 18. 薬効薬理

## 18.1 作用機序

咽頭などの粘膜刺激により舌咽神経を介して反射的に気道液分  
泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進し、去痰作用  
を現すと推定される<sup>1)</sup>。

## 20. 取扱い上の注意

本剤は原料に天然物が含まれているため、その産地や採集時期  
により、製品の色調やにおいが一定しないことがある。

## 22. 包装

500mL(ガラス瓶)

## 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書。廣川書店。2021:D-561-  
562

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部  
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号(06)6231-5822  
FAX番号(06)6204-0750

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

 健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号