

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

## Ca拮抗剤

### ジルチアゼム塩酸塩錠

処方箋医薬品<sup>(注)</sup>

## ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」

## ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Tablets [SAWAI]

日本標準商品分類番号

872171

(注)注意—医師等の処方箋により使用すること

### 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 重篤なうっ血性心不全の患者〔心不全症状を悪化させるおそれがある。〕
- 2.2 2度以上の房室ブロック、洞不全症候群(持続性の洞性徐脈(50拍/分未満)、洞停止、洞房ブロック等)のある患者〔本剤の心刺激生成抑制作用、心伝導抑制作用が過度にあらわれるおそれがある。〕
- 2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.4 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5参照]
- 2.5 アスナブレビルを含有する製剤、イバブラジン塩酸塩、ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者[10.1参照]

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

| 品 名           | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg<br>「サワイ」                | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg<br>「サワイ」                                      |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 有効成分<br>[1錠中] | 日局ジルチアゼム塩酸塩<br>30mg                    | 60mg                                                         |
| 添加剤           | 結晶セルロース、硬化油、ステアリン酸Mg、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース | 硬化油、ステアリン酸Mg、タルク、乳糖、ヒプロメロースフタル酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール |

#### 3.2 製剤の性状

| 品 名    | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg<br>「サワイ」                                                             | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg<br>「サワイ」                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外 形    |  |  |
| 剤 形    | 徐放性素錠                                                                               |                                                                                     |
| 性 状    | 白色                                                                                  |                                                                                     |
| 直径(mm) | 8.0                                                                                 | 8.0                                                                                 |
| 厚さ(mm) | 3.6                                                                                 | 3.6                                                                                 |
| 重量(mg) | 約185                                                                                | 約185                                                                                |
| 識別コード  | SW 089                                                                              | SW 093                                                                              |

### 4. 効能又は効果

- 狭心症、異型狭心症
- 本態性高血圧症(軽症～中等症)

### 6. 用法及び用量

#### 〈狭心症、異型狭心症〉

通常、成人にはジルチアゼム塩酸塩として1回30mgを1日3回経口投与する。効果不十分な場合には、1回60mgを1日3回まで増量することができる。

#### 〈本態性高血圧症(軽症～中等症)〉

通常、成人にはジルチアゼム塩酸塩として1回30～60mgを1日3回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 8. 重要な基本的注意

- 8.1 Ca拮抗剤の投与を急に中止したとき、症状が悪化した症例が報告されているので、本剤の休薬を要する場合は徐々に減量し、観察を十分に行うこと。
- また、患者に医師の指示なしに服薬を中止しないように注意すること。

- 8.2 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

- 9.1.1 うっ血性心不全の患者(重篤なうっ血性心不全の患者を除く)

心不全症状を悪化させるおそれがある。[11.1.2参照]

- 9.1.2 高度の徐脈(50拍/分未満)又は1度の房室ブロックのある患者

心刺激生成抑制作用、心伝導抑制作用が過度にあらわれるおそれがある。[11.1.1参照]

- 9.1.3 過度に血圧の低い患者

血圧を更に低下させるおそれがある。

#### 9.2 腎機能障害患者

- 9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

薬物の排泄が遅延し、作用が増強するおそれがある。

#### 9.3 肝機能障害患者

- 9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者

薬物の代謝が遅延し、作用が増強するおそれがある。

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。

動物実験で催奇形作用(マウス：骨格異常、外形異常)及び胎児毒性(マウス、ラット：致死)が報告されている。[2.4参照]

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒトの母乳中へ移行することが報告されている。

#### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

#### 9.8 高齢者

低用量から投与を開始するなど患者の状態を十分観察しながら慎重に投与することが望ましい。一般に高齢者では過度の降圧は好ましくないとされている。

### 10. 相互作用

本剤は主として代謝酵素チトクロームP450 3A4(CYP3A4)で代謝される。[16.4.2参照]

#### 10.1 併用禁忌(併用しないこと)

| 薬剤名等                                                                        | 臨床症状・措置方法                                         | 機序・危険因子                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| アスナブレビル(スンベブラ)<br>ダクラタスビル塩酸塩/<br>アスナブレビル/ベクラ<br>ビル塩酸塩(ジメン<br>シー)<br>[2.5参照] | アスナブレビルの血中濃度が上昇する。<br>肝胆道系の副作用が発現し、また重症化するおそれがある。 | 本剤がCYP3Aを阻害することにより、左記薬剤の代謝が阻害される。                                    |
| イバブラジン塩酸塩(コラン)<br>[2.5参照]                                                   | 過度の徐脈があらわれることがある。                                 | 本剤がCYP3Aを阻害することにより、左記薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇する。<br>左記薬剤の心拍数減少作用を相加的に増強する。 |

| 薬剤名等                                | 臨床症状・措置方法                              | 機序・危険因子                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ロミタビドメシル酸塩<br>(ジャクスタピッド)<br>[2.5参照] | ロミタビドメシル酸塩<br>の血中濃度が著しく上<br>昇するおそれがある。 | 本剤がCYP3Aを阻害す<br>ることにより、左記薬<br>剤の代謝が阻害される。 |

## 10.2 併用注意(併用に注意すること)

| 薬剤名等                                                        | 臨床症状・措置方法                                                                                                                                                                                                                            | 機序・危険因子                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 降圧作用を有する薬剤<br>(降圧剤、硝酸剤等)                                    | 定期的に血圧を測定<br>し、用量を調節する。                                                                                                                                                                                                              | 相加的に作用(降圧作<br>用)を増強させると考え<br>られる。                                                                                              |
| $\beta$ 遮断剤(ビソプロロー<br>ル、フルマラール、プロブ<br>ラノール、塩酸塩、ア<br>テノロール等) | 徐脈、房室ブロック、<br>洞房ブロック等があら<br>われることがある。<br>定期的に脈拍数を測定<br>し、必要に応じて心電<br>図検査を行い、異常が<br>認められた場合には減<br>量若しくは投与を中止<br>する。                                                                                                                   | 相加的に作用(心刺激生<br>成・伝導抑制作用、陰<br>性変力作用、降圧作用)<br>を増強させると考えら<br>れる。特にジギタリス<br>製剤との3剤併用時には<br>注意を要する。                                 |
| ラウオルフィア製剤(レ<br>セルピン等)                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| ジギタリス製剤(ジゴキ<br>シン、メチルジゴキシ<br>ン)                             | 徐脈、房室ブロック等<br>があらわれることがあ<br>る。また、これらの不<br>整脈を含めジギタリス<br>製剤の血中濃度上昇に<br>よる中毒症状(悪心・嘔<br>吐、頭痛、めまい、視<br>覚異常等)があらわれ<br>ることがある。<br>定期的にジギタリス中<br>毒の有無の観察、心電<br>図検査を行い、必要に<br>応じてジギタリス製剤<br>の血中濃度を測定し、<br>異常が認められた場合<br>には減量若しくは投与<br>を中止する。 | 相加的に作用(心刺激生<br>成・伝導抑制作用)を増<br>強させると考えられ<br>る。特に $\beta$ 遮断剤との3<br>剤併用時には注意を要<br>する。<br>また、本剤はジギタリス<br>製剤の血中濃度を上<br>昇させると考えられる。 |
| 抗不整脈薬(アミオダロ<br>ン、塩酸塩、メキシレチ<br>ン、塩酸塩等)                       | 徐脈、房室ブロック、<br>洞停止等があらわれ<br>ることがある。<br>定期的に脈拍数を測定<br>し、必要に応じて心電<br>図検査を行い、異常が<br>認められた場合には減<br>量若しくは投与を中止<br>する。                                                                                                                      | 相加的に作用(心刺激生<br>成・伝導抑制作用)を増<br>強させると考えられる。                                                                                      |
| 麻酔剤(イソフルラン<br>等)                                            | 徐脈、房室ブロック、<br>洞停止等があらわれ<br>ることがある。<br>心電図をモニターし、<br>異常が認められた場合<br>には減量若しくは投与<br>を中止する。                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| スフィンゴシン1-リン<br>酸受容体調節剤<br>フィンゴリド、塩酸<br>塩、オザニド、塩酸塩等          | スフィンゴシン1-リン<br>酸受容体調節剤の投与<br>開始時に併用すると重<br>度の徐脈や心ブロック<br>が認められることがあ<br>る。                                                                                                                                                            | 共に徐脈や心ブロック<br>を引き起こすおそれ<br>がある。                                                                                                |
| アプリンジン、塩酸塩                                                  | 両剤の血中濃度上昇に<br>よる症状(徐脈、房室ブ<br>ロック、洞停止、振<br>戦、めまい、ふらつき<br>等)があらわれることが<br>ある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、必要に応じて心<br>電図検査を行い、異常<br>が認められた場合には<br>減量若しくは投与を中<br>止する。                                                                             | 共通の代謝酵素(チトロ<br>ームP450)に影響を<br>及ぼし合い、両剤の血<br>中濃度を上昇させると<br>考えられる。                                                               |

※※

| 薬剤名等                                            | 臨床症状・措置方法                                                                                                               | 機序・危険因子                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ジヒドロピリジン系Ca<br>拮抗剤(ニフェジピン、<br>アムロジピンベシル酸<br>塩等) | ジヒドロピリジン系Ca<br>拮抗剤の血中濃度上昇<br>による症状(降圧作用の<br>増強等)があらわれるこ<br>とがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。 | これらの薬剤の代謝酵<br>素(チトロームP450)<br>を阻害することによ<br>り、これらの薬剤の血<br>中濃度を上昇させると<br>考えられる。 |
| シンバスタチン                                         | シンバスタチンの血中<br>濃度上昇による横紋筋<br>融解症やミオパシーが<br>発現することがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には投与を中止<br>する。                   |                                                                               |
| トリアゾラム                                          | トリアゾラムの血中濃<br>度上昇による症状(睡眠<br>時間の延長等)があら<br>われることがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。             |                                                                               |
| ミダゾラム                                           | ミダゾラムの血中濃度<br>上昇による症状(鎮静・<br>睡眠作用の増強等)が<br>あらわれることがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。           |                                                                               |
| カルバマゼピン                                         | カルバマゼピンの血中<br>濃度上昇による症状(眠<br>気、悪心・嘔吐、眩暈<br>等)があらわれることが<br>ある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。    |                                                                               |
| セレギリン、塩酸塩                                       | セレギリン、塩酸塩の作<br>用、毒性が増強するこ<br>とがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。                               |                                                                               |
| テオフィリン                                          | テオフィリンの血中濃<br>度上昇による症状(悪心<br>・嘔吐、頭痛、不眠<br>等)があらわれることが<br>ある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。     |                                                                               |
| シロスタゾール                                         | シロスタゾールの作用<br>が増強することがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。                                        |                                                                               |
| アビキサバン                                          | アビキサバンの作用が<br>増強することがある。<br>定期的に臨床症状を観<br>察し、異常が認められ<br>た場合には減量若しく<br>は投与を中止する。                                         |                                                                               |

| 薬剤名等                                     | 臨床症状・措置方法                                                                                                      | 機序・危険因子                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビノレルビン酒石酸塩                               | ビノレルビン酒石酸塩の作用が増強することがある。<br>定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。                                            | これらの薬剤の代謝酵素(チトクロームP450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。                                               |
| シクロスポリン                                  | シクロスポリンの血中濃度上昇による症状(腎障害等)があらわれることがある。<br>定期的に臨床症状を観察し、また、シクロスポリンの血中濃度を測定し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。           |                                                                                                          |
| タクロリムス水和物                                | タクロリムスの血中濃度上昇による症状(腎障害等)があらわれることがある。<br>定期的に臨床症状を観察し、また、タクロリムスの血中濃度を測定し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。             |                                                                                                          |
| フェニトイン                                   | フェニトインの血中濃度上昇による症状(運動失調、めまい、眼振等)があらわれることがある。<br>定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。<br>また、本剤の作用が低下することがある。 | フェニトインの代謝酵素(チトクロームP450)を阻害することにより、フェニトインの血中濃度を上昇させると考えられる。また、フェニトインが本剤の代謝を促進することにより、本剤の血中濃度を低下させると考えられる。 |
| シメチジン<br>HIVプロテアーゼ阻害剤(リトナビル、サキナビルメシル酸塩等) | 本剤の血中濃度上昇による症状(降圧作用の増強、徐脈等)があらわれることがある。<br>定期的に臨床症状を観察し、必要に応じて心電図検査を行い、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。              | これらの薬剤が本剤の代謝酵素(チトクロームP450)を阻害することにより、本剤の血中濃度を上昇させると考えられる。                                                |
| リファンピシン                                  | 本剤の作用が低下することがある。<br>定期的に臨床症状を観察し、また、可能であれば本剤の血中濃度を測定し、異常が認められた場合には、他剤への変更あるいは本剤を増量するなどの適切な処置を行う。               | リファンピシンが本剤の代謝酵素(チトクロームP450)を誘導することにより、本剤の血中濃度を低下させると考えられる。                                               |
| 筋弛緩剤(バンクロニウム臭化物、ベクロニウム臭化物等)              | 筋弛緩剤の作用が増強することがある。<br>筋弛緩作用に注意し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。                                                     | 本剤が神経筋接合部において、シナプス前からのアセチルコリン放出を抑制させると考えられる。                                                             |

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 完全房室ブロック、高度徐脈等(いずれも頻度不明)

初期症状として徐脈、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、アトロピ

ン硫酸塩水和物、イソプレナリン等の投与や必要に応じて心臓ペーシング等の適切な処置を行うこと。[9.1.2、13.1参照]

#### 11.1.2 うっ血性心不全(頻度不明)

異常が認められた場合には投与を中止し、強心剤の投与等の適切な処置を行うこと。[9.1.1参照]

#### 11.1.3 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、紅皮症(剥脱性皮膚炎)、急性汎発性発疹性膿疱症(いずれも頻度不明)

紅斑、水疱、膿疱、そう痒、発熱、粘膜疹等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### 11.1.4 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST、ALT、 $\gamma$ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがある。

### 11.2 その他の副作用

|       | 0.1～5%未満                    | 0.1%未満      | 頻度不明                             |
|-------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 循環器   | 徐脈、房室ブロック、顔面潮紅、めまい、動悸、浮腫    | 洞停止、血圧低下、胸痛 | 洞房ブロック                           |
| 精神神経系 | 倦怠感、頭痛、頭重感、脱力感、眠気、不眠        |             | パーキンソン様症状、こむらがえり                 |
| 肝臓    | AST上昇、ALT上昇                 | 黄疸          | ALP上昇、LDH上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、肝腫大 |
| 過敏症   | 発疹、そう痒、多形性紅斑様皮疹             | 蕁麻疹         | 光線過敏症、膿疱                         |
| 消化器   | 胃部不快感、便秘、腹痛、胸やけ、嘔気、軟便、下痢、口渇 | 食欲不振        |                                  |
| 血液    |                             |             | 血小板減少、白血球減少                      |
| その他   |                             |             | 歯肉肥厚、女性化乳房、しびれ                   |

## 13. 過量投与

### 13.1 症状

徐脈、完全房室ブロック、心不全、低血圧等があらわれることがある。[11.1.1参照]

### 13.2 処置

透析によって除去されない。下記等の適切な処置を行うこと。

・徐脈、完全房室ブロック

アトロピン硫酸塩水和物、イソプレナリン等の投与や心臓ペーシングを適用すること。

・心不全、低血圧

強心剤、昇圧剤、輸液等の投与や補助循環を適用すること。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 かみ砕かず服用するよう指導すること。徐放性が損なわれるおそれがある。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回投与


健康成人男子8例にジルチアゼム塩酸塩錠30mg、2錠(ジルチアゼム塩酸塩として60mg)を単回経口投与したとき、投与後3～5時間で最高血漿中濃度(約50ng/mL)に達し、以後約4.5時間の半減期で減少する<sup>1)</sup>。

#### 16.1.2 生物学的同等性試験

〈ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」〉

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」とヘルベッサー錠30を健康成人男子にそれぞれ1錠(ジルチアゼム塩酸塩として30mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中ジルチアゼム濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>2)</sup>。


| 各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ  |                 |              |                          |                                     |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                     | Cmax<br>(ng/mL) | Tmax<br>(hr) | T <sub>1/2</sub><br>(hr) | AUC <sub>0-24hr</sub><br>(ng・hr/mL) |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 22.5±8.3        | 3.2±1.3      | 3.6±0.9                  | 172.1±59.7                          |
| ヘルベッサー錠30           | 22.7±7.6        | 3.0±1.0      | 4.7±2.2                  | 177.4±41.9                          |
| (Mean±S.D.)         |                 |              |                          |                                     |



#### 〈ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」〉

ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」とヘルベッサー錠60を健康成人男子にそれぞれ1錠（ジルチアゼム塩酸塩として60mg）空腹時単回経口投与（クロスオーバー法）し、血漿中ジルチアゼム塩酸塩濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>3)</sup>。

| 各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ  |                 |              |                          |                                     |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                     | Cmax<br>(ng/mL) | Tmax<br>(hr) | T <sub>1/2</sub><br>(hr) | AUC <sub>0-24hr</sub><br>(ng・hr/mL) |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 49.8±15.4       | 3.3±0.5      | 7.5±2.0                  | 444.7± 96.5                         |
| ヘルベッサー錠60           | 51.4±18.9       | 3.7±0.7      | 6.4±1.1                  | 451.1±148.6                         |
| (Mean±S.D.)         |                 |              |                          |                                     |



血漿中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

### 16.4 代謝

#### 16.4.1 代謝経路

健康成人男子に経口投与したときの主な代謝経路は、酸化的脱アミノ化、酸化的脱メチル化、脱アセチル化、抱合化である<sup>4)</sup>。

#### 16.4.2 代謝酵素

ジルチアゼム塩酸塩は主として代謝酵素チトクロームP450 3A4（CYP3A4）で代謝される<sup>5)</sup>。[10.参照]

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 〈狭心症、異型狭心症〉

##### 17.1.1 国内臨床試験

狭心症に対して、二重盲検比較試験を含む臨床試験により<sup>6) - 9)</sup>、また、異型狭心症に対して、ホルター心電図による検討を含む一般臨床試験により<sup>10)</sup>、ジルチアゼム塩酸塩の有用性が認められた。

#### 〈本態性高血圧症〉

##### 17.1.2 国内第Ⅲ相試験

ジルチアゼム塩酸塩180mg/日又はプラセボを1日3回各2週間計4週間経口投与した二重盲検交叉比較試験の結果、ジルチアゼム塩酸塩の有用度は各投与期において61.3% (19/31例) 及び100.0% (23/23例) であった<sup>11)</sup>。

##### 17.1.3 国内第Ⅲ相試験

ジルチアゼム塩酸塩180mg/日又はプラセボを1日3回6週間経口投与した二重盲検比較試験の結果、ジルチアゼム塩酸塩の有用度は50.0% (24/48例) であった。副作用発現頻度は10.2% (5/49例) であった<sup>12)</sup>。

##### 17.1.4 国内第Ⅲ相試験

ジルチアゼム塩酸塩90～180mg/日を1日3回、又はレセルピンを1日1～3回、12週間経口投与した二重盲検比較試験の結果、ジルチアゼム塩酸塩の有用度は68.4% (39/57例) であった。副作用発現頻度は12.3% (7/57例) であった<sup>13)</sup>。

##### 17.1.5 国内第Ⅲ相試験

ジルチアゼム塩酸塩90～180mg/日又はプロプラノロールを1日3回12週間経口投与した二重盲検比較試験の結果、ジルチアゼム塩酸塩の有用度は72.3% (86/119例) であった。副作用発現頻度は13.6% (17/125例) であった。主な副作用は頭重・頭重感1.6% (2/125例) であった<sup>14)</sup>。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

ジルチアゼム塩酸塩は冠血管及び末梢血管等の血管平滑筋細胞へのCa<sup>2+</sup>流入を抑制することにより、血管を拡張し、心筋虚血改善作用及び降圧作用を示す。

### 18.2 心筋虚血に対する作用

#### 18.2.1 心筋の酸素需給バランス改善作用

(1)太い冠血管及び副血行路を拡張し、心筋虚血部への血流を増加させる（イヌ）<sup>15) - 18)</sup>。

(2)冠動脈スパズムを抑制する（サル）<sup>19)</sup>。

(3)末梢血管拡張に基づく後負荷軽減、及び心拍数減少により、心拍出量を減らさずに心筋酸素消費量を抑制する（イヌ）<sup>20)</sup>。

#### 18.2.2 心筋保護作用

心筋虚血時、細胞内へのCa<sup>2+</sup>過剰流入を抑制することにより、心機能・心筋エネルギー代謝を保持し梗塞巣の広がりを縮小する（ラット）<sup>21)</sup>。

### 18.3 血圧に対する作用

**18.3.1 正常血圧にはほとんど影響せず、高い血圧を下げ**（ラット、血圧正常者：男性、本態性高血圧症患者：男性及び女性）、運動負荷による血圧の上昇を抑制する（本態性高血圧症患者：男性及び女性）<sup>22) - 25)</sup>。

**18.3.2 脳、腎の血流量を減少させず、血圧を低下させる**（イヌ、脳血管障害合併高血圧症患者：男性及び女性、高血圧症患者：男性及び女性）<sup>26) - 29)</sup>。

**18.3.3 血圧の低下とともに、心筋肥大、血管肥厚を抑制する**（ラット）<sup>30)</sup>。

### 18.4 心刺激生成及び心伝導系に及ぼす影響

洞結節の自発周期と房室結節内伝導(AH)時間を延長するが、ヒス－ブルキン系伝導(HV)時間には影響しない（イヌ、二次孔型心房中隔欠損症患者、早期興奮症候群患者、発作性上室性頻拍患者、促進型心室固有調律患者）<sup>20)、31)、32)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：ジルチアゼム塩酸塩(Diltiazem Hydrochloride)


化学名：(2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetate monohydrochloride

分子式：C<sub>22</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>S・HCl

分子量：450.98

融点：210～215℃（分解）

構造式：



**性状：**白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはない。ギ酸に極めて溶けやすく、水、メタノール又はクロロホルムに溶けやすく、アセトニトリルにやや溶けにくく、無水酢酸又はエタノール(99.5)に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

## \*22. 包装

〈ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」〉

PTP：100錠(10錠×10)

〈ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」〉

PTP：100錠(10錠×10)

## 23. 主要文献

- 江藤晃他：基礎と臨床, 1980；14(10)：3082-3088
- 社内資料：生物学的同等性試験(錠30mg)
- 社内資料：生物学的同等性試験(錠60mg)
- Sugawara, Y. et al.：J. Pharmacobiodyn., 1988；11(4)：224-233
- 第十八改正日本薬局方解説書, 廣川書店, 2021；C-2450-2457
- 水野康他：臨牀と研究, 1973；50(2)：565-573
- 笠原浩一郎他：診断と治療, 1975；63：696-706
- 杉本恒明他：臨床医薬, 1990；6(1)：41-63
- 新谷博一他：臨床医薬, 1989；5(11)：2401-2433

- 10) 金澤知博他：循環器科, 1989；26(3)：327-344
- 11) 依藤進他：臨床成人病, 1979；9(5)：893-907
- 12) 池田正男他：医学のあゆみ, 1979；110(5,6)：302-320
- 13) 渡辺務他：医学のあゆみ, 1982；120(8)：854-871
- 14) 池田正男他：医学のあゆみ, 1982；121(4)：222-246
- 15) Sato, M. et al.：Arzneimittelforschung, 1971；21(9)：1338-1343
- 16) Imai, S. et al.：Jpn. Heart J., 1977；18(1)：92-101
- 17) Nagao, T. et al.：Jpn. J. Pharmacol., 1975；25(3)：281-288
- 18) Nakamura, M. et al.：Chest, 1980；78(1 Suppl.)：205-209
- 19) Taira, N. et al.：Circ. Res., 1983；52(2 Pt 2)：I 40-46
- 20) 長尾拓他：日本薬理学雑誌, 1981；77(2)：195-203
- 21) Zamanis, A. et al.：J. Mol. Cell. Cardiol., 1982；14(1)：53-62
- 22) 佐藤匡徳他：日本薬理学雑誌, 1979；75(2)：99-106
- 23) 山口勲他：日本薬理学雑誌, 1979；75(2)：191-199
- 24) Aoki, K. et al.：Eur. J. Clin. Pharmacol., 1983；25(4)：475-480
- 25) Yamakado, T. et al.：Am. J. Cardiol., 1983；52(8)：1023-1027
- 26) Murata, S. et al.：Jpn. J. Pharmacol., 1982；32(6)：1033-1040
- 27) 栗山良紘他：脈管学, 1987；27(2)：89-92
- 28) 長木淳一郎他：脈管学, 1986；26(12)：1297-1303
- 29) Yamaguchi, I. et al.：Jpn. J. Pharmacol., 1974；24(4)：511-522
- 30) 成田寛他：日本薬理学雑誌, 1985；86(3)：165-174
- 31) 中谷晴昭他：日本薬理学雑誌, 1980；76(8)：697-707
- 32) Kawai, C. et al.：Circulation, 1981；63(5)：1035-1042

**\* 24. 文献請求先及び問い合わせ先**

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL：0120-381-999 FAX：06-7708-8966

**26. 製造販売業者等**

**26.1 製造販売元**

**沢井製薬株式会社**  
大阪市淀川区宮原5丁目2-30