

貯法：室温保存
有効期間：5年

漢方製剤

S-06

日本標準商品分類番号

875200

承認番号	16100AMZ03623000
販売開始	1986年11月

だいぼうふうとう
劇薬(500g入りのみ) 三和大防風湯エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	三和大防風湯エキス細粒		
有効成分	本品1日量(9g)中、下記の大防風湯水製エキス6.5gを含有する。		
	日局 トウキ	3.0 g	日局 ニンジン 1.5 g
	日局 シャクヤク	3.0 g	日局 キョウカツ 1.5 g
	日局 ジオウ	3.0 g	日局 ゴシツ 1.5 g
	日局 オウギ	3.0 g	日局 カンゾウ 1.5 g
	日局 ハマボウフウ	3.0 g	日局 ショウキヨウ 0.5 g
	日局 トチュウ	3.0 g	日局 タイソウ 1.5 g
	日局 ビャクジユツ	3.0 g	日局 加工ブシ 0.5 g
	日局 センキュウ	2.0 g	
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸		

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色	褐色
におい	特異な芳香
味	苦く、やや甘い
識別コード	S-06

4. 効能又は効果

関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいものの次の諸症
下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風

6. 用法及び用量

通常、成人1日9gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2参照]
8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

9.1.2 暑がりで、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしづれ、恶心等があらわれるおそれがある。

9.1.3 著しく胃腸の虚弱な患者

食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、下痢等があらわれるおそれがある。

9.1.4 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者

これらの症状が悪化するおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれるゴシツにより流早産の危険性があり、また加工ブシの副作用があらわれやすくなる。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

慎重に投与すること。本剤には加工ブシが含まれている。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症	グリチルリチ
芍薬甘草湯	があらわれやすくな	ン酸は尿細管
補中益気湯	る。また、低カリウム	でのカリウム
抑肝散 等	血症の結果として、	排泄促進作用
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	ミオパチーがあらわ	があるため、血
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-시스ティン	れやすくなる。	清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等	[8.2、11.1.1、11.1.2参照]	

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、荨麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、下痢等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしづれ等

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

湿疹、皮膚炎等が悪化することがある。

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500 g [ボトル]

3.0 g ×300包 [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

三和生薬株式会社 お客様相談窓口

〒164-0012 東京都中野区本町 1-32-5 ハーモニーテラス 201 号

ナビダイヤル：0570-095770 FAX：03-5843-5444

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1