

希塩酸「司生堂」

(日本薬局方 希塩酸)

500mL

2011年3月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	872335
承認番号	16100AMZ02287000
薬価収載	1986年3月
販売開始	1986年3月
再評価結果	1984年6月

貯法：気密容器に保存する。

禁忌 (次の患者には投与しないこと)
アシドーシスのある患者
[症状を悪化させるおそれがある。]

【組成・性状】

組成 本品は定量するとき、塩化水素 (HCl :36.46) 9.5
～10.5w/v%を含む。

性状 本品は無色の液で、においはなく、強い酸味がある。

【効能・効果】

低・無酸症における消化異常症状の改善

【用法・用量】

通常成人1日量0.5～1.0mLを約200mLの水にうすめるか、又は
リモナーデ剤として1～数回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- (2) 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には直ちに水で洗い流すこと。
- (3) 眼に入らないように注意すること。入った場合には直ちに水で洗い流し、専門医の処置を受けること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

長期投与 長期投与により便秘を起こすことがある。

3. 適用上の注意

- (1) 投与に際しては、必ずうすめること。
- (2) 投与に際しては、歯のホーロー質をいためることがあるので、ストローなどを用いるか、投与後、炭酸水素ナトリウム水で含嗽させること。