

TM-17

漢方製剤

承認番号	16200AMZ00177000
販売開始	1987年10月

貯法：室温保存
有効期間：3年

太虎堂の五苓散料エキス顆粒

ごれいさんりょう

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	太虎堂の五苓散料エキス顆粒
有効成分	本品6.0g中 日局タクシャ6.0g 日局ビャクジュツ4.5g 日局チョレイ4.5g 日局ケイヒ3.0g 日局ブクリョウ4.5g 上記生薬より抽出した水製乾燥エキス3,140mgを含有する。
添加剤	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム

3.2 製剤の性状

剤 形	顆粒剤
色 調	淡茶色～灰褐色
味	わずかに甘苦い
におい	特異におい
識別コード	Tai TM-17

4. 効能又は効果

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：
水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

6. 用法及び用量

通常、成人1日6.0gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒等
肝臓	肝機能異常 (AST、ALT、γ-GTP等の上昇)

20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g [ボトル]
2.0g×84包 [分包]
2.0g×315包 [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

太虎精堂製薬株式会社 薬事情報部
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1番27号
TEL 078(232)1015 FAX 078(232)1077

26. 製造販売業者

26.1 製造販売元
太虎精堂製薬株式会社
神戸市中央区吾妻通2丁目1番27号