

TM-73

## 漢方製剤

承認番号	16100AMZ03920000
販売開始	1986年11月

貯法：室温保存  
有効期間：3年太虎堂の柴陷湯エキス顆粒  
さいかんとう

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	太虎堂の柴陷湯エキス顆粒
有効成分	本品7.5g中 日局サイコ ..... 7.0g 日局カンゾウ ..... 2.0g 日局ハンゲ ..... 5.0g 日局ショウキョウ ..... 1.0g 日局オウゴン ..... 3.0g 日局オウレン ..... 1.5g 日局タイソウ ..... 3.0g カロニン ..... 3.0g 日局ニンジン ..... 3.0g 上記生薬より抽出した水製乾燥エキス4,860mgを含有する。
添加剤	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム

## 3.2 製剤の性状

剤形	顆粒剤
色調	淡茶色
味	わずかに苦い
におい	特異なにおい
識別コード	Tai TM-73

## 4. 効能又は効果

咳、咳による胸痛

## 6. 用法及び用量

通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。  
 8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2 参照]  
 8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.1 合併症・既往歴等のある患者

## 9.1.1 著しく体力の衰えている患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

## 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

## 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

## 10. 相互作用

## 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益気湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-시스ティン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等 [8.2、11.1.1、11.1.2 参照]	偽アルドステロン症 があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパシーがあらわれやすくなる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.1 重大な副作用

## 11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

## 11.1.2 ミオパシー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、荨麻疹等

## 15. その他の注意

## 15.1 臨床使用に基づく情報

類似処方の小柴胡湯では、間質性肺炎、肝機能障害、膀胱炎の副作用が報告されている。特に、間質性肺炎はインターフェロン- $\alpha$ との併用例で多く報告されている。

## 20. 取扱い上の注意

## 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿氣を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

## 20.2 開封後は特に湿氣を避け、取扱いに注意すること。

## 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

**22. 包装**

500g [ボトル]  
2.5g×84包 [分包]  
2.5g×252包 [分包]

**24. 文献請求先及び問い合わせ先**

太虎精堂製薬株式会社 薬事情報部  
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1番27号  
TEL 078(232)1015 FAX 078(232)1077

**26. 製造販売業者**

**26.1 製造販売元**  
太虎精堂製薬株式会社  
神戸市中央区吾妻通2丁目1番27号