

日本標準商品分類番号

872616

## 外用殺菌消毒剤

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

**塩化ベンザルコニウム液「タカスギ」10%**

Benzalkonium Chloride Solution 10%「TAKASUGI」

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

承認番号	16100AMZ03451
販売開始	1986年6月

**3.組成・性状****3.1 組成**

有効成分	100mL 中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 19.05g (ベンザルコニウム塩化物として 10g)
------	---

**3.2 製剤の性状**

性 状	無色～淡黄色の液で、特異なにおいがある。
-----	----------------------

**4.効能又は効果**

- 手指・皮膚の消毒
- 手術部位（手術野）の皮膚の消毒
- 手術部位（手術野）の粘膜の消毒
- 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒
- 感染皮膚面の消毒
- 医療機器の消毒
- 手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒
- 腔洗浄
- 結膜囊の洗浄・消毒

**6.用法及び用量**

## 〈手指・皮膚の消毒〉

通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンザルコニウム塩化物 0.05～0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10 分間ブラッシングする。

## 〈手術部位（手術野）の皮膚の消毒〉

手術前局所皮膚面をベンザルコニウム塩化物 0.1%溶液で約 5 分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物 0.2%溶液を塗布する。

## 〈手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒〉

ベンザルコニウム塩化物 0.01～0.025%溶液を用いる。

## 〈感染皮膚面の消毒〉

ベンザルコニウム塩化物 0.01%溶液を用いる。

## 〈医療機器の消毒〉

ベンザルコニウム塩化物 0.1%溶液に 10 分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め 2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンザルコニウム塩化物 0.1%溶液中で 15 分間煮沸する。

## 〈手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒〉

ベンザルコニウム塩化物 0.05～0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。

## 〈腔洗浄〉

ベンザルコニウム塩化物 0.02～0.05%溶液を用いる。

## 〈結膜囊の洗浄・消毒〉

ベンザルコニウム塩化物 0.01～0.05%溶液を用いる。

**11.副作用**

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、そう痒感等

## 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。

14.1.2 希釈倍数

濃度	0.01%	0.02%	0.025%	0.05%	0.1%	0.2%
希釈倍数	1,000倍	500倍	400倍	200倍	100倍	50倍

14.1.3 炎症又は易刺激性の部位（粘膜、陰股部等）に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。

14.1.4 希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いないこと。

14.1.5 深い創傷又は眼に使用する場合の希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

14.1.6 繊維、布（綿、ガーゼ、ワール、レーヨン等）は本剤成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。

14.1.7 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するためにベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

### 14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 経口投与しないこと。

14.2.2 浸脇には使用しないこと。

14.2.3 原液又は濃厚液が眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

14.2.4 濃厚液の使用により、皮膚・粘膜の刺激症状が現れることがあるので注意すること。

14.2.5 全身吸收による筋脱力を起こすがあるので、粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。

14.2.6 密封包帯、ギブス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれるので、使用しないことが望ましい。

14.2.7 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を减弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。

14.2.8 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。

14.2.9 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

14.2.10 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

14.2.11 皮革製品の消毒に使用すると、変質があるので使用しないこと。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

タンパク変性及び酵素の切断、糖の分解と乳酸の酸化など代謝への作用、膜透過性障害による溶菌、リン及びカリウムの漏出、解糖の促進、原形質膜の活動を支える酵素に対する作用などが考えられている<sup>1)</sup>。

### 18.2 殺菌作用

グラム陽性、陰性菌のみならず、芽胞のない細菌やカビ類といった真菌類に対しても殺菌作用を有する。結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない<sup>1)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ベンザルコニウム塩化物（Benzalkonium Chloride）

化 学 名：Ammonium,alkyldimethyl(phenylmethyl)-,chloride

分 子 式：[C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>R] Cl


R : C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>～C<sub>18</sub>H<sub>37</sub> で主として C<sub>12</sub>H<sub>25</sub> 及び C<sub>14</sub>H<sub>29</sub> からなる

分 子 量：354.01 (C<sub>22</sub>H<sub>40</sub>ClNとして)

性 状：白色～黄白色の粉末又は無色～淡黄色のゼラチン状の小片、ゼリー様の流動体若しくは塊で、特異においがある。

水又はエタノール（95）に極めて溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水溶液は振ると強く泡立つ。

化学構造式：



R : C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>～C<sub>18</sub>H<sub>37</sub> で主として C<sub>12</sub>H<sub>25</sub> 及び C<sub>14</sub>H<sub>29</sub> からなる

## 22.包装

500mL (ポリエチレン瓶)

18L (バッグインボックス)

## 23.主要文献

- 1) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021:C-5320-5324

## 24.文献請求先及び問い合わせ先

高杉製薬株式会社

福岡県糟屋郡粕屋町仲原 2617

電話：092-621-1231

FAX：092-621-6269

## 26.製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

高杉製薬株式会社

福岡県糟屋郡粕屋町仲原 2617