

貯法：室温保存  
有効期間：3年

還元型葉酸製剤  
ホリナートカルシウム水和物錠

# ホリナート錠 25mg「NK」

Folate Tablets 25mg「NK」

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

承認番号	22900AMX00442
販売開始	2017年6月

## 1. 警告

- 1.1 ホリナート・テガフル・ウラシル療法は、テガフル・ウラシル配合剤の細胞毒性を増強する療法であり、本療法に関連したと考えられる死亡例が認められているので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び癌化学療法に十分な経験を有する医師のもとで、「2. 禁忌」、「9. 特定の背景を有する患者に関する注意」の項を参照して適応患者の選択を慎重に行い実施すること。
- 1.2 本療法において重篤な下痢が起こることがあり、その結果、致命的な経過をたどることがあるので、患者の状態を十分観察し、激しい腹痛、下痢等の症状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、脱水症状があらわれた場合には補液等の適切な処置を行うこと。[8.1, 11.1.4, 11.1.5 参照]
- 1.3 本療法において劇症肝炎等の重篤な肝障害、重篤な骨髄抑制が起こることがあり、その結果、致命的な経過をたどることがあるので、定期的（少なくとも1クールに1回以上、特に投与開始から2クールは、各クール開始前及び当該クール中に1回以上）に臨床検査（肝機能検査、血液検査等）を行うなど患者の状態を十分観察し、副作用の早期発見に努めること。また、肝障害の前兆又は自覚症状と考えられる食欲不振を伴う倦怠感等の発現に十分に注意し、黄疸（眼球黄染）があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.2, 8.3, 11.1.1, 11.1.2 参照]
- 1.4 本療法とテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤との併用により、重篤な血液障害等の副作用が発現するおそれがあるので、本療法との併用を行わないこと。[2.5, 10.1 参照]

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 重篤な骨髄抑制のある患者〔骨髄抑制の増悪により重症感染症を併発し、致命的となることがある。〕
- 2.2 下痢（水様便）のある患者〔下痢が増悪して脱水、電解質異常、循環不全を起こし、致命的となることがある。〕
- 2.3 重篤な感染症を合併している患者〔骨髄抑制により感染症が増悪し、致命的となることがある。〕
- 2.4 本剤の成分又はテガフル・ウラシル配合剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者
- 2.5 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中の患者及び投与中止後7日以内の患者[1.4, 10.1 参照]
- 2.6 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]


## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

販売名	ホリナート錠 25mg「NK」
有効成分	1錠中 ホリナートカルシウム水和物 31.8mg (ホリナートとして 25.0mg)
添加剤	乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、クロスポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、黄色三二酸化鉄、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム

### 3.2 製剤の性状

販売名	ホリナート錠 25mg「NK」
剤形	淡黄白色の裸錠

外形	表・裏	
	側面	
大きさ	直径	約 7mm
	厚さ	約 2.8mm
質量		約 0.12g
本体表示		ホリナート 25 NK

## 4. 効能又は効果

〈ホリナート・テガフル・ウラシル療法〉

結腸・直腸癌に対するテガフル・ウラシルの抗腫瘍効果の増強

## 5. 効能又は効果に関連する注意

〈ホリナート・テガフル・ウラシル療法〉

術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

## 6. 用法及び用量

〈ホリナート・テガフル・ウラシル療法〉

通常、成人にはホリナートとして75mgを、1日3回に分けて（約8時間ごとに）、テガフル・ウラシル配合剤と同時に経口投与する。

テガフル・ウラシル配合剤の投与量は、通常、1日量として、テガフル 300～600mg 相当量（300mg/m<sup>2</sup>を基準）を1日3回に分けて（約8時間ごとに）、食事の前後1時間を避けて経口投与する。

以上を28日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1クールとして投与を繰り返す。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

本療法は食事の影響を受けるので、食事の前後1時間を避けて投与すること。[16.2.1 参照]

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 重篤な下痢・腸炎等が起こることがあり、致命的な経過をたどることがあるので、観察を十分に行い、激しい腹痛、下痢等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[1.2, 11.1.4, 11.1.5 参照]
- 8.2 劇症肝炎、重篤な骨髄抑制が起こることがあり、致命的な経過をたどることがあるので、定期的（少なくとも1クールに1回以上、特に投与開始から2クールは、各クール開始前及び当該クール中に1回以上）に臨床検査（肝機能検査、血液検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[1.3, 11.1.1, 11.1.2 参照]
- 8.3 感染症・出血傾向の発現又は悪化に十分注意すること。[1.3, 9.1.2 参照]

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 骨髄抑制のある患者（重篤な骨髄抑制を除く）

骨髄抑制が増強するおそれがある。[11.1.1 参照]

#### 9.1.2 感染症を合併している患者（重篤な感染症を除く）

骨髄抑制により、感染症が悪化するおそれがある。[8.3, 11.1.1 参照]

#### 9.1.3 心疾患又はその既往歴のある患者

症状が悪化するおそれがある。[11.1.7 参照]

#### 9.1.4 消化管潰瘍又は出血のある患者

症状が悪化するおそれがある。[11.1.12 参照]

#### 9.1.5 耐糖能異常のある患者

耐糖能異常が悪化するおそれがある。

#### 9.1.6 水痘患者

致命的な全身障害があらわれるおそれがある。

9.1.7 前化学療法を受けていた患者

下痢、骨髄抑制等の副作用が増強されるおそれがある。

9.2 腎機能障害患者

副作用が強くあらわれるおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝障害又はその既往歴のある患者

肝障害が悪化するおそれがある。

9.4 生殖能を有する者

9.4.1 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には性腺に対する影響を考慮すること。

\*9.4.2 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後6カ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。[9.5, 15.2 参照]

\*9.4.3 男性には、本剤投与中及び最終投与後3カ月間においてバリヤ法（コンドーム）を用いて避妊する必要性について説明すること。[15.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。テガフル・ウラシル配合剤を投与された女性において奇形を有する児を出産したとの報告がある。また、動物実験で催奇形作用の報告（妊娠ラットで胎児の骨格変異、化骨遅延等が認められている）がある。[2.6, 9.4.2 参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。テガフル・ウラシル配合剤の動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。

9.7 小児等

副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下しているため、特に消化器障害（下痢、口内炎等）、骨髄抑制があらわれやすい。

10. 相互作用

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（ティーエスワン） [1.4, 2.5 参照]	早期に重篤な血液障害や下痢、口内炎等の消化管障害等が発現するおそれがあるため、テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中及び投与中止後少なくとも7日以内は本療法を施行しないこと。	ギメラシルがフルオロウラシルの異化代謝を阻害し、血中フルオロウラシル濃度が著しく上昇する。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェニトイン	フェニトイン中毒（嘔気・嘔吐、眼振、運動障害等）が発現することがある。必要に応じてフェニトインの血中濃度を測定し、フェニトインの用量調節を行い、注意して投与すること。異常が認められた場合には本療法を中止するなど適切な処置を行うこと。	テガフルによってフェニトインの代謝が抑制され、フェニトインの血中濃度が上昇する。
ワルファリンカリウム	テガフルがワルファリンカリウムの作用を増強することがあるため、凝固能の変動に注意すること。	機序は不明である。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他の抗悪性腫瘍剤、放射線照射	消化管障害、血液障害等の副作用が増強することがあるため、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な処置を行うこと。	副作用が相互に増強される。
葉酸代謝拮抗剤（スルファメトキサゾール・トリメトプリム等）	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	ホリナートによって葉酸代謝拮抗作用が減弱するためと考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 骨髄抑制（頻度不明<sup>注1)</sup>）、溶血性貧血等の血液障害（頻度不明<sup>注1)</sup>）

汎血球減少、無顆粒球症（症状：発熱、咽頭痛、倦怠感等）、白血球減少、血小板減少、貧血、出血傾向、溶血性貧血等があらわれることがある。[1.3, 8.2, 9.1.1, 9.1.2 参照]

11.1.2 劇症肝炎等の重篤な肝障害（頻度不明<sup>注1)</sup>）

[1.3, 8.2 参照]

11.1.3 肝硬変（頻度不明<sup>注1)</sup>）

長期投与においてAST、ALTの明らかな上昇を伴わずに肝硬変があらわれることがあるため、プロトロンビン時間延長、アルブミン低下、コリンエステラーゼ低下、血小板減少等が認められた場合には投与を中止すること。

11.1.4 脱水症状（頻度不明<sup>注1)</sup>）

激しい下痢があらわれ、脱水症状まで至ることがあるため、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、補液等の適切な処置を行うこと。[1.2, 8.1 参照]

11.1.5 重篤な腸炎（頻度不明<sup>注1)</sup>）

出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等があらわれることがあるため、激しい腹痛・下痢等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[1.2, 8.1 参照]

11.1.6 白質脳症等を含む精神神経障害（頻度不明<sup>注1)</sup>）

白質脳症（意識障害、小脳失調、認知症様症状等を主症状とする）や意識障害、失見当識、傾眠、記憶力低下、錐体外路症状、言語障害、四肢麻痺、歩行障害、尿失禁、知覚障害等があらわれることがある。

11.1.7 狭心症（頻度不明<sup>注1)</sup>）、心筋梗塞（頻度不明<sup>注1)</sup>）、不整脈（頻度不明<sup>注1)</sup>）

狭心症、心筋梗塞、不整脈（心室頻拍等を含む）があらわれることがあるため、胸痛、失神、息切れ、動悸、心電図異常等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[9.1.3 参照]

11.1.8 急性腎障害（頻度不明<sup>注1)</sup>）、ネフローゼ症候群（頻度不明<sup>注1)</sup>）

11.1.9 嗅覚脱失（頻度不明<sup>注1)</sup>）

嗅覚障害があらわれ、嗅覚脱失まで至ることがある。

11.1.10 間質性肺炎（頻度不明<sup>注1)</sup>）

間質性肺炎（初期症状：咳嗽、息切れ、呼吸困難、発熱等）があらわれることがあるため、異常が認められた場合には投与を中止し、胸部X線等の検査を行い、副腎皮質ホルモン剤の投与など適切な処置を行うこと。

11.1.11 急性膵炎（頻度不明<sup>注1)</sup>）

腹痛、血清アミラーゼ値の上昇等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.12 重篤な口内炎（頻度不明<sup>注1)</sup>）、消化管潰瘍（頻度不明<sup>注1)</sup>）、消化管出血（頻度不明<sup>注1)</sup>）

[9.1.4 参照]

11.1.13 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明<sup>注1)</sup>）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明<sup>注1)</sup>）

11.1.14 ショック（頻度不明<sup>注1)</sup>）、アナフィラキシー（頻度不明<sup>注1)</sup>）

発疹、呼吸困難、血圧低下等の症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	5%以上	0.1~5%未満	頻度不明 <sup>注1)</sup>
血液	赤血球減少、血色素減少、ヘマトクリット値減少、好中球減少、好酸球増多、リンパ球減少	好塩基球増多	平均赤血球容積 (MCV) 増加
肝臓	肝機能障害 (AST、ALTの上昇等)、総ビリルビン上昇、ALP上昇		黄疸、脂肪肝
腎臓	蛋白尿	腎機能障害 (BUN、クレアチニンの上昇等)	血尿
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、便秘、味覚異常	腹痛、心窩部痛、腹部膨満感、胃不快感、胃重感、舌炎、口唇炎	胸やけ、口角炎、口渇、胃炎、嚥下困難、腹鳴
精神神経系	倦怠感	頭痛、頭重感、耳鳴	眩暈、しびれ、興奮、末梢性ニューロパチー
皮膚 <sup>注2)</sup>	色素沈着	皮膚炎、皮膚の乾燥、手足症候群	皮膚びらん、角化、紅潮、光線過敏症、水疱、DLE様皮疹、爪の異常、脱毛、浮腫
過敏症	発疹、そう痒		蕁麻疹、発赤
循環器			動悸、胸痛、胸内苦悶感、心電図異常 (ST上昇等)
その他	総蛋白低下、LDH上昇、発熱、血糖値上昇、糖尿、血清ナトリウム低下、血清カルシウム低下	頻尿、血清カリウム上昇、血清カリウム低下、血清クロール上昇、血清クロール低下、血清カルシウム上昇	血痰、高トリグリセリド血症、高コレステロール血症、無月経、関節痛、灼熱感、結膜充血、咳・痰、血清尿酸値上昇、女性型乳房、筋肉痛、CK上昇

注1) テガフル・ウラシル配合剤又はレボホリナート・フルオロウラシル療法において認められた副作用のため、本療法においては頻度不明。

注2) 色素沈着、皮膚炎等の皮膚障害は手のひら、足裏等に発現しやすいとの報告がある。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 本剤と併用されるテガフル・ウラシル配合剤を投与した患者に、急性白血病 (前白血病相を伴う場合もある)、骨髄異形成症候群 (MDS) が発生したとの報告がある。

15.1.2 フルオロウラシルの異化代謝酵素であるジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ (DPD) 欠損等の患者がごくまれに存在し、このような患者にフルオロウラシル系薬剤を投与した場合、投与初期に重篤な副作用 (口内炎、下痢、血液障害、神経障害等) が発現するとの報告がある。

15.1.3 葉酸の投与により、ビタミン B<sub>12</sub> 欠乏による巨赤芽球性貧血 (悪性貧血等) が隠蔽されるとの報告がある。

\* 15.2 非臨床試験に基づく情報

テガフル・ウラシル配合剤の哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験において、遺伝毒性が報告されている。[9.4.2, 9.4.3 参照]

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

日本人癌患者 44 例にホリナート 25mg を経口投与後の血中ホリナート濃度は、投与 1.5~3 時間後に最高値 (473.6±214.0ng/mL) に達し、半減期は 7 時間であった。

また、活性型葉酸 (5-MTHF) は投与 0.3~5 時間後に最高値 (468.0±193.0ng/mL) に達し、半減期は 3.1 時間であった<sup>1)2)</sup>。

16.1.2 生物学的同等性試験


<ホリナート錠 25mg 「NK」 (旧処方製剤)>

ホリナート錠 25mg 「NK」 (旧処方製剤) とユーゼル錠 25mg を、クロスオーバー試験法によりそれぞれ 1 錠 (ホリナートとして 25mg) 健康成人男性に空腹時単回投与してホリナートの光学異性体のうち、薬理活性を示す L 体である L-ホリナートの血漿中濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ (AUC, C<sub>max</sub>) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>3)</sup>。

ホリナートの薬物動態パラメータ

	評価パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>t</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	t <sub>max</sub> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ホリナート錠 25mg 「NK」 (旧処方製剤)	11.49±4.25	11.95±5.48	0.54±0.23	0.82±0.20
ユーゼル錠 25mg	11.43±3.47	12.20±5.01	0.55±0.30	0.81±0.23

(Mean ± S.D., n=42)



血漿中濃度並びに AUC, C<sub>max</sub> 等のパラメータは、被験者の選択、血液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

癌患者 25 例にクロスオーバー法で、空腹時及び食後 (高脂肪食摂取後) にホリナート 30mg 及びテガフル・ウラシル配合剤 (テガフル 200mg 相当量) を投与した場合、空腹時に比べて食後投与時のウラシルの AUC、テガフルから変換されたフルオロウラシルの AUC はそれぞれ 66%、37%減少し、ホリナートの AUC は 61%上昇した。一方、テガフルの AUC には著明な変化は認められなかった<sup>4)</sup> (外国人データ)。[7. 参照]

16.8 その他

16.8.1 ホリナート錠 25mg 「NK」 (新処方製剤)

「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン (平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発第 0229 第 10 号)」に基づき、旧処方製剤 (ヒトを対象に実施した生物学的同等性試験において同等性が確認されている) を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた<sup>5)</sup>。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

本療法は国内外のブリッジング試験 (国内: 44 例、外国: 45 例) 及び外国臨床試験で検討されたものである。

17.1.1 国内第 II 相試験 (ブリッジング試験)

結腸・直腸癌患者 44 例を対象に本療法<sup>\*1</sup> を実施した結果、奏効率は 36.4% (16/44 例) であった<sup>1)</sup>。副作用評価可能症例数は 44 例であり、主な副作用は次のとおりであった<sup>6)</sup>。

副作用	発現率	副作用	発現率
下痢 (グレード3) 注1)	38.6% (9.1%)	口内炎 (グレード3)	34.1% (4.5%)
食欲不振	31.8%	悪心	29.5%
倦怠感	29.5%	色素沈着	18.2%
白血球減少	25.0%	好中球減少	27.3%
赤血球減少 (グレード3)	50.0% (4.5%)	ヘマトクリット値 減少	40.9%
血小板減少 (グレード3)	4.5% (2.3%)	AST上昇 (グレード3以上)	29.5% (2.3%)
ALT上昇 (グレード3以上)	36.4% (2.3%)	総ビリルビン上昇 (グレード3)	47.7% (2.3%)

注1) グレード分類は、NCI-CTC (1998年) を基準とした。

※1: LV: 75mg/日とUFT: 300mg/m<sup>2</sup>/日 (テガフル相当量) を併用連日28日間経口投与し、その後7日間休薬を1クールとする

### 17.1.2 海外第II相試験 (ブリッジング試験)

結腸・直腸癌患者45例を対象に本療法\*1を実施した結果、奏効率は34.1% (15/44例) であった<sup>1)</sup>。

副作用評価可能症例数は45例であり、主な副作用は、下痢68.9% (31/45例)、倦怠感66.7% (30/45例)、悪心64.4% (29/45例)、嘔吐31.1% (14/45例)、腹痛26.7% (12/45例) であった。このうちグレード3以上の副作用は、下痢22.2% (10/45例)、腹痛6.7% (3/45例)、悪心及び嘔吐4.4% (2/45例) であった<sup>6)</sup>。

※1: LV: 75mg/日とUFT: 300mg/m<sup>2</sup>/日 (テガフル相当量) を併用連日28日間経口投与し、その後7日間休薬を1クールとする

### 17.1.3 海外第III相試験

結腸・直腸癌を対象にホリナート・フルオロウラシル療法 (ホリナート注射剤とフルオロウラシル注射剤の併用療法、5-FU/LV) と本療法 (ホリナート・テガフル・ウラシル療法、UFT/LV) との生存期間の同等性検証を主目的とした非盲検デザインの比較試験を実施した。結果は以下のとおりで、生存期間はUFT/LVと5-FU/LVで同等であった<sup>7),8)</sup>。

	生存期間		病勢進行までの期間	
	UFT/LV *1	5-FU/LV*2	UFT/LV	5-FU/LV
例数	409	407	409	407
中央値 (月) [95% 信頼区間]	12.4 [11.2,13.6]	13.4 [11.6,15.4]	3.5 [3.0,4.4]	3.8 [3.6,5.0]
ハザード比*3 [95% 信頼区間]	0.964 [0.826,1.125] *4		0.823 [0.708,0.958] *5	
層併合ログランク 検定*6	p=0.630		p=0.011	

※1 LV: 75mg又は90mg/日とUFT: 300mg/m<sup>2</sup>/日 (テガフル相当量) を併用連日28日間経口投与し、その後7日間休薬を1クールとする

※2 LV: 20mg/m<sup>2</sup>/日と5-FU: 425mg/m<sup>2</sup>/日を週5日間連日静脈内投与し、その後23日間休薬を1クールとする<sup>注2)</sup>

※3 ハザード比 (5-FU/LV: UFT/LV)

※4 95.6%信頼区間

※5 95.1%信頼区間

※6 層別因子: 前補助療法の有無、ECOG PSの0,1対2、測定可能病変の有無

注2) 本試験における5-FU/LVは国内で承認されているレボホリナート・フルオロウラシル療法の用法・用量と異なる

### 17.1.4 海外第III相試験

結腸・直腸癌を対象にホリナート・フルオロウラシル療法 (ホリナート注射剤とフルオロウラシル注射剤の併用療法、5-FU/LV) と本療法 (ホリナート・テガフル・ウラシル療法、UFT/LV) との病勢進行までの期間の優越性検証を主目的とした非盲検デザインの比較試験を実施した。結果は以下のとおりで、病勢進行までの期間はUFT/LVと5-FU/LVで有意差は認められなかった<sup>9),10)</sup>。

	生存期間		病勢進行までの期間	
	UFT/LV *1	5-FU/LV*2	UFT/LV	5-FU/LV
例数	190	190	190	190
中央値 (月) [95% 信頼区間]	12.2 [10.4,13.8]	10.3 [8.2,13.0]	3.4 [2.6,3.8]	3.3 [2.5,3.7]

ハザード比*3 [95% 信頼区間]	1.144 [0.920,1.424]	0.941 [0.753,1.175]
層併合ログランク 検定*4	p=0.227	p=0.591

※1 LV: 90mg/日とUFT: 300mg/m<sup>2</sup>/日 (テガフル相当量) を併用連日28日間経口投与し、その後7日間休薬を1クールとする

※2 LV: 20mg/m<sup>2</sup>/日と5-FU: 425mg/m<sup>2</sup>/日を週5日間連日静脈内投与し、その後30日間休薬を1クールとする<sup>注3)</sup>

※3 ハザード比 (5-FU/LV: UFT/LV)

※4 層別因子: 前補助療法の有無、ECOG PSの0対1,2

注3) 本試験における5-FU/LVは国内で承認されているレボホリナート・フルオロウラシル療法の用法・用量と異なる

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

テガフル・ウラシルはフルオロウラシルのプロドラッグであるテガフルにフルオロウラシルの分解阻害作用を有するウラシルをモル比1:4 (テガフル:ウラシル) で配合した抗悪性腫瘍剤である。ホリナートの光学活性体 (I体) であるレボホリナートは Biochemical Modulation によりフルオロウラシルの抗腫瘍効果を増強させる。フルオロウラシルは活性代謝物であるフルオロデオキシウリジン酸 (FdUMP) が、チミジル酸合成酵素 (Thymidylate synthase: TS) と結合し、TS活性を阻害することにより、チミジル酸合成を抑制しDNA合成を阻害する。レボホリナートは細胞内で還元され、5,10-CH<sub>2</sub>-THFとなる。この5,10-CH<sub>2</sub>-THFはFdUMP、TSと強固な三元複合体 (Ternary complex) を形成し、TSの解離を遅延させることにより、フルオロウラシルの抗腫瘍効果を増強させる。従って、ホリナートとテガフル・ウラシルの併用により、テガフルの分解産物であるフルオロウラシルの抗腫瘍効果が増強される<sup>11)</sup>。

### 18.2 抗腫瘍効果増強作用

#### 18.2.1 *in vitro*試験

ヒト結腸癌細胞 (COLO205) に対して、レボホリナートとして0.006μM濃度のホリナートを用いた *in vitro* 試験で、フルオロウラシルの抗腫瘍効果増強作用が認められている<sup>12)</sup>。

#### 18.2.2 *in vivo*試験 (併用投与による抗腫瘍効果増強作用)

ヒト結腸癌細胞 (KM20C、KM12C、Co-3) を移植したヌードマウスに対し、ホリナート (20mg/kg/day) とテガフル・ウラシル (テガフル20mg/kg/day) の併用でテガフル・ウラシル単独投与群に比較して抗腫瘍効果増強作用を示す<sup>13),14)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見


一般的名称: ホリナートカルシウム水和物 (Calcium Folate Hydrate)

化学名: Monocalcium *N*-(4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl) methyl] amino) benzoyl)-*L*-glutamate hydrate

分子式: C<sub>20</sub>H<sub>21</sub>CaN<sub>7</sub>O<sub>7</sub> · xH<sub>2</sub>O

分子量: 511.50 (脱水物)

化学構造式:



性状: ホリナートカルシウム水和物は、白色～淡黄色の結晶性の粉末である。  
水にやや溶けにくく、メタノール又はエタノール (99.5) にほとんど溶けない。

## 20. 取扱い上の注意

アルミビロー包装開封後は湿気をさけ遮光して保存すること。

## 22. 包装

42錠 [21錠 (PTP) ×2]

## 23. 主要文献

- Shirao, K. et al.: J. Clin. Oncol. 2004; 22 (17): 3466-3474
- 薬物動態パラメータ (ユーゼル錠、ロイコボリン錠: 2003年7月17日承認、申請資料概要へ.2.(5).1)
- 社内資料: 生物学的同等性試験 (ホリナート錠25mg [NK]) (旧処方製剤)
- Damle, B. et al.: Clin. Cancer Res. 2001; 7 (3): 517-523
- 社内資料: 生物学的同等性試験及び溶出性試験 (ホリナート錠25mg [NK]) (新処方製剤)
- 国内ブリッジング試験 (ユーゼル錠、ロイコボリン錠: 2003年7月17日承認、申請資料概要ト.3.8)
- Douillard, J. -Y. et al.: J. Clin. Oncol. 2002; 20 (17): 3605-3616
- 生存期間をエンドポイントとした海外第III相試験 (ユーゼル錠、ロイコボリン錠: 2003年7月17日承認、申請資料概要ト.2.(1))
- Carmichael, J. et al.: J. Clin. Oncol. 2002; 20 (17): 3617-3627

- 10) 病勢進行までの期間をエンドポイントとした海外第Ⅲ相試験(ユーゼル錠、ロイコボリン錠：2003年7月17日承認、申請資料概要ト.2.(2))
- 11) 作用機序(ユーゼル錠、ロイコボリン錠：2003年7月17日承認、申請資料概要ホ.総括)
- 12) ヒト結腸癌細胞株 COLO205 における 5-fluorouracil の抗腫瘍効果に対する LV 及び 5-methyltetrahydrofolate の効果増強濃度検討 (*in vitro*) (ユーゼル錠、ロイコボリン錠：2003年7月17日承認、申請資料概要ホ.1.(5))
- 13) ヒト結腸癌株 KM20C のヌードマウス皮下移植モデルにおける UFT の抗腫瘍効果に対する LV 併用投与による効果増強用量の検討 (ユーゼル錠、ロイコボリン錠：2003年7月17日承認、申請資料概要ホ.1.(1))
- 14) ヒト大腸癌株のヌードマウス皮下移植モデルにおける UFT の抗腫瘍効果に対する LV 併用投与による効果増強の検討 (ユーゼル錠、ロイコボリン錠：2003年7月17日承認、申請資料概要ホ.1.(2))

#### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本化薬株式会社 医薬品情報センター  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号  
TEL. 0120-505-282

#### 26. 製造販売業者等

##### 26.1 製造販売元

**高田製薬株式会社**

さいたま市西区宮前町203番地1

##### 26.2 販売元



**日本化薬株式会社**

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号