

抗悪性腫瘍剤  
(プロテゾーム阻害剤)  
注射用ボルテゾミブ  
毒薬・処方箋医薬品\*

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

\*ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」  
Bortezomib for Injection 3mg "TAKATA"

\*注意—医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

- 1.1 本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。
- 1.2 治療初期は入院環境で医師の管理下にて適切な処置を行うこと。
- 1.3 国内の臨床試験において、本剤との因果関係の否定できない肺障害（間質性肺炎）による死亡例が認められている。海外ではまれであるが、国内では本剤との因果関係の否定できない肺障害（間質性肺炎、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群、胸水等）がより高頻度に発生する可能性があるため、特に以下の事項に十分注意すること。[8.1、9.1.1、11.1.1 参照]
- 1.3.1 本剤による治療を開始するにあたり、胸部X線検査、胸部CT検査等を実施し、異常の有無を確認した上で、治療開始の可否を慎重に判断すること。
- 1.3.2 本剤による治療中及び治療後、特に治療開始後早期は、息切れ、呼吸困難、咳、発熱等の自覚症状や、胸部聴診所見、呼吸数等での異常の有無を慎重に観察すること。必要に応じて動脈血酸素飽和度や胸部CT検査等を適切に実施し、経過を観察すること。本剤による肺障害が疑われた場合には、投与中止も含め適切な処置を行うこと。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

ボルテゾミブ、マンニトール又はホウ素に対して過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分 1バイアル中	ボルテゾミブ 3.0mg
添加剤 1バイアル中	D-マンニトール 30mg

3.2 製剤の性状

色・性状	白色～微黄白色の塊又は粉末
pH*	4.0～7.0

\* 本剤 1バイアルを生理食塩液 3mL 又は 1.2mL に溶解したとき

\*\*4. 効能又は効果

- 多発性骨髄腫  
○マントル細胞リンパ腫  
○原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫

\*\*5. 効能又は効果に関する注意

〈多発性骨髄腫、マントル細胞リンパ腫〉

「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.1～17.1.5 参照]

\*\*6. 用法及び用量

〈多発性骨髄腫〉

通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして1.3mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を以下のA法又はB法で静脈内投与又は皮下投与する。本剤は最低72時間空けて投与すること。

A法：

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、週2回、2週間（1、4、8、11日目）投与した後、10日間休薬（12～21日目）する。この3週間を1サイクルとし、2又は8サイクルまで投与を繰り返す。

3又は9サイクル以降は、週1回、2週間（1、8日目）投与し、13日間休薬（9～21日目）する。この3週間を1サイクルとし、18サイクルまで投与を繰り返す。週1回投与への移行時期は併用する抗悪性腫瘍剤を考慮して選択すること。

B法（再発又は難治性の場合に限る）：

週2回、2週間（1、4、8、11日目）投与した後、10日間休薬（12～21日目）する。この3週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。8サイクルを超えて継続投与する場合には上記の用法・用量で投与を継続するか、又は維持療法として週1回、4週間（1、8、15、22日目）投与した後、13日間休薬（23～35日目）する。この5週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。

〈マントル細胞リンパ腫〉

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして1.3mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1、4、8、11日目に静脈内投与した後、10日間休薬（12～21日目）する。この3週間を1サイクルとし、6サイクルまで（6サイクル目に初めて奏効が認められた場合は8サイクルまで）投与を繰り返す。本剤は最低72時間空けて投与すること。なお、静脈内投与が困難な場合には、皮下投与することもできる。

〈原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫〉

通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして1.3mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1、4、8、11日目に静脈内投与又は皮下投与した後、10日間休薬（12～21日目）する。この3週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。本剤は最低72時間空けて投与すること。

7. 用法及び用量に関する注意

〈効能共通〉

\*\*7.1 本剤の投与については、以下の記載に従って、適切に減量、休薬又は投与中止の判断を行うこと。

7.1.1 多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症、リンパ形質細胞リンパ腫

・ Grade 3/4\*の副作用の場合（末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛を除く）

Grade 3以上の非血液毒性（末梢性ニューロパチー・神経障害性疼痛を除く）又はGrade 4の血液毒性に該当する副作用が発現した場合は、回復するまで休薬する。投与を再開する場合には、本剤の投与による有益性と危険性を慎重に検討した上で、下表を目安として減量等を考慮する。副作用が回復しない場合又は最低投与量（0.7mg/m<sup>2</sup>）でも再発する場合は、本剤の投与中止を考慮する。[8.6 参照]

Grade 3/4の副作用（末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛を除く）に対する減量の目安

副作用発現時の投与量	減量の目安
1.3mg/m <sup>2</sup>	1.0mg/m <sup>2</sup>
1.0mg/m <sup>2</sup>	0.7mg/m <sup>2</sup>
0.7mg/m <sup>2</sup>	投与中止

・ 末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛について

本剤に起因すると考えられる末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛が発現した場合は、以下に示す用法及び用量変更の目安に従って減量、休薬又は中止すること。[8.4、11.1.3 参照]

末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛に対する用法及び用量変更の目安

NCI-CTCAE Grade*（症状）	用法及び用量変更の目安
疼痛又は機能消失を伴わないGrade 1 (症状がない；深部腱反射の低下又は知覚異常)	なし

疼痛を伴う Grade 1 又は Grade 2 (中等度の症状がある：身の回り以外の日常生活動作の制限)	1.3mg/m <sup>2</sup> の場合 1.0mg/m <sup>2</sup> へ減量又は 1.0mg/m <sup>2</sup> の場合 0.7mg/m <sup>2</sup> へ減量
疼痛を伴う Grade 2 又は Grade 3 (高度の症状がある：身の回りの日常生活動作の制限)	回復するまで休薬。症状が回復した場合は、0.7mg/m <sup>2</sup> に減量した上で週 1 回投与に変更
Grade 4 (生命を脅かす；緊急処置を要する)	投与中止

### 7.1.2 マントル細胞リンパ腫

新たなサイクルを開始する前に以下を確認すること。

- ・血小板数が 100,000/μL 以上、好中球数が 1,500/μL 以上及びヘモグロビン値が 8g/dL 以上であること。[8.6 参照]
- ・非血液毒性が Grade 1<sup>※</sup> 又は投与前値に回復していること。

#### 副作用発現時の用法及び用量変更の目安

副作用	用法及び用量変更の目安
発熱を伴う Grade 3 以上的好中球減少症、7 日間を超えて持続する Grade 4 の好中球減少症、血小板数 10,000/μL 未満が発現した場合	好中球数が 750/μL 以上、血小板数が 25,000/μL 以上に回復するまで最長 2 週間本剤を休薬する。 ・本剤休薬後も副作用が上記の基準まで回復しない場合には、本剤の投与を中止すること。 ・副作用が上記の基準まで回復した場合には、本剤の投与量を 1 段階減量して投与する。 (1.3mg/m <sup>2</sup> の場合 1.0mg/m <sup>2</sup> へ減量、1.0mg/m <sup>2</sup> の場合 0.7mg/m <sup>2</sup> へ減量)
本剤投与日（各サイクルの第 1 日目以外）に血小板数が 25,000/μL 未満又は好中球数が 750/μL 未満の場合	本剤の投与を最長 2 日間延期し、2 日を越える延期を要する場合は本剤を休薬する。
Grade 3 以上の非血液毒性が発現した場合（末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛を除く）	Grade 2 以下に回復するまで本剤を休薬する。回復した場合は本剤の投与量を 1 段階減量して投与する。 (1.3mg/m <sup>2</sup> の場合 1.0mg/m <sup>2</sup> へ減量、1.0mg/m <sup>2</sup> の場合 0.7mg/m <sup>2</sup> へ減量)
末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛が発現した場合	「7.1.1 末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛について」に従うこと。[8.4、11.1.3 参照]

※NCI-CTCAE v4.0

#### 〈多発性骨髄腫〉

- 7.2 未治療の多発性骨髄腫に対し、本剤単独投与での有効性及び安全性は確立していない。
- 7.3 週 1 回投与への移行時期、本剤と併用する抗悪性腫瘍剤等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知した上で選択すること。[17.1.1-17.1.4 参照]
- 〈マントル細胞リンパ腫〉
- ※7.4 本剤単独投与での有効性及び安全性は確立していない。
- ※7.5 本剤を含むがん化学療法については、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知した上で、患者の状態や化学療法歴に応じて選択すること。[17.1.5 参照]
- ※7.6 皮下投与の臨床試験成績は得られていない。

## 8. 重要な基本的注意

### 〈効能共通〉

- 8.1 肺障害があらわれることがあるので、息切れ、呼吸困難、胸水、咳、及び発熱等の自覚症状や、胸部聴診所見、呼吸数等での異常の有無を慎重に観察すること。また、必要に応じて動脈血酸素飽和度や胸部 CT 等の検査を適切に実施し、慎重に経過を観察すること。肺障害の危険因子は現時点では明確でないため、肺障害の既往歴のない患者においても、慎重な経過観察を行う必要がある。[1.3.1、1.3.2、9.1.1、11.1.1 参照]
- 8.2 心障害による死亡例、うつ血性心不全の急性発現又は増悪、心嚢液貯留、左室駆出率低下が報告されているため、心障害の既往や症状の危険因子がある場合には、患者の状態には十分に注意すること。[11.1.2 参照]
- 8.3 本剤の投与により B 型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感

染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。  
[9.1.2、11.1.7 参照]

- ※8.4 末梢神経障害があらわれることがあるので、灼熱感、知覚過敏、感覺減退、錯覚、不快感、神経障害性疼痛等のニューロパチーの症状について観察すること。また、末梢性ニューロパチーが発現する可能性のある薬剤を併用する場合には注意すること。[7.1.1、7.1.2、9.1.3、11.1.3 参照]

- 8.5 国内臨床試験では重度の発熱性好中球減少症、好中球減少症（好中球数減少）及び貧血（ヘモグロビン減少）が認められているため、頻回に臨床検査（血液検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5 参照]

- ※8.6 本剤は血小板減少症を引き起こすことが認められている。本剤の投与前に毎回血小板数を確認すること。本剤投与により発現した血小板減少に伴う胃腸出血及び脳出血の報告例があるので、必要に応じ輸血を考慮すること。[7.1.1、7.1.2、11.1.5 参照]

- 8.7 本剤の投与により悪心、下痢、便秘及び嘔吐の発現が認められており、制吐剤又は止吐剤による処置を要することがある。脱水症状を予防するため、必要に応じ補液及び電解質補充を行うこと。本剤の投与期間中は嘔吐又は下痢がみられるため、患者には脱水症状を避ける適切な対処方法を指導すること。浮動性めまい、頭部ふらふら感又は失神発作があらわれた場合には、医師の診察を受けるよう患者を指導すること。
- また、イレウスが報告されているため、便秘を認めた患者は慎重に観察すること。[11.1.6 参照]

- 8.8 肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行うこと。[11.1.7 参照]

- 8.9 低血圧（起立性低血圧を含む）の管理には、必要に応じて降圧剤の調節、水分補給、ミネラルコルチコイド又は交感神経作動薬の投与等の支持療法を行うこと。[9.1.4、11.1.8 参照]

- 8.10 疲労、浮動性めまい、失神、起立性低血圧、霧視が起ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

- 8.11 肿瘍量の急激な減少に伴い、腫瘍崩壊症候群（tumor lysis syndrome）があらわれることがあるため、予防措置として、高尿酸血症治療剤の投与及び適切な水分補給等を考慮すること。急激に腫瘍量が減少した患者においては血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.9 参照]

### 〈原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫〉

- 8.12 本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書」等）<sup>1)</sup>を熟読すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴のある患者

#### 9.1.1 間質性肺炎、肺線維症等の肺障害の既往歴のある患者

投与前に間質性陰影を認めた患者で致死的な急性肺障害の経過をたどる例が報告されている。[1.3.1、1.3.2、8.1、11.1.1 参照]

#### 9.1.2 B 型肝炎ウイルスキャリアの患者又は HBs 抗原陰性で HBc 抗体陽性若しくは HBs 抗体陽性の患者

本剤の投与開始後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B 型肝炎ウイルスの再活性化の徵候や症状の発現に注意すること。本剤の投与により B 型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎があらわれることがある。[8.3、11.1.7 参照]

#### 9.1.3 末梢性ニューロパチーの症状（足又は手のしびれ、疼痛又は灼熱感）や徵候のある患者

本剤の投与期間中に症状が増悪（Grade 3 以上を含む）するおそれがある。[8.4、11.1.3 参照]

#### 9.1.4 失神の既往や症状がある患者、低血圧が発現する可能性のある薬剤を投与中の患者及び脱水状態にある患者

患者の状態を十分に観察すること。低血圧（起立性低血圧を含む）が投与期間を通じ報告されている。[8.9、11.1.8 参照]

#### 9.1.5 経口血糖降下剤を併用した糖尿病患者

血糖値を注意深く観察し、経口血糖降下剤の用量に留意して慎重に投与すること。海外臨床試験において、低血糖及び高血糖が報告されている。

### 9.3 肝機能障害患者

本剤のクリアランスが低下し、副作用が強くあらわれるおそれがある。[16.6.2 参照]

### 9.4 生殖能を有する者

妊娠可能年齢にある女性においては本剤投与中及び投与終了後一定期間は避妊するよう指導すること。

## 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、原則として投与しないこと。動物実験では、妊娠ウサギの器官形成期にボルテゾミブを 0.05mg/kg (0.6mg/m<sup>2</sup>) 投与したところ、有意な着床後死亡の増加とそれに伴う生存胎児数の減少が認められた。これらの生存胎児は有意な体重の減少も示した。

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

## 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。海外臨床試験において、65歳以上と65歳未満の患者で安全性及び有効性に差は認められなかつたが、高齢者では一般に生理機能が低下している。

なお、年齢別でのGrade 3以上の有害事象の発現頻度は、再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験(039試験)の本剤群においては50歳以下で64% (27/42例)、51~64歳で78% (128/165例)、65歳以上で75% (93/124例)であった。また、海外第Ⅱ相試験(024試験及び025試験)においては50歳以下で74% (29/39例)、51~65歳で80% (104/130例)、66歳以上で85% (74/87例) であった。

## 10. 相互作用

ヒト肝ミクロソームを用いた *in vitro* 試験より、ボルテゾミブがチトクローム P450 3A4、2C19 及び 1A2 の基質であることが示されている。本剤と CYP3A4 の基質、阻害剤又は誘導剤を併用している患者においては、副作用又は効果の減弱について注意深く観察すること。

### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4 阻害剤 ケトコナゾール <sup>注1)</sup> 等	ケトコナゾール (400mg/日を4日間反復経口投与) と併用したとき、ボルテゾミブの AUC は 35% 増加した <sup>2)</sup> 。	これらの薬剤の CYP3A4 に対する阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。
CYP3A4 誘導剤 リファンピシン等	リファンピシン (600mg/日を7日間反復経口投与) と併用したとき、ボルテゾミブの AUC は 45% 低下した <sup>3)</sup> 。	これらの薬剤の CYP3A4 に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。

注) 国内では外用剤のみ発売

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 肺障害

間質性肺炎 (0.2%、2.5%<sup>注1)</sup>)、急性肺水腫 (0.5%、0.4%<sup>注1)</sup>)、胸水 (0.1%、1.6%<sup>注1)</sup>)、急性呼吸窮迫症候群 (0.1%、頻度不明<sup>注1)</sup>) があらわれることがある。国内の臨床試験及び市販後の報告において、本剤との因果関係の否定できない肺障害（間質性肺炎）による死亡例が認められており<sup>4)</sup>、海外と比較して肺障害の発生頻度が高い可能性がある。なお、肺障害の対処方法及び可能性のあるリスク因子について臨床試験では確認されていない。急性骨髄性白血病に対し、本剤、ダウフルビシン塩酸塩及び高用量シラビンの24時間持続点滴 (2000mg/m<sup>2</sup>/日) を併用した海外の臨床試験において、本剤との因果関係を否定できない急性呼吸窮迫症候群による死亡が報告されている。[1.3.1、1.3.2、8.1、9.1.1 参照]

#### 11.1.2 心障害

うつ血性心不全 (1.3%)、心嚢液貯留 (0.1%)、心原性ショック (0.1%)、心停止 (0.1%)、心肺停止 (頻度不明) があらわれることがある。また、投与前の左室駆出率に異常の無い患者においても左室駆出率低下が報告されている。海外臨床試験において QT 間隔延長の報告があるが、薬剤との関連性については明らかになっていない。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験において、本剤群及びデキサメタゾン群で発現した心障害の発現頻度はそれぞれ 14% 及び 12% であった。そのうち心不全等（急性肺水

腫、心不全、うつ血性心不全、心原性ショック、肺水腫）の発現頻度はそれぞれ 5% 及び 4% であった。[8.2 参照]

#### \*\*11.1.3 末梢神経障害

末梢性感覺ニューロパチー (28.2%)、神経障害性疼痛 (14.8%)、錯覚 (8.6%)、末梢性ニューロパチー (8.1%)、感覺減退 (3.6%)、末梢性運動ニューロパチー (2.3%)、灼熱感 (0.4%) があらわれることがあり、重症の感覺性ニューロパチーも報告されている。本剤の投与により、感覺障害による末梢性ニューロパチーが主に認められるが、感覺障害と運動障害が混在するニューロパチーの発現例も報告されている。末梢性ニューロパチーに加えて、起立性低血圧やイレウスを伴う重度の便秘等、一部の有害事象に自律神経ニューロパチーが関与している可能性があるが、十分な情報は得られていない。また、本剤の投与により糖尿病性ニューロパチー等の基礎疾患を悪化させる可能性がある。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験において Grade 2 以上の末梢性ニューロパチーを認めた患者では用量調整により末梢性ニューロパチーの改善あるいは回復が 51% で認められた。また、海外第Ⅱ相試験において Grade 3 以上の末梢性ニューロパチーを発現した患者又は Grade 2 のニューロパチーを呈し、投与を中止した患者では、末梢性ニューロパチーの改善あるいは回復が 73% で認められた。[7.1.1、7.1.2、8.4、9.1.3 参照]

#### 11.1.4 ギラン・バレー症候群、脱髓性多発ニューロパチー（頻度不明）

#### 11.1.5 骨髄抑制

血小板減少 (39.0%)、好中球減少 (34.8%)、貧血 (21.9%)、白血球減少 (17.9%)、リンパ球減少 (10.9%)、発熱性好中球減少症 (2.8%)、汎血球減少 (0.1%) があらわれることがある。骨髄機能が抑制された結果、感染症（敗血症性ショック等）や出血等の重篤な副作用が発現することがある。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験における重症の出血 (Grade 3 以上) の発現率は本剤群で 4%、デキサメタゾン群で 5% であった。血小板数は各サイクルの 11 日目に最低値に達し、通常は次サイクル開始前までに回復した。血小板数の減少と回復のパターンは週 2 回投与の 8 サイクルにわたり一貫しており、蓄積性の血小板減少症は認められなかつた。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験において血小板数の最低値の平均は、投与開始前の約 40% であった。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験における投与開始前の血小板数と血小板減少症の重症度との関係を以下の表に示す。[8.5、8.6 参照]

再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験における投与開始前の血小板数と血小板減少症の重症度との関係

投与開始前の 血小板数 <sup>注2)</sup>	患者数 (n=331) <sup>注3)</sup>	10,000/ $\mu$ L 未満 の 患者数 (%)	10,000~ 25,000/ $\mu$ L の 患者数 (%)
75,000/ $\mu$ L 以上	309	8 (3%)	36 (12%)
50,000/ $\mu$ L 以上 75,000/ $\mu$ L 未満	14	2 (14%)	11 (79%)
10,000/ $\mu$ L 以上 50,000/ $\mu$ L 未満	7	1 (14%)	5 (71%)

注 2) 投与開始前の血小板数として 50,000/ $\mu$ L 以上を臨床試験の選択基準とした。

注 3) 投与開始前のデータが 1 例で不明

#### 11.1.6 イレウス (0.7%)

食欲不振、嘔吐、便秘、腹部膨満感等の症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。[8.7 参照]

#### 11.1.7 肝機能障害

AST の増加 (0.7%)、ALT の増加 (0.7%)、 $\gamma$ -GTP の増加 (0.6%)、ALP の増加 (0.5%) 及び血中ビリルビンの増加 (0.6%) 等を伴う肝機能障害 (B 型肝炎ウイルスの再活性化によるものを含む) があらわれることがある。[8.3、8.8、9.1.2 参照]

#### 11.1.8 低血圧

低血圧 (3.0%)、起立性低血圧 (2.2%) があらわれることがある。低血圧の機序は不明であるが、一部は自律神経ニューロパチーが関与している可能性がある。[8.9、9.1.4 参照]

#### 11.1.9 腫瘍崩壊症候群 (0.3%)

[8.11 参照]

11.1.10 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、中毒性表皮壊死症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN) (頻度不明)

11.1.11 発熱 (12.4%)

本剤の投与日から翌日にかけて高頻度に Grade 1~2 の薬剤性の発熱があらわれることがあるので、患者の状態を観察し、必要に応じて解熱剤等による処置を考慮すること。また発熱が持続する場合や呼吸器症状を伴う場合には、肺障害の可能性について注意すること。

11.1.12 可逆性後白質脳症候群 (頻度不明)

痙攣、血圧上昇、頭痛、意識障害、錯乱、視覚障害等があらわれることがある。

11.1.13 進行性多巣性白質脳症 (頻度不明)

本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻痺症状（片麻痺、四肢麻痺）、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRI による画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注1) 日本人における発現率（多発性骨髄腫を対象とした静脈内投与における国内臨床試験、特定使用成績調査及び使用成績調査、並びにマントル細胞リンパ腫、多発性骨髄腫及び全身性ALアミロイドーシスを対象とした国際共同試験（日本人症例のみ）の集計）

11.2 その他の副作用

		10%以上	10%未満 5%以上	5%未満	頻度不明
感染症	感染	帯状疱疹、肺炎	単純ヘルペス、鼻咽頭炎、敗血症、口腔カンジダ症、麦粒腫、感染性腸炎、膀胱炎、中耳炎、蜂巣炎、毛包炎	気管支肺炎、白癡感染、外耳炎	
血液			出血、白血球数増加、好中球数増加、單球数増加		
免疫系障害			過敏症		
代謝・栄養	食欲不振		体重減少、脱水、高血糖、高尿酸血症、低アルブミン血症、低血糖症、高アミラーゼ血症	高コレステロール血症	
電解質			低カリウム血症、低ナトリウム血症、高カリウム血症、高カルシウム血症	高ナトリウム血症	
精神神経系		頭痛、不眠症	浮動性めまい、うつ病、失神、味覚異常、嗜眠、神経痛、不安、痙攣、傾眠、体位性めまい	嗅覚錯覚	
眼			霧視、結膜炎、眼瞼炎、眼部腫脹、ドライアイ、霰粒腫	角膜びらん、眼瞼出血、後天性涙腺炎、視力障害	
循環器			高血圧、心房細動、動悸、頻脈、期外収縮、不整脈、心房粗動、徐脈	心電図 QT 延長	

	10%以上	10%未満 5%以上	5%未満	頻度不明
呼吸器			呼吸困難、咳嗽、鼻出血、咽喉頭疼痛、鼻漏、肺高血圧症	喀血、上気道の炎症、咽頭不快感、無気肺、胸膜炎、気胸
消化器	下痢、恶心、便秘、嘔吐	腹痛	消化不良、口内炎、腹部膨満、胃炎、鼓腸、胃腸出血、歯肉炎、嚥下障害、胃食道逆流、腸炎、過敏性腸症候群、歯周炎、レッチング、舌潰瘍、おくび、齶歯	口唇炎、耳下腺腫大
肝臓			肝機能異常	肝障害
皮膚		発疹	そう痒症、脱毛症、紅斑、多汗症、蕁麻疹、点状出血、顔面腫脹、紫斑、多形紅斑、葉疹、紅色汗疹、皮膚出血	好中球浸潤・有痛性紅斑・発熱を伴う皮膚障害（Sweet 症候群）、丘疹、水疱性皮膚炎
筋骨格		筋骨格痛	筋痙攣、筋痛、筋力低下、骨痛、筋骨格硬直、関節炎	
腎臓・泌尿器			腎機能障害、排尿障害（尿閉、神経因性膀胱等）、尿中血陽性	蛋白尿、 $\beta_2$ ミクログロブリン增加、尿沈渣異常
全身	疲労、無力症	浮腫	悪寒、疼痛、倦怠感、口渴、胸痛、顔面浮腫	
その他			注射部位反応、静脈炎、潮紅、血中クレアチニン增加、総蛋白減少、ほどり、PO <sub>2</sub> 低下、末梢冷感、血中重炭酸塩減少、血中尿酸減少	LDH 増加、CRP 増加、腫瘍熱、PO <sub>2</sub> 上昇、血中クレアチニン減少、総蛋白增加、血中重炭酸塩増加

13. 過量投与

13.1 徴候、症状

推奨用量の2倍を超えた過量投与により、致命的な転帰を伴う急性の症候性低血圧及び血小板減少症が報告されている。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 静脈内投与

1 バイアルを日局生理食塩液 3.0mL で溶解して使用すること。

14.1.2 皮下投与

1 バイアルを日局生理食塩液 1.2mL で溶解して使用すること。

注射液の調製法

投与経路	ボルテゾミブ (mg/バイアル)	日局生理食塩液	ボルテゾミブ 最終濃度
静脈内投与	3.0mg	3.0mL	1.0mg/mL
皮下投与	3.0mg	1.2mL	2.5mg/mL

14.1.3 本剤の取り扱い及び調製にあたっては、手袋を使用するなど慎重に行うこと。本剤が皮膚又は粘膜に触れた場合には、直ちに石鹼でよく洗うこと。

#### 14.2 薬剤投与時の注意

本剤のバイアルは1回使い切りである。溶解後は8時間以内に使用すること。バイアル中の未使用残液は適切に廃棄すること。

#### 14.2.1 静脈内投与

他の薬剤の混入を避けるため、本剤投与のためのルートを留置して実施すること。他の薬剤が投与されているルートを用いての投与は行わないこと。また、延長チューブを使用した際は、投与後速やかに日局生理食塩液でフラッシングを行うこと。

#### 14.2.2 皮下投与

繰り返し皮下投与する場合には、左右の大腿部、腹部等に交互に投与するなど同一注射部位を避けること。

### 15. その他の注意

#### 15.2 非臨床試験に基づく情報

15.2.1 動物（サル及びイヌ）を用いた試験において、ボルテゾミブを体表面積換算で臨床推奨用量の約2～3倍量を静脈内投与することにより、心拍数増加、心筋収縮力減弱及び低血圧が認められ、死に至った。この心筋収縮力減弱及び低血圧の状態においても、陽性変力作用を示す薬剤あるいは昇圧剤投与に対する反応は認められた。イヌの試験において、致死用量ではQTc間隔の軽度な延長が認められた<sup>5)</sup>。

15.2.2 動物実験（ラット）において、0.20及び0.15mg/kg（1.20及び0.90mg/m<sup>2</sup>）群で精巢-精上皮の変性/萎縮及び低用量から卵巣黄体の單細胞壊死が認められた<sup>6)</sup>。

15.2.3 チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験で、評価を行った最低用量である3.125μg/mL以上で染色体異常誘発性（構造的染色体異常）を示した<sup>7)</sup>。

### 16. 薬物動態

#### 16.1 血中濃度

##### 16.1.1 単独投与

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者に、ボルテゾミブ0.7、1.0又は1.3mg/m<sup>2</sup>（各n=3、6又は5～7）を単独で、1日1回、週2回、2週間（1、4、8、11日目）静脈内投与したときの1日目及び11日目における血漿中ボルテゾミブ濃度を検討した。

各用量群の血漿中濃度推移は類似しており、速やかな分布相とそれに続く緩やかな長い消失相を特徴とする二相性の低下を示した。また、最終消失相における分布容積（V<sub>d</sub>）より、ボルテゾミブの組織移行性が良好であることが示唆された。投与日間での比較の結果、1日目と比較し、11日目において、消失半減期（t<sub>1/2</sub>）の延長、全身クリアランス（CL）の低下が各用量群で見られた。このことに伴い、投与終了時の血漿中濃度（C<sub>0</sub>）並びに血漿中濃度-時間曲線下面積（AUC）も1日目より11日目で高値を示した。一方、用量間での比較の結果、C<sub>0</sub>に用量相関性は認められなかつたが、AUCに関しては各試験日において、個体間でのばらつきは大きいが、用量相関性が認められた<sup>8)、9)</sup>。

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者にボルテゾミブを0.7、1.0又は1.3mg/m<sup>2</sup>で静脈内投与したときの各試験日における血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ（解析法：ノンコンパートメントモデル）

薬物動態 パラメータ	試 験日	0.7mg/m <sup>2</sup> (n=3)		1.0mg/m <sup>2</sup> (n=6)		1.3mg/m <sup>2</sup> (n=5～ 7) <sup>注)</sup>	
		平均値	SD	平均値	SD	平均値	SD
C <sub>0</sub> (ng/mL)	1	73.75	7.89	144.92	179.31	185.84	57.65
	11	130.68	71.97	147.19	72.33	187.03	54.31
AUC (ng · hr/mL)	1	14.04	0.70	28.58	24.86	46.50	19.89
	11	112.01	47.74	108.39	52.32	186.60	49.79
t <sub>1/2</sub> (hr)	1	3.31	0.88	6.81	8.81	16.11	20.75
	11	64.59	30.29	32.46	12.91	57.39	24.92
CL (L/hr)	1	83.35	10.52	105.41	75.66	51.97	18.99
	11	11.77	4.67	19.63	14.50	12.10	3.73
V <sub>d</sub> (L)	1	406.92	154.03	520.08	349.87	894.41	682.35
	11	978.51	263.13	731.69	242.35	957.81	350.40

注) 1日目:n=7、11日目:n=5

##### 16.1.2 単独又は併用投与

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者に、ボルテゾミブ0.7、1.0又は1.3mg/m<sup>2</sup>（各n=6、5～6又は3～4）を単独又はメルファラン及びプレドニゾロン併用で静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブ濃度を検討した。その結果、血漿中ボル

テゾミブの薬物動態はボルテゾミブ単独投与時とメルファラン及びプレドニゾロン併用で大きく異ならなかった<sup>10)</sup>。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者にボルテゾミブ0.7、1.0又は1.3mg/m<sup>2</sup>を単独又はメルファラン及びプレドニゾロン併用で静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ

薬物動態 パラメータ	投 与法	0.7mg/m <sup>2</sup> (n=6)		1.0mg/m <sup>2</sup> (n=5～ 6) <sup>注1)</sup>		1.3mg/m <sup>2</sup> (n=3～ 4) <sup>注2)</sup>	
		平均値	SD	平均値	SD	平均値	SD
C <sub>0.08h</sub> (ng/mL)	単独	45.4	10.1	59.4	18.9	120	24.5
	併用	34.4	5.8	69.5	19.5	88.9	19.6
AUC <sub>last</sub> (ng · hr/mL)	単独	28.8	14.6	62.6	24.8	115	28.7
	併用	26.7	12.9	82.8	13.8	75.6	20.4

注1) ボルテゾミブ単独投与時:n=6、メルファラン及びプレドニゾロン併用時:n=5

注2) ボルテゾミブ単独投与時:n=4、メルファラン及びプレドニゾロン併用時:n=3

#### 16.1.3 単独投与

前治療歴のある多発性骨髄腫患者に、ボルテゾミブ1.3mg/m<sup>2</sup>を単独で、1日1回、週2回、2週間（1、4、8、11日目）皮下投与（n=17）及び静脈内投与（n=14）したとき11日目における血漿中ボルテゾミブ濃度を検討した。その結果、ボルテゾミブ皮下投与時のC<sub>max</sub>は静脈内投与時の約1/10であったが、AUC<sub>last</sub>は両投与間で大きく異ならなかった<sup>11)</sup>。（外国人データ）

前治療歴のある多発性骨髄腫患者にボルテゾミブ1.3mg/m<sup>2</sup>を皮下投与及び静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ（解析法：ノンコンパートメントモデル）

薬物動態 パラメータ	皮下投与 (n=17)		静脈内投与 (n=14)	
	平均値	SD	平均値	SD
C <sub>max</sub> (ng/mL)	20.4	8.87	223	101
t <sub>max</sub> (hr) <sup>注)</sup>	0.50	(0.08～ 1.00)	0.03	(0.03～ 0.08)
AUC <sub>last</sub> (ng · hr/mL)	155	56.8	151	42.9

注) 中央値（最小値～最大値）

### 16.2 吸収

#### 16.2.1 血漿蛋白結合率

ヒトにおけるボルテゾミブの血漿蛋白結合率は78.9～85.7%であった<sup>12)</sup>（*in vitro*、限外ろ過法、10～1000ng/mL）。

#### 16.4 代謝

ヒトにおけるボルテゾミブの主な代謝経路は脱ホウ素化であり、ヒト肝ミクロソームを用いた *in vitro* 試験より、ボルテゾミブが主にチトクローム P450 3A4、2C19 及び 1A2 の基質であることが示されている。チトクローム P450 2D6 及び 2C9 の寄与は小さい。また、ヒト肝ミクロソームを用いた *in vitro* 試験より、ボルテゾミブによるチトクローム P450 1A2、2C9、2D6 及び 3A4への阻害能は弱いが（IC<sub>50</sub>=>30μmol/L、>11.5μg/mL）、チトクローム P450 2C19に対する阻害能（IC<sub>50</sub>=18μmol/L、6.9μg/mL）が示されているため、本酵素の基質である薬剤の血中濃度を上昇させる可能性がある。初代培養ヒト肝細胞を用いた *in vitro* 試験より、ボルテゾミブによるチトクローム P450 1A2 及び 3A4 の明確な誘導能は認められなかった。

代謝物の活性の有無：脱ホウ素化された代謝物は活性を示さない<sup>13)、14)</sup>。

#### 16.5 排泄

ヒトにおけるボルテゾミブの排泄経路は特定されていない。

#### 16.6 特定の背景を有する患者

##### 16.6.1 腎機能障害

クレアチニクリアランス値（CrCL）で分類した様々な程度の腎機能を有する患者を対象に、ボルテゾミブの薬物動態試験を実施した。また、透析後にボルテゾミブを投与した透析患者も本試験に組み入れた。ボルテゾミブ0.7～1.5mg/m<sup>2</sup>を週2回静脈内投与したときの8日目のボルテゾミブのクリアランス（CL）は以下の通りであった<sup>15)</sup>。（外国人データ）

##### 腎機能の程度別の血漿中ボルテゾミブのCL（8日目）

腎機能の 程度 (CrCL)	≥60 mL/min/ 1.73m <sup>2</sup>	40～59 mL/min/ 1.73m <sup>2</sup>	20～39 mL/min/ 1.73m <sup>2</sup>	<20 mL/min/ 1.73m <sup>2</sup>	透析群
n <sup>注)</sup>	14	11	16	3	8
平均値	31.1	31.1	27.9	27.7	24.7
SD	9.8	17.3	15.8	13.4	10.1

注) 薬物動態評価対象例数

## 16.6.2 肝機能障害

ビリルビン値で分類した様々な程度の肝機能を有する患者を対象に、ボルテゾミブ 0.5~1.3mg/m<sup>2</sup> を週2回静脈内投与したときのボルテゾミブの用量で規格化した AUC は以下の通りであった<sup>16)</sup>。 (外国人データ) [9.3 参照]

肝機能の程度別の血漿中ボルテゾミブの用量で規格化した AUC (8 日目)

肝機能の程度 (ビリルビン 値)	施設基準値 以下	施設基準値の > 1.0~1.5 倍	施設基準値の > 1.5~3 倍	施設基準値の > 3 倍
n <sup>注)</sup>	11	9	8	14
幾何平均値	52.2	51.9	85.0	83.2
変動係数 (%)	26	91	27	57

注) 薬物動態評価対象例数

## 16.8 その他

ボルテゾミブ注射用 3mg 「タカタ」は、ペルケイド注射用 3mg と添加剤の種類及び含量 (濃度) が同一となるよう処方設計を行ったものであり、pH、粘度、浸透圧、ボルテゾミブの複合体比率などの製剤学的な評価項目を比較した結果、両剤の同等性が確認された<sup>17)</sup>。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈多発性骨髄腫〉

#### 17.1.1 海外第Ⅲ相比較試験 (039 試験)

再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する海外第Ⅲ相比較試験 (039 試験) における成績概要は以下のとおりであった。

1~3回の前治療歴を有する患者を対象とする無作為化非盲検群間比較試験のボルテゾミブ群では 1.3mg/m<sup>2</sup> を静脈内投与した。腫瘍増殖抑制期間 (TTP) は、デキサメタゾン群の 3.5 カ月 (中央値) に対して、ボルテゾミブ群で 6.2 カ月 (中央値) であった。生存期間のハザード比は、0.57 (95%信頼区間 0.40, 0.81; p < 0.05) であった。なお、生存期間中央値は、全患者のボルテゾミブ群で 16.6 カ月であった以外は、追跡期間が短くすべて評価不能であった<sup>18)</sup>。

海外第Ⅲ相比較試験 (039 試験) における有効性解析の要約

評価項目	全患者		前治療回数 1 回 のみ		前治療回数 > 1 回	
	ボルテ ゾミブ	デキサ メタ ゾン	ボルテ ゾミブ	デキサ メタ ゾン	ボルテ ゾミブ	デキサ メタ ゾン
n	333	n=336	n=132	n=119	n=200	n=217
TTP						
イベント数 (%)	147 (44)	196 (58)	55 (42)	64 (54)	92 (46)	132 (61)
中央値 (月) (95%信頼区間)	6.2 (4.9, 6.9)	3.5 (2.9, 4.2)	7.0 (6.2, 8.8)	5.6 (3.4, 6.3)	4.9 (4.2, 6.3)	2.9 (2.8, 3.5)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.55 (0.44, 0.69)		0.55 (0.38, 0.81)		0.54 (0.41, 0.72)	
p 値 <sup>注1)</sup>	< 0.0001		0.0019		< 0.0001	
生存期間						
死亡患者数 (%)	51 (15)	84 (25)	12 (9)	24 (20)	39 (20)	60 (28)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.57 (0.40, 0.81)		0.39 (0.19, 0.81)		0.65 (0.43, 0.97)	
p 値 <sup>注1)</sup>	< 0.05		< 0.05		< 0.05	

注1) 無作為化の層別因子により調整した Log-rank 検定での p 値

331 例中 324 例 (97.9%) に副作用が認められた。主な副作用 [10% 以上を記載] は、下痢 [173 例 52.3%]、悪心 [172 例 52.0%]、疲労 [131 例 39.6%]、血小板減少 [109 例 32.9%]、食欲不振 [100 例 30.2%]、便秘 [99 例 29.9%]、嘔吐 [96 例 29.0%]、末梢性ニューロパチー [93 例 28.1%]、発熱 [67 例 20.2%]、錯覚 [65 例 19.6%]、無力症 [64 例 19.3%]、貧血 [63 例 19.0%]、頭痛 [62 例 18.7%]、発疹 [61 例 18.4%]、筋骨格痛 [61 例 18.4%]、好中球減少 [59 例 17.8%]、腹痛 [54 例 16.3%]、呼吸困難 [42 例 12.7%]、感染 [39 例 11.8%]、末梢性感觉ニューロパチー [38 例 11.5%] であった。[5.、7.3 参照]

#### 17.1.2 海外第Ⅲ相試験 (MMY3002 試験)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫に対する海外第Ⅲ相試験 (MMY3002 試験) における成績概要は以下のとおりであった。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者を対象とする無作為化非盲検群間比較試験において、メルファラン 9mg/m<sup>2</sup> と prednisone\*60mg/m<sup>2</sup> の併用療法 (MP 療法) と MP 療法にボルテゾミブ<sup>注1)</sup> (静脈内投与) 1.3mg/m<sup>2</sup> を上乗せした MPB

療法を比較した。腫瘍増殖抑制期間 (TTP) は、MP 群の 15.0 カ月 (中央値) に対して、MPB 群で 20.7 カ月 (中央値) であった。生存期間は、MP 群の 43.1 カ月 (中央値) に対して、MPB 群では未到達であった<sup>19,20)</sup>。

海外第Ⅲ相試験 (MMY3002 試験) における有効性解析の要約

	MPB n=344	MP n=338
TTP		
イベント数 (%)	101 (29)	152 (45)
中央値 (月) (95%信頼区間)	20.7 (17.6, 24.7)	15.0 (14.1, 17.9)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.54 (0.42, 0.70)	
p 値 <sup>注2)</sup>	0.000002	
生存期間		
死亡患者数 (%)	109 (32)	148 (44)
中央値 (月) (95%信頼区間)	NE (46.2, NE)	43.1 (34.8, NE)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.65 (0.51, 0.84)	
p 値 <sup>注2)</sup>	0.00084	

注1) 1 サイクルを 21 日間として、ボルテゾミブ 1.3mg/m<sup>2</sup> を、第 1~8 サイクルの第 1、4、8 及び 11 日目、第 9~18 サイクルの第 1 及び 8 日目に静脈内投与。

注2) 無作為化の層別因子により調整した Log-rank 検定での p 値

340 例中 331 例 (97.4%) に副作用が認められた。主な副作用 [10% 以上を記載] は、血小板減少 [164 例 48.2%]、好中球減少 [163 例 47.9%]、末梢性感觉ニューロパチー [148 例 43.5%]、悪心 [134 例 39.4%]、下痢 [119 例 35.0%]、神経障害性疼痛 [117 例 34.4%]、貧血 [109 例 32.1%]、白血球減少 [108 例 31.8%]、嘔吐 [87 例 25.6%]、疲労 [85 例 25.0%]、リンパ球減少 [78 例 22.9%]、便秘 [77 例 22.7%]、食欲不振 [70 例 20.6%]、腹痛 [63 例 18.5%]、感染 [59 例 17.4%]、発熱 [55 例 16.2%]、無力症 [54 例 15.9%]、発疹 [48 例 14.1%]、錯覚 [41 例 12.1%]、筋骨格痛 [41 例 12.1%]、帶状疱疹 [40 例 11.8%]、不眠症 [35 例 10.3%] であった。[5.、7.3 参照]

\*: 国内未承認

#### 17.1.3 國際共同第Ⅲ相試験 (MMY3007 試験)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫に対する国際共同第Ⅲ相試験 (MMY3007 試験) における成績概要は以下のとおりであった。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者 680 例 (日本人患者 24 例を含む) を対象とする無作為化非盲検群間比較試験において、ボルテゾミブ<sup>注1)</sup> 1.3mg/m<sup>2</sup> (皮下又は静脈内投与)、メルファラン 9mg/m<sup>2</sup> 及びプレドニゾロン又は prednisone\* 60mg/m<sup>2</sup> の併用療法 (MPB 療法) と MPB 療法にダラツムマブ (遺伝子組換え) 16mg/kg を上乗せした DMPB 療法を比較した。主要評価項目である無増悪生存期間 (PFS) は、DMPB 群では未到達、MPB 群で 17.9 カ月 (中央値) (95%信頼区間: 16.1~19.8) であり、DMPB 群で統計学的に有意な延長を示した [ハザード比: 0.51、95%信頼区間: 0.39~0.67、p < 0.0001<sup>注2)</sup>] <sup>21)</sup>。

注1) 1 サイクルを 21 日間として、ボルテゾミブ 1.3mg/m<sup>2</sup> を、第 1~2 サイクルの第 1、4、8 及び 11 日目、第 3~18 サイクルの第 1 及び 8 日目に皮下又は静脈内投与。

注2) 無作為化の層別因子により調整した Log-rank 検定での p 値  
\*: 国内未承認

333 例 (日本人 11 例を含む) 中 250 例 (75.1%) に副作用が認められた。主な副作用 [10% 以上を記載] は、血小板減少 [115 例 34.5%]、好中球減少 [104 例 31.2%]、末梢性感觉ニューロパチー [92 例 27.6%]、貧血 [39 例 11.7%] であった。[5.、7.3 参照]

#### 17.1.4 海外第Ⅲ相試験 (MMY3021 試験)

前治療歴のある多発性骨髄腫患者に対する海外第Ⅲ相試験 (MMY3021 試験) における成績概要は以下のとおりであった。

1~3 回の前治療歴を有する患者を対象とする無作為化非盲検非劣性試験の皮下投与群及び静脈内投与群ではボルテゾミブ 1.3mg/m<sup>2</sup> を投与した。主要評価項目であるサイクル 4 までの全奏効率 (ORR) は、皮下投与群、静脈内投与群とともに 42% であり、非劣性が検証された。副次評価項目である腫瘍増殖抑制期間 (TTP) 及び 1 年生存率は、静脈内投与群で 9.4 カ月 (中央値) 及び 76.7%、皮下投与群で 10.4 カ月 (中央値) 及び 72.6% であった<sup>11)</sup>。

### 海外第Ⅲ相試験 (MMY3021 試験) における有効性解析の要約

	ボルテゾミブ静脈内 投与	ボルテゾミブ皮下 投与
サイクル 4までの全奏効率 (ORR <sup>注1)</sup>		
評価例数	73	145
全奏効例数	31	61
ORR (%)	42	42
p 値 <sup>注2)</sup>	0.00201	
ORR 比 (95%信頼区間)	0.99 (0.71, 1.37)	
TPP		
評価例数	74	148
中央値 (月) (95%信頼区間)	9.4 (7.6, 10.6)	10.4 (8.5, 11.7)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.839 (0.564, 1.249)	
p 値 <sup>注3)</sup>	0.38657	
1年生存率 (%) (95%信頼区間)	76.7 (64.1, 85.4)	72.6 (63.1, 80.0)

注1) CR+PR

注2) 非劣性検定での p 値

注3) 無作為化の層別因子により調整した Log-rank 検定での p 値

ボルテゾミブを皮下投与した症例において、147 例中 124 例 (84%) に副作用が認められた。主な副作用 [10%以上を記載] は、末梢性感覚ニューロパシー [51 例 35%]、血小板減少 [44 例 30%]、好中球減少 [34 例 23%]、神経痛 [34 例 23%]、貧血 [28 例 19%]、下痢 [28 例 19%]、白血球減少 [26 例 18%]、悪心 [24 例 16%]、発熱 [18 例 12%] であった。なお、皮下投与による局所注射部位反応は 85 例 (58%) に認められた。[5., 7.3 参照]

#### 〈マントル細胞リンパ腫〉

##### \*\*17.1.5 國際共同第Ⅲ相試験 (LYM3002 試験)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療のマントル細胞リンパ腫に対する国際共同第Ⅲ相試験 (LYM3002 試験) の成績概要は以下のとおりであった。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療のマントル細胞リンパ腫患者を対象とする無作為化非盲検群間比較試験において、リツキシマブ (遺伝子組換え) 375mg/m<sup>2</sup>、シクロホスファミド 750mg/m<sup>2</sup>、ドキソルビシン 50mg/m<sup>2</sup>、ビンクリスチン 1.4mg/m<sup>2</sup> 及び prednisone\*100mg/m<sup>2</sup> の併用療法 (R-CHOP 療法<sup>注1)</sup> と、R-CHOP 療法のビンクリスチンをボルテゾミブに置き換えた VcR-CAP 療法<sup>注2)</sup> (ボルテゾミブ [静脈内投与] 1.3mg/m<sup>2</sup>、リツキシマブ (遺伝子組換え) 375mg/m<sup>2</sup>、シクロホスファミド 750mg/m<sup>2</sup>、ドキソルビシン 50mg/m<sup>2</sup> 及び prednisone\*100mg/m<sup>2</sup>) を比較した。無増悪生存期間 (PFS) は、R-CHOP 群の 14.4 カ月 (中央値) に対して、VcR-CAP 群で 24.7 カ月 (中央値) であった。生存期間は、R-CHOP 群の 56.3 カ月 (中央値) に対して、VcR-CAP 群では未到達であった<sup>22)</sup>。

### 国際共同第Ⅲ相試験 (LYM3002 試験) における有効性解析の要約

	VcR-CAP n=243	R-CHOP n=244
PFS		
イベント数 (%)	133 (55)	165 (68)
中央値 (月) (95%信頼区間)	24.7 (19.8, 31.8)	14.4 (12.0, 16.9)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.63 (0.50, 0.79)	
p 値 <sup>注3)</sup>	< 0.001	
生存期間		
死亡患者数 (%)	71 (29)	87 (36)
中央値 (月) (95%信頼区間)	NE (56.0, NE)	56.3 (47.2, NE)
ハザード比 (95%信頼区間)	0.80 (0.59, 1.10)	
p 値 <sup>注3)</sup>	0.173	

注1) 21 日間を 1 サイクルとして、リツキシマブ (遺伝子組換え) 375mg/m<sup>2</sup>、シクロホスファミド 750mg/m<sup>2</sup>、ドキソルビシン 50mg/m<sup>2</sup> 及びビンクリスチン 1.4mg/m<sup>2</sup> (最大 2mg) を 1 日目に静脈内投与並びに prednisone\*100mg/m<sup>2</sup> を 1~5 日目に経口投与

注2) 21 日間を 1 サイクルとして、ボルテゾミブ 1.3mg/m<sup>2</sup> を 1, 4, 8 及び 11 日目に静脈内投与、リツキシマブ (遺伝子組換え) 375mg/m<sup>2</sup>、シクロホスファミド 750mg/m<sup>2</sup> 及びドキソルビシン 50mg/m<sup>2</sup> を 1 日目に静脈内投与並びに prednisone\*100mg/m<sup>2</sup> を 1~5 日目に経口投与

注3) 無作為化の層別因子により調整した Log-rank 検定での p 値

\*: 国内未承認

240 例 (日本人 7 例を含む) 中 227 例 (94.6%) に副作用が認められた。主な副作用 [10%以上を記載] は、好中球減少 [190 例 79.2%]、血小板減少 [163 例 67.9%]、白血球減少 [100 例 41.7%]、貧血 [86 例 35.8%]、下痢 [57 例 23.8%]、末梢性感覚ニューロパシー [52 例 21.7%]、リンパ球減少 [48 例 20.0%]、悪心 [44 例 18.3%]、疲労 [42 例 17.5%]、便秘 [41 例 17.1%]、発熱性好中球減少症 [36 例 15.0%]、発熱 [33 例 13.8%]、食欲不振 [31 例 12.9%]、無力症 [29 例 12.1%]、神経痛 [25 例 10.4%] であった。[5., 7.5 参照]

#### 17.2 製造販売後調査等

再発又は難治性の多発性骨髄腫及び未治療の多発性骨髄腫患者を対象にボルテゾミブを静脈内投与した特定使用成績調査及び使用成績調査において、1186 例中 1060 例 (89.4%) に副作用が認められた<sup>23)</sup>。

#### 17.3 その他

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象にボルテゾミブを静脈内投与した国内臨床試験、及び未治療の多発性骨髄腫患者を対象にメルファラン及びプレドニゾロンとの併用でボルテゾミブを静脈内投与した国内臨床試験の安全性評価症例において、133 例中 133 例 (100%) に副作用が認められた<sup>24)</sup>。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

18.1.1 ボルテゾミブは、腫瘍細胞のプロテアソームを阻害することにより、その増殖を抑制しアポトーシスを誘導する<sup>25)</sup>。

18.1.2 ボルテゾミブは、細胞の増殖やアポトーシスを制御する転写因子 NF- $\kappa$ B の活性化を阻害する<sup>26)</sup>。

18.1.3 ボルテゾミブは、NF- $\kappa$ B の活性化を阻害することにより、骨髄腫細胞と骨髄ストローマ細胞の接着を阻害し、IL-6 等のサイトカインの分泌を抑制し、骨髄腫細胞の増殖を抑制する<sup>27), 28)</sup>。

#### 18.2 薬理作用

18.2.1 ボルテゾミブは、in vitro 試験において、ヒト骨髄腫由来 RPMI8226 及び U266 細胞株、ヒトマントル細胞リンパ腫由来 SP53、MINO、Grant 519 及び Jeko-1 細胞株並びに多発性骨髄腫及びマントル細胞リンパ腫患者から分離した腫瘍細胞の増殖を抑制し、アポトーシスを誘導した。また、ドキソルビシン、ミトキサントロン、メルファラン又はデキサメタゾンに耐性となった骨髄腫細胞株に対しても増殖抑制作用を示した<sup>25), 28)</sup>。


18.2.2 ボルテゾミブは、RPMI8226 細胞株を移植した担癌マウスにおいて、腫瘍の増大を抑制し、延命効果を示した<sup>26), 27)</sup>。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ボルテゾミブ (Bortezomib) (JAN)

化学名：{(1R)-3-Methyl-1-[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido) propanamido] butyl} boronic acid

化学構造式：



分子式：C<sub>19</sub>H<sub>25</sub>BN<sub>4</sub>O<sub>4</sub>

分子量：384.24

性状：白色の粉末

施光度：[a]<sub>D</sub><sup>20</sup> : -50~ -56° (乾燥物に換算したもの 50mg、メタノール、10mL、100mm)

#### 20. 取扱い上の注意

包装開封後もバイアルを箱に入れて遮光保存すること。

#### 21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

#### 22. 包装

1 バイアル

#### 23. 主要文献

1) 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構：医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書 (ボルテゾミブ：原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫) 2017 : 1-52

2) Venkatakrishnan, K. et al. : Clin. Ther. 2009 ; 31 : 2444-2458

3) Hellmann, A. et al. : Clin. Pharmacokinet. 2011 ; 50 : 781-791

4) 向井陽美他：臨床血液 2011 ; 52 : 1859-1869

5) ボルテゾミブの毒性試験 (ペルケイド注射用：2006 年 10 月 20 日承認、申請資料概要 2.6.2.4)

6) ボルテゾミブの毒性試験 (ペルケイド注射用：2006 年 10 月 20 日承認、申請資料概要 2.6.6.3)

7) ボルテゾミブの染色体異常試験 (ペルケイド注射用：2006 年 10 月 20 日承認、申請資料概要 2.6.6.4)

- 8) Ogawa, Y. et al. : Cancer Sci. 2008 ; 99 : 140-144
- 9) ボルテゾミブの国内第I/II相臨床試験(JPN-101)(ベルケイド注射用:2006年10月20日承認、申請資料概要2.7.6.2.7)
- 10) ボルテゾミブの国内第I/II相臨床試験(JPN-102)(ベルケイド注射用:2011年9月16日承認、審査報告書)
- 11) Moreau, P. et al. : Lancet Oncol. 2011 ; 12 : 431-440
- 12) ボルテゾミブの蛋白結合率の検討(ベルケイド注射用:2006年10月20日承認、申請資料概要2.6.4.4)
- 13) ボルテゾミブの代謝の検討(ベルケイド注射用:2006年10月20日承認、申請資料概要2.6.4.5)
- 14) ボルテゾミブの代謝物の活性の検討(ベルケイド注射用:2006年10月20日承認、申請資料概要2.6.4.2)
- 15) Leal, T. B. et al. : Cancer Chemother Pharmacol. 2011 ; 68 : 1439-1447
- 16) LoRusso, P. M. et al. : Clin. Cancer Res. 2012 ; 18 : 2954-2963
- 17) 社内資料:同等性試験(ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」)
- 18) Richardson, P. G. et al. : N. Engl. J. Med. 2005 ; 352 : 2487-2498
- 19) San Miguel, J. F. et al. : N. Engl. J. Med. 2008 ; 359 : 906-917
- 20) Mateos, M. V. et al. : J. Clin. Oncol. 2010 ; 28 : 2259-2266
- 21) DMPB療法を検討した国際共同第III相試験(MMY3007試験)(ベルケイド注射用:2019年8月22日承認、審査報告書)
- 22) Robak, T. et al. : N. Engl. J. Med. 2015 ; 372 : 944-953
- 23) 製造販売後調査等(ベルケイド注射用:2018年3月29日承認、再審査報告書)
- 24) その他(ベルケイド注射用:2018年3月29日承認、再審査報告書)
- 25) Hidemitsu, T. et al. : Cancer Res. 2001 ; 61 : 3071-3076
- 26) LeBlanc, R. et al. : Cancer Res. 2002 ; 62 : 4996-5000
- 27) ボルテゾミブの薬理作用(ベルケイド注射用:2006年10月20日承認、申請資料概要2.6.2.2)
- 28) Wang, M. et al. : Leukemia. 2008 ; 22 : 179-185

#### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

高田製薬株式会社 文献請求窓口  
〒336-8666 さいたま市南区沼影1丁目11番1号  
電話 0120-989-813  
FAX 048-838-2121

#### 26. 製造販売業者等

##### 26.1 製造販売元

**高田製薬株式会社**  
さいたま市西区宮前町203番地1