

貯 法：室温保存

有効期間：3年

承認番号	30600AMX00233
販売開始	2024年12月

劇薬

処方箋医薬品

(注意－医師等の処方箋により使用すること)

深在性真菌症治療剤

ボリコナゾール顆粒

ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」

Voriconazole Granules 20% “TAKATA”



1. 警告

- 1.1 本剤による治療にあたっては、感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで、重症又は難治性の真菌感染症患者を対象に行うこと。
- 1.2 重篤な肝障害があらわれることがあるので、投与にあたっては、観察を十分に行い、肝機能検査を定期的に行うこと。異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.2、11.1.3 参照]
- 1.3 羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。[8.5、11.2 参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- ※ 2.1 次の薬剤を投与中の患者：リファンピシン、リファブチン、エファビレンツ、リトナビル、ロピナビル・リトナビル、ニルマトレルビル・リトナビル、カルバマゼピン、バルビタール、フェノバルビタール、ピモジド、キニジン、イバブラジン、麦角アルカロイド（エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、エルゴメトリン、メチルエルゴメトリン）、トリアゾラム、チカグレロル、アスナプレビル、ロミタピド、プロナンセリン、スボレキサント、リパロキサパン、アゼルニジピン、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）、アナモレリン、ルラシドン、イサプロナゾニウム、フィネレノン、エプレレノン、ボクロスポリン[10.1 参照]
- 2.2 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある患者[9.5 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	添加剤
1g 中 日局 ボリコナゾール 200.000mg	エリスリトール、ポビドン、酸化チタン、D-マンニトール、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 2910、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、精製ステビア抽出物、スクラロース、タウマチン、黄色三二酸化鉄

3.2 製剤の性状

性状
黄白色の粉末又は粒である。

4. 効能又は効果

- 下記の重症又は難治性真菌感染症
- ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症
 - ・カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症
 - ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症

- ・フサリウム症
- ・スケドスポリウム症

○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

5. 効能又は効果に関連する注意

〈カンジダ感染の治療〉

5.1 他の抗真菌剤が無効あるいは忍容性に問題があると考えられる場合に本剤の使用を考慮すること。

〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

5.2 真菌感染に高リスクの患者（好中球数が $500/\text{mm}^3$ 未満に減少することが予測される患者など）を対象とすること。

6. 用法及び用量

成人（体重 40kg 以上）	通常、ボリコナゾールとして初日は 1 回 300mg（顆粒剤として 1.5g）を 1 日 2 回、2 日目以降は 1 回 150mg（顆粒剤として 0.75g）又は 1 回 200mg（顆粒剤として 1g）を 1 日 2 回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には、増量できるが、初日投与量の上限は 1 回 400mg（顆粒剤として 2g）1 日 2 回、2 日目以降投与量の上限は 1 回 300mg 1 日 2 回までとする。
成人（体重 40kg 未満）	通常、ボリコナゾールとして初日は 1 回 150mg を 1 日 2 回、2 日目以降は 1 回 100mg（顆粒剤として 0.5g）を 1 日 2 回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には 2 日目以降の投与量を 1 回 150mg 1 日 2 回まで増量できる。
小児（2 歳以上 12 歳未満及び 12 歳以上で体重 50kg 未満）	ボリコナゾール注射剤による投与を行った後、通常、ボリコナゾールとして 1 回 9mg/kg（顆粒剤として 45mg/kg）を 1 日 2 回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には 1mg/kg（顆粒剤として 5mg/kg）ずつ増量し、忍容性が不十分の場合には 1mg/kg ずつ減量する（最大投与量として 350mg（顆粒剤として 1.75g）を用いた場合は 50mg（顆粒剤として 0.25g）ずつ減量する）。ただし、1 回 350mg 1 日 2 回を上限とする。
小児（12 歳以上で体重 50kg 以上）	ボリコナゾール注射剤による投与を行った後、通常、ボリコナゾールとして 1 回 200mg を 1 日 2 回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には 1 回 300mg 1 日 2 回まで増量できる。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

7.1 注射剤からボリコナゾールの投与を開始した成人患者において、経口投与可能であると医師が判断した場合は、錠剤、顆粒又はドライシロップに切り替えることができる。

7.2 小児においては、注射剤からボリコナゾールの投与を開始すること。患者の状態に応じて、経口投与可能であると医師が判断した場合に、錠剤、顆粒又はドライシロップに切り替えることができるが、投与開始から 1 週間未満で注

射剤から経口剤に変更した際の有効性及び安全性は検討されていないため慎重に判断すること。なお、ポリコナゾール注射剤では食道カンジダ症の適応はないため、小児の食道カンジダ症に対する本剤の使用は推奨されない。[16.1.2 参照]

7.3 腎機能障害のある患者で注射剤の投与ができない成人患者に対しては、錠剤、顆粒又はドライシロップを使用すること。

7.4 軽度～中等度の肝機能低下（Child Pugh 分類クラス A、B の肝硬変に相当）がある患者では投与初日は通常の初日投与量とし、2 日目以降は通常の 2 日目以降投与量の半量とすること。[9.3.2、15.1.1、16.6.1 参照]

〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

7.5 好中球数が $500/\text{mm}^3$ 以上に回復する、又は免疫抑制剤の投与終了など、適切な時期に投与を終了すること。臨床試験において、180 日を超えた投与の有効性及び安全性は検討されていない。

8. 重要な基本的注意

8.1 重篤な血液障害、重篤な腎障害、高カリウム血症があらわれることがあるので、本剤の投与に際しては定期的に血液検査、腎機能検査、血中電解質検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.6、11.1.9、11.1.16 参照]

8.2 重篤な肝障害があらわれることがあるので、本剤の投与に際しては、観察を十分に行い、必要に応じて肝機能検査を定期的（月に 1～2 回）に行うこと。[1.2、11.1.3 参照]

8.3 心電図 QT 延長、心室頻拍（torsade de pointes を含む）、心室細動、不整脈、完全房室ブロック、心室性二段脈、心室性期外収縮、頻脈等があらわれることがあるので、定期的に心電図検査を行うなど観察を十分に行うこと。[9.1.2、11.1.4 参照]

8.4 本剤の投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。

8.5 視神経炎、視神経乳頭浮腫等の眼障害があらわれ、本剤投与中止後も羞明、霧視、視覚障害等の症状が持続することがあるので、本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。また、本剤を投与する患者にはあらかじめ説明し、必要に応じて眼科専門医を受診するよう指導すること。[1.3、11.2 参照]

8.6 光線過敏性反応があらわれることがあるので、本剤投与中は長袖の衣服、帽子等の着用により日光の照射を避け、日焼け止め効果の高いサンスクリーンの使用により紫外線の照射を避けること。本剤投与中に光線過敏性反応があらわれた場合は、本剤の投与を中止すること。やむを得ず投与を継続する場合は、皮膚科医を定期的に受診するよう指導し、日光角化症などの前癌病変の早期発見に留意すること。[15.1.3 参照]

8.7 投与期間中は血中濃度をモニタリングすることが望ましい。[15.1.1 参照]

8.8 本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及びプロトボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。[10.2 参照]

8.9 本剤は CYP3A に対する強い阻害作用を有するため、患者の併用薬剤に注意し、併用薬に CYP3A により薬物動態学的相互作用を受けやすい薬剤（「10.2 併用注意」の項に記載されていない薬剤も含む。）が含まれている場合は、必要に応じて併用薬の減量を考慮するなど慎重に投与すること。[10.、16.4 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある患者（ただし、本剤に対して過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと）

9.1.2 不整脈を有する患者及び不整脈を発現しやすい状態にある患者
投与前に電解質異常（カリウム、マグネシウム、カルシウム）を補正すること。また、本剤と電解質異常を生じさせる可能性のある血液製剤を同時に投与しないこと。[8.3、11.1.4 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重度の肝機能低下（Child Pugh 分類クラス C の肝硬変に相当）のある患者
定期的に検査を行うなど観察を十分に行うこと。薬物動態、安全性は検討されていない。

9.3.2 軽度～中等度の肝機能低下（Child Pugh 分類クラス A、B の肝硬変に相当）のある患者
[7.4、16.6.1 参照]

9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。ラット 10mg/kg 以上投与において催奇形性（口蓋裂、水腎症／尿管水腫）、ウサギ 100mg/kg 投与において胎児毒性（胎児死亡率増加、骨格変異等）が認められた。[2.3 参照]

9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。母乳中への移行は不明である¹⁾²⁾。

9.7 小児等

9.7.1 低出生体重児、新生児、乳児又は 2 歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。

9.7.2 日光の照射を避けること。皮膚弾力性の低下、色素の沈着や脱失等の光老化が認められた場合は、投与中止後も観察を行うことが望ましい。小児で光線過敏性反応及び皮膚扁平上皮癌が発現した報告がある。

9.7.3 投与に際しては観察を十分に行うこと。小児を対象とした海外臨床試験では、成人と比べ肝酵素上昇の発現頻度が高いことが報告されている。

9.7.4 用量を増減する時には、患者の状態を十分に観察し、効果及び副作用の発現を考慮して、必要最小限の増量又は減量にとどめること。ただし、原則として、投与開始後及び増量後、少なくとも 3 日間は増量しないこと。

9.8 高齢者
用量に留意するなど慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

**10. 相互作用

本剤は、肝代謝酵素 CYP2C19、2C9 及び 3A4 で代謝され、CYP2C19、2C9 及び 3A4 の阻害作用を有する（*in vitro*）。CYP3A に対する阻害作用は強い。[8.9、16.4 参照]

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リファンビシン （リマクタン、ア ブテシン、リファ ジン） [2.1 参照]	リファンビシンと の併用により、本剤 の C_{max} は 93%、 AUC は 96% 減少 した ³⁾ 。	リファンビシンは、 本剤の代謝酵素 （CYP3A4）を誘導 する。
リファブチン （ミコブティン） [2.1 参照]	リファブチンとの 併用により、本剤 の C_{max} は 69%、 AUC は 78% 減少 した ³⁾ 。 本剤との併用によ りリファブチンの C_{max} は 3.0 倍、 AUC は 4.3 倍増加 した ⁴⁾ 。	リファブチンは、本 剤の代謝酵素 （CYP3A4）を誘導 する。 本剤はリファブチ ンの代謝酵素 （CYP3A4）を阻害 する。
エファビレンツ （ストックリン） [2.1 参照]	エファビレンツと の併用により、本剤 の C_{max} は 61%、 AUC は 77% 減少 した ⁵⁾ 。 本剤との併用によ りエファビレンツ の C_{max} は 1.4 倍、 AUC は 1.4 倍増加 した ⁵⁾ 。	エファビレンツは、 本剤の代謝酵素 （CYP2C19 及び CYP2C9）を誘導す る。 本剤はエファビレ ンツの代謝酵素 （CYP3A4）を阻害 する。
リトナビル （ノービア） ロピナビル・リトナ ビル （カレトラ） ニルマトレルビ ル・リトナビル （バキロビッドパ ック） [2.1 参照]	リトナビルとの併 用により、本剤の C_{max} は 66%、AUC は 82% 減少した ⁶⁾ 。	リトナビルは、本剤 の代謝酵素 （CYP2C19 及び CYP2C9）を誘導す る。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カルバマゼピン (テグレトール) 長時間作用型バル ビツール酸誘導体 バルビタール フェノバルビタ ール (フェノバル) [2.1 参照]	これらの薬剤との併用により、本剤の代謝が促進され血中濃度が減少するおそれがある。	これらの薬剤は、本剤の代謝酵素 (CYP3A4) を誘導する。
ピモジド (オーラップ) キニジン [2.1 参照]	本剤との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加し、QT 延長、心室性不整脈 (torsade de pointes を含む) などの心血管系の副作用を引き起こすおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
イバブラジン (コラン) [2.1 参照]	本剤との併用により、イバブラジンの血中濃度が増加し、過度の徐脈があらわれるおそれがある。	本剤はイバブラジンの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
麦角アルカロイド エルゴタミン・無 水カフェイン・イ ソプロピルアン チピリン (クリアミン配合 錠) ジヒドロエルゴ タミン エルゴメトリン メチルエルゴメ トリン (バルタン M) [2.1 参照]	本剤との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加し、麦角中毒を引き起こすおそれがある。	本剤はこれら薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
トリアゾラム (ハルシオン) [2.1 参照]	本剤との併用により、トリアゾラムの血中濃度が増加し、作用の増強や作用時間延長を引き起こすおそれがある。	本剤はトリアゾラムの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
チカグレロル (プリリント) [2.1 参照]	本剤との併用により、チカグレロルの血中濃度が上昇し、血小板凝集抑制作用が増強するおそれがある。	本剤はチカグレロルの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
アスナブレビル (スンベブラ) [2.1 参照]	本剤との併用により、アスナブレビルの血中濃度が上昇し、肝臓に関連した有害事象が発現、又は重症化するおそれがある。	本剤はアスナブレビルの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
ロミタピド (ジャクスタピ ド) [2.1 参照]	本剤との併用により、ロミタピドの血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤はロミタピドの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
プロナンセリン (ロナセン) [2.1 参照]	本剤との併用により、プロナンセリンの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はプロナンセリンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
スポレキサント (ベルソムラ) [2.1 参照]	本剤との併用により、スポレキサントの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はスポレキサントの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リバーロキサバン (イグザレルト) [2.1 参照]	本剤との併用により、リバーロキサバンの血中濃度が上昇し、抗凝固作用が増強することにより、出血の危険性が增大するおそれがある。	本剤はリバーロキサバンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
アゼルニジピン (カルブロック) オルメサルタン メドキシミル・アゼ ルニジピン (レザルタス) [2.1 参照]	本剤との併用により、アゼルニジピンの血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤はアゼルニジピンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
ベネトクラクス (再 発又は難治性の慢 性リンパ性白血病 (小リンパ球性リン パ腫を含む) の用量 漸増期) (ベネクレクス タ) [2.1 参照]	本剤との併用により、ベネトクラクスの血中濃度が増加し、腫瘍崩壊症候群の発現が増強されるおそれがある。	本剤はベネトクラクスの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
アナモレリン (エドルミズ) [2.1 参照]	本剤との併用により、アナモレリンの血中濃度が増加し、副作用の発現が増強されるおそれがある。	本剤はアナモレリンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
ルラシドン (ラソダ) [2.1 参照]	本剤との併用により、ルラシドンの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はルラシドンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
イサブコナゾニ ウム (クレセンバ) [2.1 参照]	本剤との併用により、イサブコナゾールの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はイサブコナゾールの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
フィネレノン (ケレンディア) [2.1 参照]	本剤との併用により、フィネレノンの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はフィネレノンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
** エブレレノン (セララ) [2.1 参照]	本剤との併用により、エブレレノンの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はエブレレノンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
** ボクロスボリン (ルプキネス) [2.1 参照]	本剤との併用により、ボクロスボリンの血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	本剤はボクロスボリンの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ベネトクラクス (再 発又は難治性の慢 性リンパ性白血病 (小リンパ球性リン パ腫を含む) の維持 投与期、急性骨髄性 白血病)	本剤との併用により、ベネトクラクスの血中濃度が増加するおそれがある。ベネトクラクスを減量するとともに、患者の状態を慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。	本剤はベネトクラクスの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
バレメトスタット	本剤との併用により、バレメトスタットの血中濃度が増加するおそれがある。 バレメトスタットを減量するとともに、患者の状態を慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。	本剤はバレメトスタットの代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
抗てんかん薬 フェニトイン	フェニトインとの併用により、本剤の C_{max} は 49%、AUC は 69% 減少した ⁷⁾ 。 本剤との併用により、フェニトインの C_{max} は 1.7 倍、AUC は 1.8 倍増加した ⁷⁾ 。	フェニトインは、本剤の代謝酵素 (CYP3A4) を誘導する。 本剤はフェニトインの代謝酵素 (CYP2C9) を阻害する。
レテルモビル	レテルモビルとの併用により、本剤の C_{max} は 39%、AUC ₀₋₁₂ は 44% 減少した。 レテルモビルとの併用により、作用が減弱するおそれがある。	レテルモビルは本剤の代謝酵素 (CYP2C19 及び CYP2C9) を誘導すると考えられる。
チロシンキナーゼ阻害剤 ボスチニブ、ニロチニブ、イブルチニブ、ラロトレクチニブ、ロルラチニブ	本剤との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加するおそれがあるため、代替薬への変更を考慮すること。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A) を阻害する。
HIV プロテアーゼ阻害薬 ホスアンブレナビル	本剤との併用により、ホスアンブレナビルの活性代謝物であるアンブレナビルの血中濃度が増加するおそれがある。 ホスアンブレナビルとの併用により、本剤の血中濃度が増加するおそれがある。	<i>In vitro</i> 試験結果において、本剤はアンブレナビルの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害した ⁸⁾ 。 <i>In vitro</i> 試験において、アンブレナビルは本剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害した ⁸⁾ 。
非ヌクレオシド逆転写酵素阻害薬 (NNRTI) デラビルジン	これらの薬剤との併用により、本剤の血中濃度が増加するおそれがある。 これらの薬剤との併用により、本剤の血中濃度が減少するおそれがある。 本剤との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加するおそれがある。	<i>In vitro</i> 試験結果において、これらの薬剤は本剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害した ⁹⁾ 。 これらの薬剤は本剤の代謝酵素 (CYP3A4) を誘導するおそれがある。 <i>In vitro</i> 試験結果において、本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害した ⁹⁾ 。
トレチノイン	本剤との併用により、トレチノインの血中濃度が増加するおそれがある。	本剤はトレチノインの代謝酵素 (CYP) を阻害する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
免疫抑制剤 シクロスポリン、タクロリムス、エベロリムス	本剤との併用により、シクロスポリンの C_{max} は 1.1 倍に、AUC は 1.7 倍に増加した ¹⁰⁾ 。 本剤との併用により、タクロリムスの C_{max} は 2.2 倍に、AUC は 3.2 倍に増加した ¹¹⁾ 。 本剤との併用により、エベロリムスの血中濃度が増加するおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
クマリン系抗凝血薬 ワルファリンカリウム [8.8 参照]	本剤との併用により、プロトンポンブ時間が 1.9 倍延長した ¹²⁾ 。また、ワルファリンの作用が増強し、著しい INR 上昇を来した症例が報告されている。	本剤はワルファリンの代謝酵素 (CYP2C9) を阻害する。
プロトンポンプ阻害薬 オメプラゾール	本剤との併用により、オメプラゾールの C_{max} は 2.2 倍、AUC は 3.8 倍増加した ¹³⁾ 。	本剤はオメプラゾールの代謝酵素 (CYP2C19 及び CYP3A4) を阻害する。
ミダゾラム	本剤との併用により、ミダゾラム 0.05mg/kg 単回静脈内投与時のミダゾラムの AUC は 3.7 倍に増加し、ミダゾラム 7.5mg 単回経口投与時 (本邦未承認) のミダゾラムの C_{max} は 3.8 倍に、AUC は 10.3 倍に増加した ¹⁵⁾ 。	本剤はミダゾラムの代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する ¹⁴⁾ 。
HMG-CoA 還元酵素阻害薬	本剤との併用により、HMG-CoA 還元酵素阻害薬の血中濃度が増加するおそれがある。	<i>In vitro</i> 試験において、本剤は HMG-CoA 還元酵素阻害薬の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害した ⁹⁾ 。
ジアゼパム	本剤との併用により、ジアゼパムの AUC は増加し、血中濃度半減期は延長した ¹⁶⁾ 。	本剤はジアゼパムの代謝酵素 (CYP3A4 及び CYP2C19) を阻害する。
ゾルピデム	本剤との併用により、ゾルピデムの C_{max} は 1.2 倍、AUC は 1.5 倍増加した ¹⁷⁾ 。	本剤はゾルピデムの代謝酵素 (CYP3A4 及び CYP2C9) を阻害する。
スルホニル尿素系 血糖降下薬 トルブタミド	本剤との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加するおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP2C9) を阻害する。
ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍薬 ビンクリスチン ビンブラスチン	本剤との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加するおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
メサドン	本剤との併用により、メサドンの C_{max} が 30.7%、AUC が 47.2% 増加した。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。
オキシコドン	本剤との併用により、オキシコドンの C_{max} と AUC が増加した ¹⁸⁾ 。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素 (CYP3A4) を阻害する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェンタニル	本剤との併用により、フェンタニルのAUCが増加した ¹⁹⁾ 。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素(CYP3A4)を阻害する。
イブプロフェン、ジクロフェナク	本剤との併用により、これらの薬剤のC _{max} とAUCが増加した ^{20),21)} 。	本剤はこれらの薬剤の代謝酵素(CYP2C9)を阻害する。
経口避妊薬 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ノルエチステロン・エチニルエストラジオールとの併用により、本剤のC _{max} は14%、AUCは46%増加した。 本剤との併用により、エチニルエストラジオールのC _{max} は36%、AUCは61%増加し、ノルエチステロンのC _{max} は15%、AUCは53%増加した。	これらの薬剤は本剤の代謝酵素(CYP2C19)を阻害する。 本剤はこれらの薬剤の代謝酵素(CYP3A4)を阻害する。
*** リオシグアト	本剤との併用により、リオシグアトの血中濃度が上昇するおそれがある。本剤との併用が必要な場合は、患者の状態に注意し、必要に応じてリオシグアトの減量を考慮すること。	本剤はリオシグアトの代謝酵素(CYP3A)を阻害する。
セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品	セイヨウオトギリソウとの併用により、本剤のAUCは59%減少した ²²⁾ 。本剤投与時はセイヨウオトギリソウ含有食品を摂取しないよう注意すること。	セイヨウオトギリソウは、本剤の代謝酵素(CYP3A4)を誘導する。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）
11.1.2 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）、多形紅斑（頻度不明）

皮疹等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.3 肝障害（5.0%）

重篤な肝障害（肝炎、黄疸、肝不全、肝性昏睡等）があらわれることがあり、死亡例も報告されている。[1.2、8.2 参照]

11.1.4 心電図QT延長（頻度不明）、心室頻拍（1.0%）、心室細動（頻度不明）、不整脈（頻度不明）、完全房室ブロック（頻度不明）
心電図QT延長、心室頻拍（torsade de pointesを含む）、心室細動、不整脈、完全房室ブロック、心室性二段脈、心室性期外収縮、頻脈等があらわれることがある。[8.3、9.1.2 参照]

11.1.5 心不全（3.0%）

心機能に関する異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.6 腎障害（1.0%）

重篤な腎障害（急性腎障害、腎炎、腎尿管壊死等）があらわれることがある。[8.1 参照]

11.1.7 呼吸窮迫症候群（頻度不明）

11.1.8 ギラン・バレー症候群（頻度不明）

11.1.9 血液障害（2.0%）

骨髓抑制、汎血球減少、再生不良性貧血、無顆粒球症、播種性血管内凝固等の重篤な血液障害があらわれることがある。[8.1 参照]

11.1.10 偽膜性大腸炎（頻度不明）

偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、下痢があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.11 痙攣（頻度不明）

痙攣等の神経障害があらわれることがある。

11.1.12 横紋筋融解症（頻度不明）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがある。

11.1.13 間質性肺炎（0.2%^{注1}）

咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施し、本剤の投与を中止するとともに、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.14 低血糖（頻度不明）

重篤な低血糖があらわれることがある。

11.1.15 意識障害（0.1%^{注2}）

意識消失、意識レベルの低下等の意識障害があらわれることがある。

11.1.16 高カリウム血症（1.0%）

[8.1 参照]

注：発現頻度は使用成績調査の結果に基づいている。

11.2 その他の副作用

	5%以上	1～5%未満	1%未満 ^{a)}	頻度不明
血液及びリンパ系障害		白血球減少症、血小板減少症		貧血、リンパ節症
心臓障害		動悸、心嚢液貯留		肺水腫、脚ブロック
耳・迷路障害		聴覚過敏、耳鳴、回転性眩暈		
内分泌障害		ADH 不適合分泌		副腎皮質機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症
眼障害	羞明 ^{b)} 、霧視 ^{b)} 、視覚障害 ^{b)}	眼の異常感、調節障害、色覚異常、複視、眼瞼浮腫、流涙増加、縮瞳、視神経乳頭浮腫、光視症、網膜滲出物、網膜出血、網膜毛細血管瘤、網膜裂孔、網膜血管炎、黄視症		眼瞼炎、視神経炎、強膜炎、角膜混濁、視神経萎縮
胃腸障害	悪心、嘔吐	腹部膨満、口唇のひび割れ、便秘、下痢、消化不良、胃潰瘍、痔核、イレウス、口唇乾燥、口唇粘膜脱落、口唇炎、逆流性食道炎、口内炎		腹痛、胃腸炎、十二指腸炎、歯肉炎、舌炎、腭炎、舌浮腫、腹膜炎

	5%以上	1～5%未満	1%未満 ^{a)}	頻度不明
全身障害及び投与局所様態		無力症、胸痛、胸部圧迫感、異常感、倦怠感、末梢性浮腫、発熱、口渇		悪寒、注射部位反応／炎症、インフルエンザ症候群
肝胆道系障害				胆嚢炎、胆石症、肝腫大
感染症及び寄生虫症				副鼻腔炎
代謝及び栄養障害	食欲不振	高血糖、低カリウム血症	低ナトリウム血症	高コレステロール血症
筋骨格及び結合組織障害		背部痛、四肢痛	関節炎	骨膜炎
神経系障害	頭痛	認知不能症、健忘、浮動性めまい、味覚異常、感覚減退、傾眠、会話障害、振戦、視野欠損	末梢性ニューロパチー	錯感覚、失調、脳浮腫、筋緊張亢進、眼振、失神、注視痙攣、錐体外路症候群
精神障害	不眠症	錯乱状態、幻覚、幻聴、幻視	不安	うつ病、激越
腎及び尿路障害				血尿、アルブミン尿
呼吸器、気管支及び縦隔障害		咯血		
皮膚及び皮下組織障害		皮膚乾燥、湿疹、紅斑、結節性紅斑、発疹、毛髪変色、光線過敏性反応、多汗、そう痒症、丘疹、皮膚落屑	蕁麻疹	顔面浮腫、斑状丘疹状皮疹、脱毛症、剥脱性皮膚炎、紫斑、固定薬疹、乾癬、血管浮腫、皮膚エリテマトーデス、偽性ポルフィリン症
血管障害		潮紅		低血圧、血栓性静脈炎、静脈炎、リンパ管炎

	5%以上	1～5%未満	1%未満 ^{a)}	頻度不明
臨床検査	ALT 増加、AST 増加、ALP 増加、 γ -GTP 増加	血中ビリルビン増加、血中カルシウム増加、血中クレアチニン増加、LDH 増加、血中カリウム減少、血中カリウム増加、血圧低下、血圧上昇、フィブリン D ダイマー増加、血清 FDP 増加、アミラーゼ増加、好酸球増加、血小板数減少	BUN 増加	

発現頻度は重症又は難治性真菌感染症の承認時の国内臨床試験の結果に基づいている。

a：発現頻度は使用成績調査の結果に基づいている。

b：[1.3、8.5 参照]

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 外国人患者において、ポリコナゾールの血漿中濃度と肝機能検査値異常発現率の間に統計的に有意な関連性が認められた。日本人健康成人においては、肝機能障害が発生した症例で、かつ、血漿中濃度が測定されていた症例の血漿中濃度トラフ値はいずれも $4.5 \mu\text{g/mL}$ 以上であった。また、国内臨床試験では有効性及び安全性に応じた投与量の調整に加え、目安としてトラフ血漿中濃度が $4.5 \mu\text{g/mL}$ 以上の場合、必要に応じて投与量を減量する血中濃度モニタリングを実施した。国内外の臨床試験データからは肝機能検査値異常の出現を予測する血漿中濃度の閾値は認められていない。[7.4、8.7 参照]

15.1.2 肺移植あるいは心肺移植患者を対象とした海外の観察研究において、本剤曝露患者では皮膚扁平上皮癌の発生リスクがアゾール系抗真菌薬非曝露患者と比較して有意に高く（ハザード比：2.39、95%信頼区間 1.31-4.37）、この発生リスクは 180 日を越える長期曝露の患者で高い（ハザード比：3.52、95%信頼区間 1.59-7.79）との報告がある²³⁾。

15.1.3 本剤投与後に、皮膚扁平上皮癌及び悪性黒色腫が発生したとの報告がある。また、本剤長期投与中に、光線過敏性反応を発現している患者で皮膚扁平上皮癌及び悪性黒色腫が発生したとの報告がある。[8.6 参照]

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

日本人健康成人男性（各用量 6 例）に、ポリコナゾール 100、200、300 及び 400mg を空腹時に単回経口投与したとき、消失半減期は用量に依存して延長し、AUC 及び C_{max} は用量に対して非線形の増加を示した²⁴⁾。

表 16-1 薬物動態パラメータ

投与量 (mg)	C_{max} ($\mu\text{g/mL}$)	T_{max} (h)	AUC ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	$t_{1/2}$ (h)
100	0.39 (54)	1.2 (33)	1.82 (101)	4.8 (42)
200	0.91 (41)	1.6 (44)	5.12 (70)	6.1 (41)
300	1.81 (8)	1.3 (23)	11.58 (41)	6.8 (31)
400	2.88 (26)	2 (0)	31.01 (62)	11.9 (51)

各用量 6 例、平均値 (%CV)

16.1.2 反復投与

(1) 健康成人

ポリコナゾールは、主に CYP2C19 により代謝される。CYP2C19 には遺伝子多型が存在するため、遺伝子のタイプにより標準的 (EM: Extensive Metabolizer)、やや低い (HEM: Heterozygous Extensive Metabolizer) 及び低い (PM: Poor Metabolizer) 酵素活性を有する被験者に分けて解析した。

日本人健康成人男性に、ポリコナゾール 1 回 200mg を 1 日 2 回 反復経口投与（負荷投与：初日に 1 回 400mg を 1 日 2 回）したところ、EM 及び HEM で 2 日目、PM で 3 日目にはほぼ定常状態に達した^{25),26)}。

表 16-2 投与 7 日目の薬物動態パラメータ

CYP2C19 遺伝子型	例数	C _{max} ($\mu\text{g/mL}$)	AUC _{τ} ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	T _{max} (h)	t _{1/2} (h)
EM	5	2.15 (30)	12.02 (45)	1.4 (39)	6.1 (15)
HEM	5	3.36 (24)	20.01 (37)	1.6 (68)	6.1 (14)
PM	10	6.87 (14)	65.05 (17)	1.6 (47)	9.0 (12)

平均値 (%CV)

(2) 小児患者

日本人小児患者（3～14 歳、18 例）にポリコナゾール 1 回 8mg/kg を 1 日 2 回（負荷投与：初日に 1 回 9mg/kg を 1 日 2 回）7 日間静脈内投与した後、ドライシロップとして 1 回 9mg/kg を 1 日 2 回 7 日間反復経口投与したときの最終投与後の C_{max} 及び AUC _{τ} の幾何平均値（範囲）はそれぞれ 7.22 (2.03～18.3) $\mu\text{g/mL}$ 及び 45.8 (10.0～156) $\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$ であった^{27),28)}。[7.2 参照]

表 16-3 投与 7 日目の薬物動態パラメータ

CYP2C19 遺伝子型	例数	C _{max} ($\mu\text{g/mL}$) ^{a)}	AUC _{τ} ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$) ^{a)}	T _{max} (h) ^{b)}
EM	6	5.49 (2.03～11.0)	31.2 (10.0～80.8)	1.5 (0.95～3.8)
HEM	10	7.66 (4.45～18.3)	49.3 (14.5～156)	1.1 (0.92～2.2)
PM	2	12.3 (11.6, 13.0)	99.1 (84.0, 117)	1.0 (0.95, 1.1)
全例	18	7.22 (2.03～18.3)	45.8 (10.0～156)	1.0 (0.92～3.8)

a：幾何平均値（範囲）又は幾何平均値（個々の値）で示した。

b：中央値（範囲）又は中央値（個々の値）で示した。

12 歳以上 15 歳未満で体重 50kg 以上の小児 1 例には、成人と同様にポリコナゾール 1 回 4mg/kg を 1 日 2 回（負荷投与：初日に 1 回 6mg/kg を 1 日 2 回）7 日間静脈内投与した後、1 回 200mg を 1 日 2 回 7 日間反復経口投与した。

CYP2C19 遺伝子型は、以下の遺伝子型より予測される表現型である。

EM：CYP2C19 *1/*1 又は CYP2C19 *1/*17

HEM：CYP2C19 *1/*2 又は CYP2C19 *1/*3

PM：CYP2C19 *2/*2、CYP2C19 *2/*3 又は CYP2C19 *3/*3

16.1.3 生物学的同等性試験

ポリコナゾール顆粒 20%「タカタ」とブイフェンド錠 200mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1g 又は 1 錠（ポリコナゾールとして 200mg）健康成人男子（CYP2C19 の PM を除く）に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C_{max}）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ～log (1.25) の範囲であり、両剤の生物学的同等性が確認された²⁹⁾。




図 16-1 血漿中濃度

表 16-4 薬物動態パラメータ

	評価パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{τ} ($\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$)	C _{max} ($\mu\text{g/mL}$)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
ポリコナゾール顆粒 20%「タカタ」	6.5189±2.9359	1.4698±0.4915	1.06±0.76	6.38±1.67
ブイフェンド錠 200mg	6.4069±3.0055	1.5280±0.6149	1.24±0.71	6.46±1.72

(Mean ± S.D., n=88)

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 バイオアベイラビリティ

ポピュレーションファーマコキネティクス解析から、日本人及び外国人における健康成人のポリコナゾールのバイオアベイラビリティは 96%と推定された。国内臨床第Ⅲ相試験における患者のバイオアベイラビリティは、ほぼ 100%であった^{30),31)}。

16.2.2 食事の影響

健康成人男性（37 例）において、高脂肪食（約 1000kcal）を取った直後にポリコナゾール 200mg を 1 日 2 回（負荷投与：初日に 1 回 400mg を 1 日 2 回）7 日間反復経口投与したとき、定常状態における C_{max} 及び AUC _{τ} は空腹時投与と比較し、それぞれ 34%及び 24%低下した。T_{max} は食事により 1.4 時間遅延した³²⁾（外国人データ）。

16.3 分布

健康成人のポリコナゾールの定常状態における分布容積は 4.6L/kg と推定された³³⁾（日本人及び外国人データ）。

16.3.1 組織内移行

ポリコナゾール投与後 1～10 時間の血漿中ポリコナゾール濃度に対する髄液中ポリコナゾール濃度の比は 0.22～1.0（中央値 0.46）であった³⁴⁾（外国人データ）。

16.3.2 蛋白結合率

ポリコナゾールのヒト血漿蛋白に対する結合率は、58%であった³⁵⁾。

16.4 代謝

In vitro 試験において、ポリコナゾールは CYP2C19、CYP2C9 及び CYP3A4 によって代謝される。ポリコナゾールの主要代謝物は N-オキシドである^{35),36)}。[8.9、10、参照]

16.5 排泄

ポリコナゾールは、肝代謝により消失し、単回投与後 96 時間までに尿中に未変化体として投与量の 2%未満が排泄される^{35),37)}。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 肝機能の低下した被験者

健康成人にポリコナゾール 1 回 200mg を 1 日 2 回（負荷投与 1 回 400mg を 1 日 2 回）及び中等度の肝機能低下者（Child-Pugh 分類クラス B）にポリコナゾール 1 回 100mg を 1 日 2 回（負荷投与 1 回 200mg を 1 日 2 回）反復経口投与したときの最終投与後の AUC _{τ} は両群で同じであった。このとき血漿中ポリコナゾール濃度は、健康成人では投与 2 日目にはほぼ定常状態に達したが、中等度肝機能低下者では 6 日目まで定常状態に達しなかった³⁸⁾（外国人データ）。[7.4、9.3.2 参照]

16.6.2 腎機能の低下した被験者

(1) 中等度の腎機能低下患者（クレアチニンクリアランス 30～50mL/min）

ポリコナゾール 1 回 3mg/kg を 1 日 2 回（負荷投与 1 回 6mg/kg を 1 日 2 回）7 日間反復静脈内投与したとき、腎機能が正常な被験者と比べ AUC 及び C_{max} に有意差は認められなかった³⁹⁾（外国人データ）。

(2) 血液透析

4 時間の血液透析により血漿中ポリコナゾールの 8%が除去された⁴⁰⁾（外国人データ）。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈重症又は難治性真菌感染症〉

17.1.1 国内第Ⅲ相試験（1501001 試験）

深在性真菌症と診断された患者又は深在性真菌症が強く疑われた患者を対象とし、100 例（経口療法 61 例、静注療法 18 例、スイッチ療法 21 例）にポリコナゾールを投与した。

経口療法の場合は、投与初日に負荷用量として 300mg を 1 日 2 回（体重 40kg 未満の場合は 150mg を 1 日 2 回）、その後は維持用量として 200mg を 1 日 2 回（体重 40kg 未満の場合は 100mg を 1 日 2 回）経口投与した。ただし、投与開始 3 日目の血漿中ポリコナゾール濃度が 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 以上のときは、投与開始 5 日目は 150mg を 1 日 2 回経口投与へ減量した。

静注療法の場合は、重篤な真菌症の場合は、投与初日に負荷用量として 6mg/kg を 1 日 2 回、その後は維持用量として 4mg/kg を 1 日 2 回静脈内投与した。ただし、投与開始 3 日目の血漿中ポリコナゾール濃度が 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 以上のときは、投与開始 5 日目は 3mg/kg を 1 日 2 回静脈内投与に減量した。重篤な真菌症以外の場合は、投与初日に負荷用量として 6mg/kg を 1 日 2 回、その後は維持用量として 3mg/kg を 1 日 2 回静脈内投与した。静注療法を 3 日間行った後、治験責任医師により経口療法が可能と判断された患者においては経口療法への切り替え（スイッチ療法）を可能とし、投与開始 3 日目の血漿中濃度が 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 未満のときは 200mg を 1 日 2 回、2.5 $\mu\text{g/mL}$ 以上のときは 150mg を 1 日 2 回経口投与した。

投与終了時（最大投与期間 12 週間）の総合効果有効率は、以下の通りであった。

表 17-1 投与終了時（最大投与期間 12 週間）の総合効果有効率

菌種	疾患名	有効例/症例
カンジダ属	カンジダ血症	1/2
	食道カンジダ症	5/5
	カンジダ腹膜炎	4/4
	気管支・肺カンジダ症	1/1
	小計	11/12 (91.7%)
アスペルギルス属	侵襲性肺アスペルギルス症	10/16
	慢性壊死性肺アスペルギルス症	3/5
	肺アスペルギローマ	14/18
	小計	27/39 (69.2%)
クリプトコックス属	クリプトコックス髄膜炎	1/1
	肺クリプトコックス症	7/7
	小計	8/8 (100%)
フサリウム属	全身性フサリウム・ソラニ感染症	0/1
	小計	0/1
合計		46/60 (76.7%)

副作用発現率（臨床検査値異常を含む）は、総症例 100 例中 78 例（78.0%）であった。主な副作用は、羞明（25.0%）、視覚障害（24.0%）、肝機能検査値異常（13.0%）、悪心（8.0%）、嘔吐（8.0%）、頭痛（8.0%）、 γ -GTP 増加（7.0%）、肝障害（6.0%）、ALP 増加（5.0%）、霧視（5.0%）、食欲不振（5.0%）等であった⁴¹⁾。

17.1.2 外国第Ⅲ相試験（150-307/602 試験）

免疫不全で急性侵襲性アスペルギルス症の患者を対象とし、ポリコナゾール投与群とアムホテリシン B 投与群の有効性、安全性及び忍容性を比較した。ポリコナゾール投与群では 196 例に初回投与 24 時間は負荷用量として 6mg/kg を 12 時間ごとに、以降は 4mg/kg を 12 時間ごとに静脈内投与した。忍容性に問題が認められた場合は 3mg/kg を 12 時間ごとへの減量を可能とした。全ての被験者に対して、少なくとも 7 日間の静脈内投与を推奨し、注入速度は最大で 3mg/kg/h とした。ポリコナゾールの経口投与の開始用量は 200mg を 1 日 2 回とし、経口投与 3 日目に以降に臨床効果が不十分な場合は、300mg を 1 日 2 回までの増量を可能とした。忍容性に問題が認められた場合は 50mg を 1 日 2 回単位の減量を行い、200mg を 1 日 2 回までの減量を可能とした。体重 40kg 未満の被験者においては、ポリコナゾールの経口投与量を半量とした。

投与終了時（最大投与期間 16 週間）の総合効果有効率は、以下の通りであった。

表 17-2 投与終了時（最大投与期間 16 週間）の総合効果有効率

菌種	疾患名	有効例/症例
アスペルギルス属	侵襲性肺アスペルギルス症	67/119
	小計	67/119 (56.3%)
	合計	67/119 (56.3%)

副作用発現率は 196 例中 128 例（65.3%）であった。主な副作用は、視覚異常（28.1%）、嘔気（7.1%）、発疹（6.6%）であった^{42)~44)}。

17.1.3 外国第Ⅲ相試験（150-309/604 試験）

「原因真菌に対して効能を有する薬剤がない全身性又は侵襲性真菌症」、又は「前治療薬が効能不十分又は忍容性の問題から継続できない全身性又は侵襲性真菌症」と診断された患者を対象に、372 例にポリコナゾールを静脈内投与又は経口投与した。静脈内投与の場合は、投与初日に負荷用量として 6mg/kg を 12 時間ごとに投与し、その後は維持用量として 4mg/kg を 12 時間ごとに少なくとも 3 日間投与した。注入速度は約 3mg/kg/h とした。経口投与の場合は、投与初日に負荷用量として 400mg を 1 日 2 回投与し、その後は維持用量として 200mg を 1 日 2 回投与した。

投与終了時（最大投与期間 16 週間）の総合効果有効率は、以下の通りであった。

表 17-3 投与終了時（最大投与期間 16 週間）の総合効果有効率

菌種	疾患名	有効例/症例
カンジダ属	カンジダ血症	11/21
	食道カンジダ症	23/38
	気管支・肺カンジダ症	1/2
	小計	35/61 (57.4%)
アスペルギルス属	侵襲性肺アスペルギルス症	40/86
	小計	40/86 (46.5%)
クリプトコックス属	クリプトコックス髄膜炎	1/4
	クリプトコックス血症とクリプトコックス髄膜炎の併発	1/2
	小計	2/6 (33.3%)

フサリウム属	フサリウム血症	1/2
	フサリウム副鼻腔炎	1/1
	フサリウム眼内炎	2/4
	肺フサリウム症とフサリウム皮下感染症の併発	0/1
	その他のフサリウム症	1/3
小計		5/11 (45.5%)
スケドスポリウム属	スケドスポリウム脳感染症	0/3
	肺スケドスポリウム症	1/2
	スケドスポリウム皮下感染症	2/2
	スケドスポリウム脳感染症とスケドスポリウム皮下感染症の併発	0/1
	スケドスポリウム血症	0/1
	その他のスケドスポリウム症	0/1
小計		3/10 (30.0%)
合計		85/174 (48.9%)

副作用発現率は 372 例中 215 例（57.8%）であった。主な副作用は、視覚異常（22.8%）、発疹（7.5%）、嘔気（6.5%）であった^{45)~47)}。

17.1.4 外国第Ⅲ相試験（150-608 試験）

非好中球減少のカンジダ血症患者を対象に、ポリコナゾールの有効性及び安全性を、アムホテリシン B の投与後にフルコナゾールを投与した時の有効性及び安全性と比較した。少なくとも最初の 3 日間は静脈内投与を行い、その後は経口投与への切り替えを可能とした。

ポリコナゾール投与群では 272 例に最初の 24 時間は負荷用量として 6mg/kg を、以後は維持用量として 3mg/kg をそれぞれ 12 時間ごとに静脈内投与した。また、維持用量は 4mg/kg を 12 時間ごとまで増量できることとした。最高注入速度は 3mg/kg/h とした。

ポリコナゾール経口投与への切り替え後は、200mg を 1 日 2 回（体重 40kg 未満の場合は 100mg を 1 日 2 回）で開始し、300mg を 1 日 2 回（体重 40kg 未満の場合は 150mg を 1 日 2 回）まで増量可能とした。

投与終了時（最大投与期間はカンジダ血症の消失後 8 週間）の総合効果有効率は以下の通りであった。

表 17-4 投与終了時（最大投与期間はカンジダ血症の消失後 8 週間）の総合効果有効率

菌種	疾患名	有効例/症例
カンジダ属	カンジダ血症	162/248
	小計	162/248 (65.3%)
	合計	162/248 (65.3%)

副作用発現率は 272 例中 97 例（35.7%）であった。主な副作用は ALP 増加（0.7%）、低カリウム血症（0.7%）であった⁴⁸⁾。

〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

17.1.5 海外第Ⅲ相試験（無作為化非盲検並行群間比較試験）（A1501073 試験）

過去 6 ヶ月間に侵襲性真菌感染症の発症がない 12 歳以上の造血幹細胞移植患者を対象として、移植後 180 日の真菌感染予防の成功についてポリコナゾールとイトラコナゾールを比較した。ポリコナゾール又はイトラコナゾールを 2 日間静脈内投与し、その後は経口投与に切り替えた。ポリコナゾール投与群では 234 例に、最初の 24 時間は負荷用量として 6mg/kg を、以後は維持用量として 4mg/kg をそれぞれ 12 時間ごとに静脈内投与した。経口投与に切り替え後は、200mg を 1 日 2 回（体重 40kg 未満の場合は 100mg を 1 日 2 回）投与した。イトラコナゾール投与群では 255 例に、負荷用量として 200mg を 1 日 2 回静脈内投与し、経口投与へ切り替え後は 200mg を 1 日 2 回投与した。移植後 180 日における真菌感染予防の成功率は、以下の通りであった。

表 17-5 移植後 180 日における真菌感染予防の成功率

予防成功率 ^{a)}		群間差 [95% 信頼区間] ^{b)}
ポリコナゾール群	イトラコナゾール群	
48.9% (109/223)	33.5% (80/239)	16.3 [7.6, 25.0] %

a：移植後 180 日間において、以下の項目をすべて満たした被験者の割合

- ・生存していること。
- ・侵襲性真菌感染症の確定診断又は臨床診断がないこと。
- ・移植後 100 日目までに治療薬が 86 日以上投与されていること。

b：移植前処置（骨髄破壊の処置又は骨髄非破壊の処置）並びに、ドナー適合性及び血縁関係（適合かつ血縁と、不適合又は非血縁）を層とした Fleiss 法

ポリコナゾール投与群における副作用発現率は233例中123例(52.8%)であった。主な副作用は、悪心(7.7%)、肝毒性(7.3%)、視力障害(6.0%)及び肝機能検査異常(5.2%)であった⁴⁹⁾。

17.1.6 海外第Ⅲ相試験(非盲検非対照試験)(A1501038試験)

過去12ヵ月間に侵襲性真菌感染症の既往のある18歳以上の造血幹細胞移植患者を対象として、侵襲性真菌感染症の二次予防のために45例にポリコナゾールを投与した。静脈内投与では、負荷投与として12時間ごとに6mg/kgを2回投与し、維持投与として12時間ごとに4mg/kgを投与した。経口投与では、負荷投与として12時間ごとに400mgを2回投与(体重40kg未満の場合は12時間ごとに200mgを2回投与)し、維持投与として12時間ごとに200mg(体重40kg未満の場合は12時間ごとに100mg)を投与した。投与開始12ヵ月後までに侵襲性真菌感染症を発症した被験者の割合は10.7%(3/28例)であった。副作用発現率は45例中26例(57.8%)であった。主な副作用は、肝毒性(8.9%)、幻覚(6.7%)及び頭痛(6.7%)であった⁵⁰⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ポリコナゾールは真菌細胞において、膜成分のエルゴステロール合成を阻害することにより抗真菌作用を示す。また、ポリコナゾールのエルゴステロール合成阻害作用は真菌に選択的で、ラット肝細胞でのステロール合成に対する影響は少ない⁵¹⁾。

18.2 抗真菌作用

18.2.1 ポリコナゾールは、カンジダ属、アスペルギルス属、クリプトコックス属、フサリウム属及びスケドスポリウム属に対し*in vitro*で抗真菌活性を示した⁵²⁾。

18.2.2 ポリコナゾールは、アスペルギルス属に対して殺菌作用を示した⁵²⁾。

18.2.3 免疫正常及び免疫抑制モルモットの実験的カンジダ症、クリプトコックス症、アスペルギルス症及びスケドスポリウム症に対して高い感染防御効果を示した^{53)~62)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ポリコナゾール
(Voriconazole)

化学名：(2*R*,3*S*)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol


分子式：C₁₆H₁₄F₃N₅O

分子量：349.31

性状：白色の結晶性の粉末である。

メタノール、アセトニトリルに溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けやすく、水に極めて溶けにくい。
1mol/L塩酸試液に溶ける。

化学構造式：



略号：VRCZ

旋光度：[α]_D²⁵₃₆₅：-374~-404°(脱水物に換算したもの50mg、メタノール、25mL、100mm)

20. 取扱い上の注意

開封後は、湿気を避けて保存すること。

*22. 包装

0.25g×100包[分包]

0.25g×400包[分包]

1g×20包[分包]

1g×100包[分包]

100g[プラスチック瓶、バラ、乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) 生殖発生毒性試験 ラット胎児の器官形成期投与試験(海外*in vivo*試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.7.13)
- 2) 生殖発生毒性試験 ウサギ胚・胎児発生に関する試験(国内*in vivo*試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.7.13)
- 3) 薬物動態に及ぼすリファンピシン及びrifabutinの影響(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.2)
- 4) 薬物動態に及ぼすrifabutinの影響(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.2)

- 5) 薬物動態に及ぼすエファビレンツの影響(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.2)
- 6) 薬物動態に及ぼすリトナビルの影響(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.2)
- 7) Purkins L, et al. : Br J Clin Pharmacol. 2003; 56 (Suppl. 1) : 37-44
- 8) HIV プロテアーゼ阻害薬におけるチトクローム P450 に関連した薬物相互作用(海外*in vitro*試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.5.15)
- 9) CYP3A4 モジュレーターにおけるチトクローム P450 に関連した薬物相互作用(海外*in vitro*試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.5.15)
- 10) Romero AJ, et al. : Clin Pharmacol Ther. 2002; 71 (4) : 226-234
- 11) タクロリムスの薬物動態に及ぼす影響(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.2)
- 12) Purkins L, et al. : Br J Clin Pharmacol. 2003; 56 (Suppl. 1) : 24-29
- 13) オメプラゾールの薬物動態に及ぼす影響(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.2)
- 14) テストステロン、ミダゾラムにおけるチトクローム P450 に関連した薬物相互作用(海外*in vitro*試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.5.15)
- 15) Saari TI, et al. : Clin Pharmacol Ther. 2006; 79 : 362-370
- 16) Saari TI, et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2007; 63 (10) : 941-949
- 17) Saari TI, et al. : Br J Clin Pharmacol. 2007; 63 (1) : 116-120
- 18) Hagelberg NM, et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2009; 65 (3) : 263-271
- 19) Saari TI, et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2008; 64 (1) : 25-30
- 20) Hynninen VV, et al. : Antimicrob Agents Chemother. 2006; 50 (6) : 1967-1972
- 21) Hynninen VV, et al. : Fundam Clin Pharmacol. 2007; 21 (6) : 651-656
- 22) Rengelshausen J, et al. : Clin Pharmacol Ther. 2005; 78 (1) : 25-33
- 23) Hamandi B, et al. : Am J Transplant. 2018; 18 (1) : 113-124
- 24) 健康成人における単回経口投与時の薬物動態、食事の影響及び安全性(国内第Ⅰ相試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.3. (1)、2.7.6. (2))
- 25) CYP2C19 遺伝子多型解析(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.1.1)
- 26) 健康成人における単回及び負荷投与を伴う反復経口投与時の薬物動態(国内第Ⅰ相試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.3. (1)、2.7.6. (2))
- 27) 小児患者における薬物動態(ブイフェンド錠：2014年9月26日承認、申請資料概要2.7.6.6)
- 28) CYP2C19 遺伝子型および表現型の判定(ブイフェンド錠：2014年9月26日承認、申請資料概要2.7.1.1)
- 29) 社内資料：生物学的同等性試験(ポリコナゾール顆粒20%「タカタ」)
- 30) 健康成人におけるポピュレーションファーマコキネティクス(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.2.3. (4))
- 31) 国内第Ⅲ相試験におけるポピュレーションファーマコキネティクス(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.2.3. (4))
- 32) 薬物動態におよぼす食事の影響(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6. (2))
- 33) 分布容積(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.3. (2))
- 34) Lutsar I, et al. : Clin Infect Dis. 2003; 37 (5) : 728-732
- 35) Roffey SJ, et al. : Drug Metab Dispos. 2003; 31 (6) : 731-741
- 36) Hyland R, et al. : Drug Metab Dispos. 2003; 31 (5) : 540-547
- 37) 代謝、排泄(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.3. (3)、2.5.3. (4))
- 38) 中等度の肝機能障害を有する被験者における反復経口投与時の薬物動態、安全性及び忍容性(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6. (2))
- 39) 腎機能障害者における薬物動態、安全性及び忍容性(海外薬物動態試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6. (2))
- 40) 腎機能低下者における薬物動態(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.3. (7))
- 41) 深在性真菌症に対する有効性及び安全性(国内第Ⅲ相試験)(ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6. (2)、審査報告書)
- 42) Herbrecht R, et al. : N Engl J Med. 2002; 347 (6) : 408-415

- 43) 免疫不全患者の急性侵襲性アスペルギルス症に対する有効性及び安全性（海外第Ⅲ相試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.（2））
- 44) アスペルギルス症における有効性（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.4.（2））
- 45) Perfect JR, et al. : Clin Infect Dis. 2003;36 (9) :1122-1131
- 46) 侵襲性真菌症に対する有効性及び安全性（海外第Ⅲ相試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.（2））
- 47) カンジダ症における有効性（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.5.4.（2））
- 48) 非好中球減少患者のカンジダ血症の治療における比較試験（海外第Ⅲ相試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.7.6.（2））
- 49) 同種造血幹細胞移植（HSCT）患者における侵襲性真菌感染症（IFI）の一次予防試験（海外第Ⅲ相試験）（ブイフェンド錠：2015年8月24日承認、申請資料概要2.7.3.1、2.7.6.2）
- 50) 同種幹細胞移植（SCT）患者における侵襲性真菌感染症（IFI）の二次予防試験（海外第Ⅲ相試験）（ブイフェンド錠：2015年8月24日承認、申請資料概要2.7.6.3）
- 51) 作用機序（海外 *in vitro* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2（1））
- 52) *in vitro* における抗真菌活性（海外 *in vitro* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2（1））
- 53) 免疫正常モルモットにおけるアスペルギルス全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 54) 免疫抑制モルモットにおけるアスペルギルス全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 55) 免疫抑制モルモットにおけるアスペルギルス肺感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 56) 免疫正常モルモットにおける *Candida* 全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 57) 免疫抑制モルモットにおける *Candida* 全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 58) 免疫正常及び免疫抑制モルモットにおける *Candida non-albicans* 全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 59) 免疫正常モルモットにおける *Cryptococcus* 肺感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 60) 免疫正常モルモットにおける *Cryptococcus* 頭蓋内感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 61) 免疫正常モルモットにおける *Scedosporium* 全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））
- 62) 免疫抑制モルモットにおける *Scedosporium* 全身感染に対する感染防御効果（海外 *in vivo* 試験）（ブイフェンド錠：2005年4月11日承認、申請資料概要2.6.2.2.（2））

24. 文献請求先及び問い合わせ先

高田製薬株式会社 文献請求窓口
〒336-8666 さいたま市南区沼影1丁目11番1号
電話 0120-989-813
FAX 048-838-2121

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

高田製薬株式会社
さいたま市西区宮前町203番地1