* 2025年11月改訂(第3版) 2024年4月改訂(第2版)

貯法:室温保存 有効期間:3年

向精神薬(第三種向精神薬) 習慣性医薬品:注意-習慣性あり

処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

入眠剤

日本薬局方 ゾルピデム酒石酸塩錠

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「TCK」 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「TCK」

ZOLPIDEM TARTRATE Tablets [TCK]

871129
錠10mg

日本標準商品分類番号

	錠5mg	錠10mg
承認番号	22400AMX00524000	22400AMX00525000
販売開始	2012年6月	2012年6月

1. 警告

本剤の服用後に、もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)があらわれることがある。また、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるので注意すること。[7.1,7.2,11.1.3 参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 重篤な肝障害のある患者 [9.3.1,16.6.2 参照]
- 2.3 重症筋無力症の患者 [筋弛緩作用により症状を悪化させるおそれがある。]
- 2.4 急性閉塞隅角緑内障の患者 [眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがある。]
- 2.5 本剤により睡眠随伴症状 (夢遊症状等) として異常行動 を発現したことがある患者 [重篤な自傷・他傷行為、事故 等に至る睡眠随伴症状を発現するおそれがある。]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	有効成分(1錠中)	添加剤	
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「TCK」	ゾルピデム酒石酸塩 (日局) 5mg	乳糖水和物、結晶セルロース、ヒプロメロース、デンプングリコース、デンプングリコール酸ナトリウム、含水二酸化ケイ素、ステア	
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「TCK」	ゾルピデム酒石酸塩 (日局) 10mg	リン酸マグネシウム、マクロゴール6000、酸 化チタン、黄色三二酸 化鉄、三二酸化鉄、カ ルナウバロウ	

3.2 製剤の性状

販売名	外形			色調	識別
別が石	直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)	剤形	コード
ゾルピデム 酒石酸塩錠 5mg「TCK」	6.6	2.7	93	淡いだいだい色 フィルム コーティング錠 (割線入り)	TU 103
ゾルピデム 酒石酸塩錠 10mg 「TCK」	TU 105 8.6	3.3	185	淡いだいだい色 フィルム コーティング錠 (割線入り)	TU 105

4. 効能又は効果

不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く)

5. 効能又は効果に関連する注意

本剤の投与は、不眠症の原疾患を確定してから行うこと。なお、

統合失調症あるいは躁うつ病に伴う不眠症には本剤の有効性は 期待できない。

6. 用法及び用量

通常、成人にはゾルピデム酒石酸塩として $1 回 5 \sim 10 mg$ を 就寝直前に経口投与する。なお、高齢者には 1 回 5 mg から投与を開始する。年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1 日 10 mg を超えないこととする。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 本剤に対する反応には個人差があり、また、もうろう状態、 睡眠随伴症状(夢遊症状等)は用量依存的にあらわれるので、 本剤を投与する場合には少量(1回5mg)から投与を開始する こと。やむを得ず増量する場合は観察を十分に行いながら慎重 に投与すること。ただし、10mgを超えないこととし、症状の 改善に伴って減量に努めること。[1.,7.2,11.1.3 参照]
- 7.2 本剤を投与する場合、就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、患者が起床して活動を開始するまでに十分な睡眠時間がとれなかった場合、又は睡眠途中において一時的に起床して仕事等を行った場合などにおいて健忘があらわれたとの報告があるので、薬効が消失する前に活動を開始する可能性があるときは服用させないこと。[1.,7.1,11.1.3 参照]
- 7.3 高齢者に投与する場合、少量(1回5mg)から投与を開始し、 1回10mgを超えないこと。[9.8,16.6.3参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 連用により薬物依存を生じることがあるので、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。[11.1.1 参照]
- 8.2 本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射 運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転な ど危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期などで呼吸機能が高度に低下している患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しない。呼吸 抑制により炭酸ガスナルコーシスを起こしやすい。[11.1.4 参照]

9.1.2 衰弱患者

薬物の作用が強くあらわれ、副作用が発現しやすい。

9.1.3 心障害のある患者

血圧低下があらわれるおそれがあり、症状の悪化につながるお それがある。

9.1.4 脳に器質的障害のある患者

作用が強くあらわれるおそれがある。

9.2 腎機能障害患者

排泄が遅延し、作用が強くあらわれるおそれがある。[16.6.1 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝障害のある患者

投与しないこと。代謝機能の低下により血中濃度が上昇し、作用が強くあらわれるおそれがある。[2.2,16.6.2 参照]

9.3.2 肝障害のある患者(重篤な肝障害のある患者を除く)

代謝機能の低下により血中濃度が上昇し、作用が強くあらわれるおそれがある。[16.6.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本薬はヒトで胎盤を通過することが報告されており、妊娠後期に本剤を投与された患者より出生した児に呼吸抑制、痙攣、振戦、易刺激性、哺乳困難等の離脱症状があらわれることがある。なお、これらの症状は、新生児仮死として報告される場合もある。

9.6 授乳婦

授乳を避けさせること。母乳中へ移行することが報告されており、新生児に嗜眠を起こすおそれがある。[16.3.1 参照]

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は 実施していない。

9.8 高齢者

運動失調が起こりやすい。また、副作用が発現しやすい。[7.3, 16.6.3 参照]

10. 相互作用

本剤は、主として肝薬物代謝酵素 CYP3A4 及び一部 CYP2C9、CYP1A2 で代謝される。[16.4 参照]

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
麻酔剤	呼吸抑制があらわれる ことがあるので、慎重 に投与すること。	1,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7
中枢神経抑制剤 フェノチアジン 誘導体 バルビツール酸 誘導体 等	相互に中枢神経抑制作用が増強することがあるので、慎重に投与すること。	は中枢神経抑制作用を
アルコール(飲酒)	精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるので、できるだけ飲酒を控えさせること。	等により中枢神経抑制
リファンピシン [16.7.1 参照]	本剤の血中濃度が低下 し、作用が減弱するお それがある。	

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行 うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 依存性、離脱症状

連用により薬物依存(頻度不明)を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、反跳性不眠、いらいら感等の離脱症状(0.1 ~ 5% 未満)があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。[8.1 参照]

11.1.2 精神症状、意識障害

せん妄 (頻度不明)、錯乱 (0.1 ~ 5% 未満)、幻覚、興奮、脱抑

制(各0.1%未満)、意識レベルの低下(頻度不明)等の精神症状及び意識障害があらわれることがある。

11.1.3 一過性前向性健忘 (0.1 ~ 5% 未満)、もうろう状態 (頻度不明)、睡眠随伴症状 (夢遊症状等) (頻度不明)

服薬後は直ぐ就寝させ、睡眠中に起こさないように注意すること。なお、十分に覚醒しないまま、車の運転、食事等を行い、その出来事を記憶していないとの報告がある。また、死亡を含む重篤な自傷・他傷行為、事故等の報告もある。[1.,7.1,7.2 参照]

11.1.4 呼吸抑制 (頻度不明)

呼吸機能が高度に低下している患者に投与した場合、炭酸ガスナルコーシスを起こすことがあるので、このような場合には気道を確保し、換気をはかるなど適切な処置を行うこと。[9.1.1 参照]

11.1.5 肝機能障害、黄疸

AST、ALT、 γ - GTP、Al - Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄 疸 (いずれも頻度不明) があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1 ~ 5% 未満	0.1% 未満	頻度不明
精神神経系	ふらつき、眠気、 頭痛、残眠感、頭 重感、めまい、不 安、悪夢、気分高 揚	錯視	しびれ感、振戦
血液	白血球増多、白血 球減少	_	_
肝臓	ALT上昇、γ-GTP 上昇、AST 上昇、 LDH 上昇	_	_
腎臓	蛋白尿	_	_
消化器	悪心、嘔吐、食欲 不振、腹痛	下痢	口の錯感覚、食欲 亢進
循環器	動悸	_	_
過敏症	発疹、そう痒感	_	_
骨格筋	倦怠感、疲労、下 肢脱力感	_	筋痙攣
眼	複視	_	視力障害、霧視
その他	口渇、不快感	_	味覚異常、転倒 注1)

注1) 転倒により高齢者が骨折する例が報告されている。

13. 過量投与

13.1 症状

本剤単独の過量投与では、傾眠から昏睡までの意識障害が報告されているが、さらに中枢神経抑制症状、血圧低下、呼吸抑制、無呼吸等の重度な症状があらわれるおそれがある。

13.2 処置

本剤の過量投与が明白又は疑われた場合の処置としてフルマゼニル (ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤)を投与する場合には、使用前にフルマゼニルの使用上の注意を必ず読むこと。なお、本剤は血液透析では除去されない。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

錠剤分割後は遮光保存すること。

14.2 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニル (ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤) を投与された患者で、新たに本剤を投与する場合、本剤の鎮静、抗痙攣作用が変化、遅延するおそれがある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 健康成人

健康成人 6 例にゾルピデム酒石酸塩錠 $2.5 \sim 10 mg^{\pm 1}$ を空腹時に単回経口投与したところ、ゾルピデムは速やかに吸収され、投与後 $0.7 \sim 0.9$ 時間に最高血漿中濃度(Cmax)に達した後、消失半減期($t_{1/2}$) $1.78 \sim 2.30$ 時間で速やかに減少した。Cmax 及び血漿中濃度-時間曲線下面積(AUC)は投与量に比例して増加した 11 。また、健康成人 6 例にゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg を 1 日 1 回 7 日間朝食後に経口投与したところ、血漿中濃度推移は 1 日目と 7 日目でほぼ同じであった 11 。

単回経口投与時の薬物速度論的パラメータ

投与量 (mg)	Tmax (h)	Cmax (ng/mL)	t _{1/2} (h)	AUC ₀ -∞ (ng · h/mL)
2.5	0.7 ± 0.3	32.6±9.6	1.78 ± 0.48	96±58
5.0	0.8 ± 0.3	76.2±29.7	2.06 ± 1.18	259±218
7.5	0.9 ± 0.6	102 ± 42	1.86 ± 0.47	330±163
10.0	0.8 ± 0.3	120±73	2.30 ± 1.48	491±474

(Mean \pm S.D.)


16.1.2 生物学的同等性試験

〈ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「TCK」〉

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「TCK」とマイスリー錠 5mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠(ゾルピデム酒石酸塩 5mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された 2)。

	判定パラメータ		参考パラ	ラメータ
	AUC ₀ →10hr (ng•hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ゾルピデム酒石酸 塩錠 5mg「TCK」	231.73±129.12	67.60±23.65	0.79±0.22	2.18±1.07
マイスリー錠 5mg	234.62±121.40	71.93±29.08	0.83±0.35	2.08±0.84

 $(Mean \pm S.D., n=20)$




〈ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「TCK」〉

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「TCK」とマイスリー錠 10mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠(ゾルピデム酒石酸塩 10mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80)$ ~ $\log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された 3 。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀ →10hr (ng•hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ゾルピデム酒石酸 塩錠 10mg「TCK」	510.23±196.92	165.38±56.11	0.78±0.32	2.23±0.85
マイスリー錠 10mg	559.33±240.25	160.96±52.56	0.81 ± 0.22	2.43±0.91

 $(Mean \pm S.D., n=20)$



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 バイオアベイラビリティ

健康成人にゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg を経口投与又はゾルピデム酒石酸塩 8 mg を静脈内投与 $^{\text{(i)}}$ して求めたバイオアベイラビリティは 66.6% であった $^{4).5)}$ (外国人データ)。

16.2.2 食事の影響

健康成人 6 例にゾルピデム酒石酸塩錠 10mg を朝食後経口投与すると、空腹時投与に比べて最高血漿中濃度到達時間(Tmax)は 0.8 ± 0.3 時間($Mean\pm S.D.$)から 1.8 ± 1.2 時間($Mean\pm S.D.$)に遅延する傾向にあったが、Cmax、AUC ともに大きな差はなかった 11 。

16.3 分布

16.3.1 乳汁中への移行

授乳中の女性 5 例にゾルピデム酒石酸塩錠 20mg^{it} を経口投与したとき、未変化体の乳汁中排泄率は投与量の $0.004 \sim 0.019\%$ であった。投与後 3 時間目の乳汁中/血漿中濃度比は $0.11 \sim 0.18$ であった⁶⁾ (外国人データ)。[9.6 参照]

16.3.2 蛋白結合率

健康成人にゾルピデム酒石酸塩 10mg を経口投与した後の血漿蛋白結合率は $96.0 \sim 96.3\%$ であり、血漿中濃度 50 及び 500ng/mL での $in\ vitro$ 蛋白結合率との間に差は認められなかった 70。

16.4 代謝

ゾルピデム酒石酸塩の大部分は肝で代謝され、その主なものは 芳香環のメチル基が酸化されてカルボン酸となった薬理活性を 有しない代謝物であった 8 。また、ゾルピデム酒石酸塩は肝薬 物代謝酵素 CYP3A4 のほか CYP2C9、CYP1A2 など複数の分子種により代謝される 9,10 。[10.参照]

16.5 排泄

健康成人 6 例にゾルピデム酒石酸塩錠 $2.5 \sim 10 \text{mg}^{(\pm)}$ を空腹時に単回経口投与したところ、投与後 24 時間までの尿中に排泄された未変化体は、いずれの投与量においても投与量の 0.5% 以下とごくわずかであった 1)。また、健康成人 6 例にゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg を 1 日 1 回 7 日間朝食後に経口投与したところ、投与初日、4 及び 7 日目投与後 24 時間の尿中未変化体排泄率は単回投与時と同様、投与量の 0.5% 以下であった 1)。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

慢性腎障害を有する患者 16 例($Ccr: 0 \sim 47$ mL/min)にゾルピデム酒石酸塩 10mg を 20 分間静脈内持続注入 $^{(\pm)}$ したところ、健康成人に比べ β 相での分布容量(Vd_β)のみ有意に大きかった $^{(11)}$ (外国人データ)。

また、透析を受けている慢性腎障害患者9例にゾルピデム酒石 酸塩錠10mgを1日1回13~18日間経口投与したときの血 漿中濃度は単回投与時とほぼ同じであり、血中での蓄積は認められなかった¹¹¹ (外国人データ)。[9.2 参照]

16.6.2 肝機能障害患者

肝硬変患者 8 例にゾルピデム酒石酸塩錠 20mg ^{注)} を経口投与したところ、同年齢の健康成人に比べて Cmax は 2.0 倍、AUC は 5.3 倍大きかった ¹²⁾ (外国人データ)。[2.2,9.3.1,9.3.2 参照] 肝硬変患者における薬物速度論的パラメータ

対象	Tmax (h)	Cmax (ng/mL)	t _{1/2} (h)	AUC ₀ -∞ (ng · h/mL)
肝硬変患者	0.69 ± 0.54	499±215	9.91±7.57*	4203±3773
健康成人	0.72 ± 0.42	250±57	2.15±0.25	788±279

(Mean \pm S.D., $*\mathcal{O}\mathcal{A}$ n = 7)

16.6.3 高齢者

高齢患者 7 例(67 ~ 80 歳、平均 75 歳)にゾルピデム酒石酸塩錠 5mg を就寝直前に経口投与したところ、高齢患者の方が健康成人に比べて Cmax で 2.1 倍、Tmax で 1.8 倍、AUC で 5.1 倍、 $t_{1/2}$ で 2.2 倍大きかった 13 。 [7.3, 9.8 参照]

16.7 薬物相互作用

16.7.1 リファンピシン

健康成人 8 例にリファンピシン 600mg 又はプラセボを 1 日 1 回 5 日間経口投与し、翌日、ゾルピデム酒石酸塩 20mg $^{(1)}$ を経口投与したとき、リファンピシン併用時におけるゾルピデムの 20mg 20mg

注)本剤の承認された用法及び用量は「通常、成人にはゾルピデム酒石酸塩として $1 \odot 5 \sim 10$ mg を就寝直前に経口投与する。なお、高齢者には $1 \odot 5$ mg から投与を開始する。年齢、症状、疾患により適宜増減するが、 $1 \odot 10$ mg を超えないこととする。」である。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内後期第Ⅱ相用量検索二重盲検群間比較試験

不眠を主訴とし、常時睡眠薬の投与を必要とする慢性不眠症患者を対象に、ゾルピデム酒石酸塩錠(5mg、10mg、15mg $^{(\pm)}$)又はプラセボを $^{(\pm)}$ 1日1回就寝直前に $^{(\pm)}$ 14日間投与した。主治医の評価による睡眠症状全般改善度の「中等度改善」以上の改善率はプラセボ群で $^{(\pm)}$ 27.8%($^{(\pm)}$ 10例/36例)、 $^{(\pm)}$ 55.3%($^{(\pm)}$ 21例/38例)であった。改善率の検定で $^{(\pm)}$ 10mg 群に $^{(\pm)}$ 10mg、 $^{(\pm)}$ 15mg 群に $^{(\pm)}$ 15mg $^{(\pm)$

副作用発現率は、プラセボ群で 14.6% (7 例 /48 例)、内訳は ふらつき、頭痛、頭重感、悪夢、倦怠感各 2 件など、5mg 群で 12.2% (6 例 /49 例)、内訳は眠気 3 件、倦怠感、倦怠感の悪化、疲労感の悪化各 2 件など、10mg 群で 14.9% (7 例 /47 例)、内訳は頭痛、倦怠感各 3 件、ふらつき、頭重感、疲労感各 2 件など、15mg 群 $^{(\pm)}$ で 16.0% (8 例 /50 例)、内訳は眠気 2 件などであった $^{(5)}$ 。

17.1.2 国内第Ⅲ相二重盲検群間比較試験(Nitrazepam 対照)

常時睡眠薬の投与を必要とする不眠症患者を対象に、ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 又は Nitrazepam 5mg を 1 日 1 回就寝直前に 14 日間投与した。睡眠症状全般改善度の「中等度改善」以上の改善率はゾルピデム酒石酸塩群で 65.6%(42 例 /64 例)、Nitrazepam 群で 52.2%(35 例 /67 例)であり、U 検定でゾルピデム酒石酸塩群が有意に優った(p<0.05)¹⁶⁾。

副作用発現率は、ゾルピデム酒石酸塩群で16.5%(13 例 /79 例)、 内訳はふらつき、倦怠感各5件、眠気、残眠感各4件、めまい3件、 記憶障害、頭痛各2件などであり、Nitrazepam群で18.8%(15 例 /80 例)、内訳はふらつき5件、眠気3件、めまい、倦怠感、 頭痛、悪心各2件などで両群の間に差は認められなかった16。

17.1.3 国内第Ⅲ相二重盲検群間比較試験(Triazolam 対照)

常時睡眠薬の投与を必要とする不眠症患者を対象に、ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 又は Triazolam 0.25 mg を 1 日 1 回就寝直前に 14 日間投与した。睡眠症状全般改善度の「中等度改善」以上の改善率はゾルピデム酒石酸塩群で 63.5% (40 例 /63 例)、Triazolam 群で 75.0% (51 例 /68 例) であり、両群間に有意な差は認められなかった 17 。また、改善率の差の 90% 信頼区間は -26.2% ~ 3.2% であり、 $\Delta=10\%$ とした時の同等性推論では、ゾルピデム酒石酸塩群の Triazolam 群に対する同等性 (非劣性) は証明されなかった。

副作用発現率は、ゾルピデム酒石酸塩群で 9.7% (7 例 /72 例)、内訳は頭痛 2 件など、Triazolam 群で 4.1% (3 例 /74 例) で、両群間に有意差は認められなかった 17 。

17.1.4 国内第Ⅲ相二重盲検群間比較試験(同等性検証試験) (Zopiclone 対照)

週3回以上の不眠を有する慢性不眠症患者(ICD-10を参考として診断)を対象に、ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 又はZopiclone 7.5mg を 1 日 1 回就寝直前に 14 日間投与した。睡眠症状全般改善度の「中等度改善」以上の改善率はゾルピデム酒石酸塩群で 67.9%(142 例 /209 例)、Zopiclone 群で 61.6%(135 例 /219 例)であった $^{18)}$ 。また、改善率の差の 90% 信頼区間は $-1.7\%\sim14.3\%$ であり、臨床的に許容できると考えられる改善率の差 $\Delta=10\%$ とした時の同等性推論では、ゾルピデム酒石酸塩群の Zopiclone 群に対する同等性(非劣性)が検証された。

副作用発現率は、ゾルピデム酒石酸塩群で 31.3% (66 例 /211 例)、内訳は頭痛 15 件、眠気 13 件、ふらつき 9 件、悪心、口 渇各 8 件、苦味 6 件、残眠感 5 件など、Zopiclone 群で 45.3% (102 例 /225 例)、内訳は苦味 69 件、残眠感 12 件、眠気、頭痛各 9 件、ふらつき 8 件、悪心 6 件、頭重感、倦怠感各 5 件などで、Zopiclone 群が有意に高かった(p<0.01) 18)。

注)本剤の承認された用法及び用量は「通常、成人には本剤 1 回 $5 \sim 10$ mg を就寝直前に経口投与する。なお、高齢者には 1 回 5mg から投与を開始する。年齢、症状、疾患により適 宜増減するが、1 日 10mg を超えないこととする。」である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ゾルピデム酒石酸塩は、 ω ₁ (BZD₁) 受容体に対して選択的な親和性を示し、GABA $_{\rm A}$ 系の抑制機構を増強するものと考えられる 19 , 20 。

18.2 夜間睡眠に及ぼす影響

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg を健康成人に就寝前に投与すると、睡眠潜時を短縮し $^{21)}$ 、睡眠後は REM 睡眠に影響することなく徐波睡眠を増加させ、翌朝への持ち越し効果、反跳現象はみられなかった $^{21)\sim 25}$ 。

18.3 記憶機能に対する作用

健康成人にゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg を投与した 1 時間後には明らかな催眠作用がみられたが、翌朝の記憶検査では影響はみられなかった 260^{-29} 。

18.4 動物の脳波に対する作用

ゾルピデム酒石酸塩は、サル、ネコ及びラットにおいて、より選択的に徐波睡眠を増加させた $^{30)-32}$ 。ネコ及びラットの覚醒ー睡眠パターンに対する影響は少なかった $^{33).34}$ 。ラットにおいて、作用発現は速やかで、持続は短かった 32 。

18.5 その他の中枢作用

ゾルピデム酒石酸塩は、マウスにおいて、鎮静作用の他に、抗 痙攣作用、筋弛緩作用等を示すが、鎮静作用が最も少量であら われた 35)。また、ラットにおいて、抗不安作用を示した 36)。

18.6 反復投与の影響

ゾルピデム酒石酸塩は、マウスにおいて、反復投与しても耐性 の形成は弱かった³⁷⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称: ゾルピデム酒石酸塩 (Zolpidem Tartrate)

化 学 名:N ,N ,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)imidazo [1,2- α]pyridine-3-acetamide hemi-(2R ,3R)-tartrate

分子式:(C19H21N3O)2·C4H6O6

分子量:764.87

構造式:

性 状:白色の結晶性の粉末である。

酢酸 (100) に溶けやすく、N,N-ジメチルホルムアミド又はメタノールにやや溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール (99.5) 又は無水酢酸に溶けにくい。0.1 mol/L 塩酸試液に溶ける。

光によって徐々に黄色となる。

* 22. 包装

〈ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「TCK」〉

100錠 (10錠(PTP)×10)

140 錠 (14 錠 (PTP) × 10)

500錠(10錠(PTP)×50)

500錠(バラ、ポリエチレン容器)

〈ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「TCK」〉

100錠(10錠(PTP)×10)

500錠(10錠(PTP)×50)

500錠(バラ、ポリエチレン容器)

23. 主要文献

- 1) 工藤義雄 他: 臨床医薬 1990; 6 (4): 651-675
- 2) 社内資料:生物学的同等性試験(錠5mg)
- 3) 社内資料:生物学的同等性試験(錠10mg)
- 4) 海外健康成人・バイオアベイラビリティ試験(マイスリー錠: 2000年9月22日承認申請資料概要へ.3.3)(2))
- 5) 総括 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料 概要へ)
- 6) Pons, G. et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 1989; 37 (3): 245-248
- 7) 石橋光治 他:薬物動態 1993;8(4):445-455
- 8) 海外健康成人・薬物動態 (マイスリー錠:2000年9月 22日承認 申請資料概要へ.2.3)(1)、(2))
- 9) Pichard, L. et al.:Drug Metab. Dispos. 1995;23 (11): 1253-1262
- 10) Moltke, L. L. et al.: Br. J. Clin. Pharmacol. 1999; 48 (1): 89-97
- 11) 海外慢性腎障害患者・薬物動態 (マイスリー錠: 2000 年 9月22日承認 申請資料概要へ.3.2) (3))
- 12) 海外肝硬変患者・薬物動態 (マイスリー錠:2000年9月 22日承認 申請資料概要へ.3.2)(2))
- 13) 高齢不眠症患者・薬物動態 (マイスリー錠:2000年9月 22日承認 申請資料概要へ.3.2)(1))
- 14) Villikka, K. et al.:Clin. Pharmacol. Ther. 1997;62 (6): 629-634
- 15) 工藤義雄 他:臨床医薬 1993;9 (Suppl.2):57-79
- 16) 工藤義雄 他:臨床医薬 1993;9(1):79-105
- 17) 筒井末春 他:臨床医薬 1993;9(2):387-413

- 18) 筒井末春 他: 臨床医薬 2000; 16 (5): 649-669
- 19) ラット大脳皮質・薬理作用 (マイスリー錠:2000年9月 22日承認 申請資料概要ホ.1.3)(1)、(2))
- 20) ラット小脳他・薬理作用 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認 申請資料概要ホ.1.3) (1))
- 21) 延原健二 他:神経精神薬理 1992;14 (2):137-144
- 22) 菅野 道他:神経精神薬理1993;15(9):589-602
- 23) 中込和幸 他:神経精神薬理 1993;15 (9):603-615
- 24) Nakajima, T. et al.: Psychiatry Clin. Neurosci. 2000; 54 (1): 37-40
- 25) Nakajima, T. et al.: Life Sci. 2000; 67 (1): 81-90
- 26) 鈴木牧彦 他:神経精神薬理 1993;15 (6):375-389
- 27) 内海光朝 他:神経精神薬理 1994;16(1):45-56
- 28) Isawa, S. et al.:日本神経精神薬理学雑誌 2000;20 (2): 61-69
- 29) Uchiumi, M. et al.: 日本神経精神薬理学雑誌 2000; 20 (3): 123-130
- 30) 佐藤 壽他: ブレインサイエンス 1994;5(3):309-320
- 31) ネコ・薬理作用 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認申請資料概要ホ.1.1) (1) ii)
- 32) ラット・薬理作用 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認 申請資料概要ホ.1.1) (1) iii)
- 33) ネコ・薬理作用 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認 申請資料概要ホ.1.1) (2) i)
- 34) ラット・薬理作用 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認 申請資料概要ホ.1.1) (2) ii)
- 35) マウス・薬理作用 (マイスリー錠:2000年9月22日承認 申請資料概要ホ.1.2)(1))
- 36) ラット・薬理作用 (マイスリー錠: 2000 年 9 月 22 日承認 申請資料概要ホ.1.2) (2))
- 37) マウス・薬理作用 (マイスリー錠:2000年9月22日承認 申請資料概要ホ.1.2)(5))

24. 文献請求先及び問い合わせ先

辰巳化学株式会社 薬事・学術課

〒 921-8164 金沢市久安 3 丁目 406 番地

TEL 076-247-2132

FAX 076-247-5740

25. 保険給付上の注意

本剤は厚生労働省告示第 97 号(平成 20 年 3 月 19 日付、平成 18 年厚生労働省告示第 107 号 一部改正)に基づき、1 回 30 日 分を超える投薬は認められていない。

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



辰巳化学株式会社

金沢市久安3丁目406番地