\* 2025年10月改訂(第3版) 2024年11月改訂

貯法:室温保存 有効期間:3年

処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 876149

承認番号 23000AMX00545000 販売開始 2006 年 7 月

# マクロライド系抗生物質製剤 日本薬局方 クラリスロマイシン錠

## クラリスロマイシン錠小児用50mg「TCK」

CLARITHROMYCIN Tablets for Pediatric [TCK]

#### 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、スボレキサント、ダリドレキサント塩酸塩、ボルノレキサント水和物、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル [アドシルカ]、チカグレロル、イブルチニブ、イバブラジン塩酸塩、ベネトクラクス (再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む)、再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫の用量漸増期)、ルラシドン塩酸塩、アナモレリン塩酸塩、フィネレノン、イサブコナゾニウム硫酸塩、ボクロスポリン、マバカムテンを投与中の患者 [10.1 参照]
  - 2.3 肝臓又は腎臓に障害のある患者でコルヒチンを投与中の 患者 [9.2.1,9.3.1,10.2 参照]

#### 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	有効成分(1錠中)	添加剤
クラリスロマイシン錠 小児用 50mg「TCK」	クラリスロマイシン (日局) 50mg(力価)	クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリソルベート80、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウ

## 3.2 製剤の性状

販売名	5	小 用	ź,	色調	識別
別が石	直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)	剤形	コード
クラリスロマイ シン錠小児用 50mg 「TCK」	Tu 605	3.7	84	白色 フィルム コート錠	Tu 605

## 4. 効能又は効果

## ○一般感染症

#### 〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、百日咳菌、カンピロバクター属、クラミジア属、マイコプラズマ属

#### 〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、 慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、 扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二 次感染、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、百日咳 ○後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症

#### 〈適応菌種〉

本剤に感性のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC)

#### 〈適応症〉

後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症

#### 5. 効能又は効果に関連する注意

〈一般感染症: 咽頭·喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、 中耳炎、副鼻腔炎〉

「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>1)</sup> を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

#### 6. 用法及び用量

#### 〈一般感染症〉

通常、小児にはクラリスロマイシンとして 1 日体重 1kg あたり  $10\sim15$ mg (力価) を  $2\sim3$  回に分けて経口投与する。レジオネラ肺炎に対しては、1 日体重 1kg あたり 15mg (力価) を  $2\sim3$  回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症〉

通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1kgあたり15mg(力価)を2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

#### 〈一般感染症〉

- 7.1 小児の1日投与量は成人の標準用量(1日400mg)を上限とすること。
- 7.2 免疫不全など合併症を有さない軽症ないし中等症のレジオネラ肺炎に対し、1日400mg分2投与することにより、通常2~5日で症状は改善に向う。症状が軽快しても投与は2~3週間継続することが望ましい。また、レジオネラ肺炎は再発の頻度が高い感染症であるため、特に免疫低下の状態にある患者などでは、治療終了後、更に2~3週間投与を継続し症状を観察する必要がある。なお、投与期間中に症状が悪化した場合には、速やかにレジオネラに有効な注射剤(キノロン系薬剤など)への変更が必要である。[8.1参照]
- 7.3 レジオネラ肺炎の治療において単独で使用することが望ましいが、患者の症状に応じて併用が必要な場合には以下の報告を参考に併用する薬剤の特徴を考慮し選択すること。
- **7.3.1** 中等症以上の患者にリファンピシンと併用し有効との報告がある。

7.3.2 *in vitro* 抗菌力の検討において、本剤とレボフロキサシン 又はシプロフロキサシンとの併用効果(相乗ないし相加作用) が認められたとの報告がある。

#### 〈後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性 MAC 症〉

- 7.4 国内外の最新のガイドライン2)等を参考に併用療法を行うこと。
- 7.5 臨床的又は細菌学的な改善が認められた後も継続投与すべき である。[8.1 参照]

#### 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則 として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投 与にとどめること。[7.2,7.5 参照]
- 8.2 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.4 参照]
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 他のマクロライド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 9.1.2 心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者

QT 延長、心室頻拍 (Torsade de pointes を含む)、心室細動をおこすことがある。[11.1.2 参照]

9.2 腎機能障害患者

本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。[16.6.1 参照]

9.2.1 腎機能障害患者でコルヒチンを投与中の患者

投与しないこと。コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状が報告されている。[2.3,10.2 参照]

9.3 肝機能障害患者

肝機能障害を悪化させることがある。[11.1.3 参照]

9.3.1 肝機能障害患者でコルヒチンを投与中の患者

投与しないこと。コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状が報告されている。[2.3,10.2参照]

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験で、母動物に毒性があらわれる高用量において、胎児毒性(心血管系の異常、口蓋裂、発育遅延等)が報告されている。なお、国外における試験で次のような報告がある。SD 系ラット(15~150mg/kg/日)及び CD-1 系マウス(15~1,000mg/kg/日)において、それぞれ母動物に毒性があらわれる最高用量でラット胎児に心血管系異常並びにマウス胎児に口蓋裂が認められた。また、サル(35~70mg/kg/日)において、母動物に毒性があらわれる 70mg/kg/日で9例中1例に低体重の胎児がみられたが、外表、内臓、骨格には異常は認められなかった。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている。

なお、動物実験(ラット)の乳汁中濃度は、血中濃度の約 2.5 倍で推移した。

## 9.7 小児等

低出生体重児及び新生児を対象とした臨床試験は実施していない。

#### 9.8 高齢者

一般に生理機能が低下しており、高い血中濃度が持続するおそれがある。[16.6.2 参照]

## \* 10. 相互作用

本剤は主として CYP3A により代謝される。また、本剤は CYP3A、P-糖蛋白質 (P-gp) を阻害する。[16.4,16.7.1 参照]

## 10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

	נווווו) אלאבנווווו וייסו		
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
*	ピモジド <sup>3)</sup>	QT延長、心室性不整脈	本剤の CYP3A に対す
	[2.2 ,16.7.1 参照]	(Torsade de pointes	る阻害作用により、左
		を含む)等の心血管系	記薬剤の代謝が阻害さ
		副作用が報告されてい	れ、それらの血中濃度 が上昇する可能性があ
		る。	が上升りるり配性がある。
	エルゴタミン酒石酸塩・	血管攣縮等の重篤な副	.00
	無水カフェイン・イソ	作用をおこすおそれが	
	プロピルアンチピリン	ある。	
	[クリアミン]		
	ジヒドロエルゴタミンメ		
	シル酸塩		
	[2.2,16.7.1 参照]		
*	スボレキサント [ベルソムラ]	左記薬剤の血漿中濃度 が顕著に上昇し、その	
		作用が著しく増強する	
	塩	おそれがある。	
	 [クービビック]		
	ボルノレキサント水和		
	物		
	[ボルズィ]		
	[2.2,16.7.1 参照]	~ ) 0.10 - / 1. http://	
	ロミタピドメシル酸塩 「ジャクスタピッド〕	ロミタピドの血中濃度 が著しく上昇するおそ	
	[2.2 ,16.7.1 参照]	か者しく上升りるわてれがある。	
	タダラフィル	左記薬剤のクリアラン	
	ファファイル [アドシルカ]		
	[2.2,16.7.1 参照]	の作用が増強するおそ	
	,	れがある。	
	チカグレロル	チカグレロルの血漿中	
	[ブリリンタ]	濃度が著しく上昇する	
	[2.2,16.7.1 参照]	おそれがある。	
	イブルチニブ	イブルチニブの作用が	
	[イムブルビカ] [22 1671 会曜]	増強するおそれがあ	
	[2.2 ,16.7.1 参照]	る。	
	イバブラジン塩酸塩 [コララン]	過度の徐脈があらわれ ることがある。	
	[2.2 ,16.7.1 参照]	3 C C N W 0 0	
*	ベネトクラクス (再発又	腫瘍崩壊症候群の発現	
	は難治性の慢性リンパ	が増強するおそれがあ	
	性白血病(小リンパ球	る。	
	性リンパ腫を含む)、再		
	発又は難治性のマントル細胞リンパ腫の円骨		
	ル細胞リンパ腫の用量 漸増期)		
	[ベネクレクスタ]		
	[2.2,16.7.1 参照]		
	ルラシドン塩酸塩	ルラシドンの血中濃度	
	[ラツーダ]	が上昇し、作用が増強	
	[2.2,16.7.1 参照]	するおそれがある。	
	アナモレリン塩酸塩	アナモレリンの血中濃	
	[エドルミズ] [2.2 ,16.7.1 参照]	度が上昇し、副作用の 発現が増強するおそれ	
	[2.2 ,10.7.1 ]	がある。	
	フィネレノン	フィネレノンの血中濃	
	[ケレンディア]	度が著しく上昇するお	
	[2.2,16.7.1 参照]	それがある。	
	イサブコナゾニウム硫	イサブコナゾールの血	
	酸塩	中濃度が上昇し作用が	
	[クレセンバ] [2 2 16 7 1 会曜]	増強するおそれがあ	
.1.	[2.2 ,16.7.1 参照]	る。	
*	ボクロスポリン [ルプキネス]	ボクロスポリンの血中濃度が上昇し、その作	
	[2.2 ,16.7.1 参照]	展及が工弁し、ての作 用が増強するおそれが	
	, , J	ある。	
*	マバカムテン	マバカムテンの血中濃	
	[カムザイオス]	度が上昇し、副作用が	
	[2.2 ,16.7.1 参照]	増強され、収縮機能障	
		害による心不全のリスクが言まるなる。	
		が高まるおそれがある。	

## 10.2 併用注意 (併用に注意すること)

the deal of the second	ا د ا مسالل دالماسماسماس	[6]6 -L		カラロンで仕収めず	ナ記述対の布井神母「	大対の 〇Ⅵ □2 4 17 44 →
降下剤 [グリベンクラミド	が報告されているので、 ジゴキシンの血中濃 の推移、自覚症状、異は、 電図等に注意し、に場合を が認められた場合等に 投与量を置を行う言と。 低血糖(意識障・が異して されているので、場 は、現 は、現 は、現 は、現 は、現 は、現 は、 で、場 は、 で、場 は、 に に さ れ に は る の で 、 は の で 、 は の で 、 は の に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に	ゴキシンの不活化が抑制されるか、もしくはP-gpを介したジゴキシンの輸送が阻害されることにより、その血中濃度が上昇する。 機序は不明である。左記薬剤の血中濃度が上	*	クマリン系抗凝血剤 ワルファリンカリウム ドセタキセル水和物 アベマシクリブ <sup>10)</sup> オキシコドン塩酸塩水和物 <sup>11)</sup> フェンタニル/フェンタ ニルクエン酸塩 [16.7.1 参照]	の可能性があるので、 異常が認められた場合には、投与歯切な処理を行うこと。 なお、トルバプタンの間にはいてがある。 おいては、ることがりないでは、 おいては、ることがりないでは、 おいとずけにいたですいに併まや合においの用量においの用量がある。 考慮すること。	る阻害作用により、方 記薬剤の代謝が阻害さ
シクロスポリン タクロリムス水和物 エベロリムス	の可能性があるので、 左記薬剤の血中濃度の 推移等に注意し、異常 が認められた場合に	る阻害作用により、左 記薬剤の代謝が阻害さ	•	は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)の維持投与期、再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫の維持投与期、急性骨髄性白血病)[16.7.1 参照]	用が増強するおそれがあるので、ベネトクラクスを減量するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。	
シウム水和物 <sup>6)</sup> シンバスタチン <sup>6)</sup>	うこと。 左記薬剤の血中濃度上 昇に伴う横紋筋融解症 が報告されているたい。 異常が認められた 場合には、投与量の 節や中止等の適切を行うこと。 腎機能障害のある患者 には特に注意するる			P-gp で排出される薬 剤) [アピキサバン		P-gp に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝及び排出が阻害さ
,16.7.1 参照] ベンゾジアゼピン系薬	と。 コルヒチンの血中濃度 上昇に伴う中毒症状 (汎血球減少、肝機痛、 障害、筋肉痛、発熱等) が報告されているので、 異常が認められた場合 には、投与量の調節や 中止等の適切な処置を 行うこと。 左記表別の血中濃度上			酸塩水和物] [16.7.1 参照]  イトラコナゾール <sup>12)</sup> HIV プロテアーゼ阻害剤  [リトナビル <sup>13)</sup> ロピナビル・リトナビル  ダルナビル エタノー	本剤の未変化体の血中濃度上昇による作用の増強等の可能性がある。また、イトラコナゾールの併用においては、イトラコナゾールの血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性がある。	CYP3A に対する阻害
薬剤) [トリアゾラム <sup>7)</sup> ミダゾラム <sup>8)</sup> 等] 非定型抗精神病薬 (CYP3Aで代謝される 薬剤)	昇に伴う作用の増強等で、自動性があるた場節で、合いでは、			リファブチン <sup>14)</sup> エトラビリン <sup>15)</sup> [16.4 ,16.7.1 参照]	異常が認められた場合には、投与量の調節を には、投与量の調質を 行うこと。 左記薬剤の血中濃度上 昇に伴う作用の増強等 の可能性がある。 また、本濃度が低中。 変化体の血中濃度が低中。 活性代謝物の血中。 が上昇し、本剤の作用の が減弱する可能性がある。	る阻害作用により、方記薬剤の代謝が阻害される。 また、左記薬剤の CYP3A4に対する記導作用により、本剤の
エプレレノン エレトリプタン臭化水 素酸塩 カルシウム拮抗剤 (CYP3Aで代謝される 薬剤) [ニフェジピン ベラパミル塩酸塩 等] リオシグアト ジエノゲスト ホスホジエステラーゼ	考慮すること。			リファンピシン <sup>16)</sup> エファビレンツ ネビラピン [16.4 ,16.7.1 参照]	異常が認められた場合には、投与量切な処置では、投与量切な処置で行うこと。本剤の未変化体の血性がある。本紙では、接がある。など、水質がの可能性がある。など、水質が変更がある。など、水質が変更がある。など、水質が変更がある。など、水質が変更がある。	に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
5 阻害剤 〔シルデナフィルクエ				天然ケイ酸アルミニウ ム <sup>17)</sup>	本剤の吸収が低下する との報告がある。	左記薬剤の吸着作用によるものと考えられる。

#### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行 うこと。

## 11.1 重大な副作用

**11.1.1** ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明) 呼吸困難、痙攣、発赤等があらわれることがある。

11.1.2 QT 延長、心室頻拍 (Torsade de pointes を含む)、心室細動 (いずれも頻度不明)

QT 延長等の心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者においては特に注意すること。[9.1.2 参照]

- **11.1.3 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全** (いずれも頻度不明) 劇症肝炎、AST、ALT、 $\gamma$ -GTP、LDH、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれることがある。[9.3 参照]
- 11.1.4 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症(いずれも頻度不明)

[8.2 参照]

11.1.5 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、多形紅 斑(いずれも頻度不明)

異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン 剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.6 PIE 症候群・間質性肺炎(いずれも頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常、好酸球増多等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.7 偽膜性大腸炎、出血性大腸炎(いずれも頻度不明)

偽膜性大腸炎、出血性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.8 横紋筋融解症 (頻度不明)

筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇が あらわれることがある。横紋筋融解症による急性腎障害の発症 に注意すること。

11.1.9 痙攣 (頻度不明)

痙攣(強直間代性、ミオクロヌス、意識消失発作等)があらわれることがある。

11.1.10 急性腎障害、尿細管間質性腎炎(いずれも頻度不明)

乏尿等の症状や血中クレアチニン値上昇等の腎機能低下所見が 認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.11 IgA 血管炎 (頻度不明)

11.1.12 薬剤性過敏症症候群 18) (頻度不明)

初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

#### 11.2 その他の副作用

〈一般感染症〉

	0.1 ~ 5% 未満	0.1% 未満	頻度不明
過敏症	発疹	そう痒感	_
精神神経系	_	めまい頭痛	幻覚 失見当識 意地病 寒気 寒気 戦 がれ がれ が が が が が が が が が が が が が が が が

_			
	0.1 ~ 5% 未満	0.1% 未満	頻度不明
感覚器	_	味覚異常(にがみ 等)	耳鳴 聴力低下 嗅覚異常
消化器	悪心 嘔吐 胃部不快感 腹部膨満感 腹痛 下痢	食欲不振 軟便 口内炎 舌炎 口渇	口腔内びらん 胸やけ 歯牙変色 舌変色
血液	好酸球増多	_	_
肝臓	AST 上昇 ALT 上昇 γ -GTP 上昇 LDH 上昇 Al-P 上昇	_	
筋・骨格	_	_	筋肉痛
その他		倦怠感 浮腫 カンジダ症 発熱	動悸 CK 上昇 脱毛 頻尿 低血糖

#### 〈後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性 MAC 症〉

	5 ~ 10% 未満	1 。 50/ 土.进	相序工印
体并并公子	3~10% 木倘	1~5%未満	頻度不明
精神神経系		不眠症	頭め激神感痙妄幻運躁偏末精い 動常 動に 動常 動反反反神 動に が が が が が が が が が が が が が が が が が が
感覚器	_	味覚減退	味覚倒錯 難聴 耳鳴 味覚喪失 結膜炎
皮膚		発疹	そう痒感 斑状丘疹状皮疹 ざ瘡 帯状疱疹 紫斑皮疹 光線過敏性反応 発汗
消化器	下痢	悪心 食欲不振 腹痛 嘔吐 逆流性食道炎	鼓腸放屁 消化不良 便秘 び 口舌炎 舌変色
血液	_	白血球減少 貧血 再生不良性貧血 好中球減少 骨髄機能不全	
肝臓	肝機能異常	γ-GTP 上昇 Al-P 上昇	AST 上昇 ALT 上昇 胆汁うっ滞性黄疸 肝炎 ビリルビン上昇
腎臓	_	急性腎障害	BUN 上昇 クレアチニン上昇
生殖器	_	子宮頸部上皮異形成	
筋・骨格	_	_	筋肉痛 関節痛

	5 ~ 10% 未満	1 ~ 5% 未満	頻度不明
その他	_	高脂血症 トリグリセリド上 昇 高尿酸血症 低カリウム血症 徐脈	無ア カ症 カララダ症 イウン イウ カ イウ カ イ カ イ カ イ カ イ カ イ カ イ カ イ カ イ

頻度は承認時の国内臨床試験及び製造販売後の使用成績調査の 合算に基づいている。

## 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。 PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

#### 16. 薬物動態

#### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回投与

小児に 5mg (力価) /kg を、また健康成人に 200mg、400mg (力価) を空腹時単回経口投与したときの平均血清中濃度及び各パラメータの値は以下のようであった  $^{19),200}$ 。


	測定法	C <sub>max</sub> (µg/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC (μg·hr/mL)
小児(n=6)	HPLC 未変化体	1.05	1.4	1.8	3.54
5mg/kg	HPLC 代謝物	0.98	1.4	3.2	5.37
成人(n=8) 200mg	Bioassay	1.16	1.9	4.04	8.98
成人(n=8) 400mg	Bioassay	2.24	2.7	4.36	20.30

#### 16.1.2 生物学的同等性試験

クラリスロマイシン錠小児用 50mg 「TCK」とクラリス錠 50 小児用を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 [クラリスロマイシン 50mg (力価)] 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、 $C_{max}$ ) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80)  $\sim log$  (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された  $^{21}$ )。

	判定パラメータ		参考パラメータ		
	AUC <sub>0</sub> → <sub>12hr</sub> (ng•hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	
クラリスロマイシン錠 小児用 50mg 「TCK」					
クラリス錠 50 小児用	809.02 ± 220.49	146.44 ± 41.78	1.68 ± 0.49	4.15 ± 0.92	

(Mean  $\pm$  S.D., n=20)



血漿中濃度並びに AUC、C<sub>max</sub> 等のパラメータは、被験者の選択、 体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性があ る。

#### 16.2 吸収

#### 16.2.1 バイオアベイラビリティ

健康成人において、クラリスロマイシン錠剤 (250mg) を経口投与した場合 (2回測定) とクラリスロマイシンラクトビオン酸塩を静脈内投与した場合の薬物速度論的パラメータを比較検討した。その結果、未変化体のバイオアベイラビリティは52、55%であったが、初回通過効果によって生成される活性代謝物(14位水酸化体)を含めたパラメータ解析結果から、クラリスロマイシンは経口投与後ほぼ完全に吸収されていることが示唆された<sup>22)</sup> (海外データ)。

#### 16.2.2 食事の影響

小児に 10mg (力価) /kg を単回経口投与したときの血清中濃度には、食事の影響がほとんど認められなかった  $^{23)}$ 。

#### 16.3 分布

健康成人における唾液、また、患者における喀痰、気管支分泌物等への移行性を測定した結果、それぞれの組織への移行は良好で、血清中濃度と同等もしくはそれ以上の濃度を示した。また、皮膚、扁桃、上顎洞粘膜等の組織中濃度はほとんどの例で血清中濃度を大きく上まわった。なお、ヒト血清蛋白結合率は  $42\sim50\%$  であった  $^{24)\sim29)}$  (in vitro)。

#### 16.4 代謝

ヒトにおける主代謝物は 14 位水酸化体であり、血清中には未変化体とほぼ同量存在した  $^{30)}$ 。

ヒト肝ミクロソームを用いた *in vitro* 試験において、クラリスロマイシンは主として CYP3A で代謝されることが報告されている $^{31}$ 。[10..16.7.1参照]

#### 16.5 排泄

小児患者に 5mg (力価) /kg を単回経口投与し、Bioassay で測定したところ、投与後 6 時間までに投与量の 25.8% が尿中へ排泄された  $^{32}$ 。

なお、健康成人に 200mg (力価) を空腹時に単回経口投与した ところ、尿中には主に未変化体及び活性代謝物の 14 位水酸化体 が認められた <sup>30)</sup>。

## 16.6 特定の背景を有する患者

## 16.6.1 腎機能障害者

腎機能正常者と種々な程度の腎機能障害者に 200mg (力価)を空腹時単回経口投与し、クレアチニンクリアランス (Ccr)とその体内動態との関係を検討した結果、腎機能の低下に伴って $C_{max}$ の上昇、 $T_{1/2}$ の延長及び AUC の増加が認められた  $^{33}$  (測定法:Bioassay)。 [9.2 参照]

クレアチニン クリアランス (mL/min)	C <sub>max</sub> (µg/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC (μg·hr/mL)
Ccr = 100(n=5)	2.02	1.24	2.38	8.89
Ccr = 50 (n=5)	2.15	1.89	5.74	21.69
Ccr = 30 (n=5)	2.55	0.96	4.69	18.73
Ccr = 5(n = 5)	3.54	1.48	6.13	36.89

#### 16.6.2 高齢者

重篤な基礎疾患のない  $66 \sim 82$  歳(平均 72.2 歳)の女性 3 名に 200mg(力価)を空腹時単回経口投与し、その体内動態を検討した結果、健康成人と比べると  $T_{max}$ 、 $T_{1/2}$  はほぼ同様であったが、 $C_{max}$ 、AUC は明らかに高かった  $^{34}$  (測定法: Bioassay)。 [9.8 参照]

	C <sub>max</sub> (µg/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC (μg·hr/mL)
高齢者(n=3)	3.72	2.3	4.2	19.20

## 16.7 薬物相互作用

**16.7.1** CYP3A、P-gp に対する阻害作用を有する <sup>35)</sup>。[10. ,16.4 参照]

## 16.7.2 テオフィリン

健康成人男性にテオフィリンを 400 mg 及びクラリスロマイシンを 300 mg 併用した結果、併用 5 日目でテオフィリンの血清中濃度は  $C_{\text{max}}$  で 1.26 倍、AUC で 1.19 倍上昇し、クリアランスは 16.4% 減少したが統計的に有意差は認められなかった  $^{4)}$ 。また、気管支喘息患児にテオフィリンを  $300\sim600 \text{mg/day}$  で 1 日分 2 経口投与し、更にクラリスロマイシン 600 mg/day を 1 日分 2 併用投与した結果、併用 7 日目においてテオフィリンの血清中濃度は有意な上昇を示した  $^{5)}$ 。 [10.2 参照]

#### 18. 薬効薬理

## 18.1 作用機序

細菌の 70S リボソームの 50S サブユニットと結合し、蛋白合成 を阻害する  $^{35),36}$ 。

#### 18.2 薬理作用

#### 18.2.1 抗菌作用

ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌の好気性グラム陽性菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、百日咳菌、カンピロバクター属等の一部のグラム陰性菌、クラミジア属、マイコプラズマ属及びマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)に抗菌作用を示し、その作用は他のマクロライド系抗生物質と同等以上である  $^{37)}$   $^{-44}$  (  $in\ vitro$  )。

#### 18.2.2 ヒト主代謝物 14 位水酸化体の抗菌力

未変化体とほぼ同等の抗菌力を有するが、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)に対しては未変化体より弱い  $^{45),46)}$  (in vitro)。

#### 18.2.3 動物感染モデルに対する作用

マウスの腹腔内感染、皮下感染、呼吸器感染症モデルにおいては、 クラリスロマイシンの良好な組織移行性を反映し、優れた効果 を示す <sup>37) ,38) ,40) ,41) ,45)</sup>。

#### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称: クラリスロマイシン (Clarithromycin)

化 学 名:(2R,3S,4S,5R,6R,8R,10R,11R,12S,13R)-5-(3,4,6-Trideoxy-3-dimethylamino-β-D-xylo-hexopyranosyloxy)-3-(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyloxy)-11,12-dihydroxy-6-methoxy-2,4,6,8,10,12-hexamethyl-9-oxopentadecan-13-olide

分子式: C<sub>38</sub>H<sub>69</sub>NO<sub>13</sub> 分子量: 747.95

融 点:220~227℃

構造式:

性 状:白色の結晶性の粉末で、味は苦い。

アセトン又はクロロホルムにやや溶けやすく、メタノール、エタノール(95)又はジエチルエーテルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

#### 22. 包装

100錠 (10錠(PTP)×10)

#### 23. 主要文献

- 厚生労働省健康局結核感染症課編:抗微生物薬適正使用 の手引き
- 2) Griffith DE, et al.: Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175 (4): 367-416
- 3) Desta Z, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1999; 65 (1): 10-20
- 4) 二木芳人ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 515-520
- 5) 辻本善樹ほか:日本小児アレルギー学会誌.1989;3(1):48-55
- 6) Jacobson TA.: Am J Cardiol. 2004; 94 (9): 1140-1146
- 7) Greenblatt DJ, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1998; 64 (3): 278-285
- 8) Yeates RA, et al.: Int J Clin Pharmacol Ther. 1997; 35 (12): 577-579
- 9) Hedaya MA, et al.: Biopharm Drug Dispos. 2006; 27 (2): 103-110
- 10) Kulanthaivel P, et al.: Cancer Res. 2016; 76 (14 suppl): CT153
- 11) Liukas A, et al. : J Clin Psychopharmacol. 2011 ; 31 (3) : 302-308
- 12) Hardin TC, et al.: Pharmacotherapy. 1997; 17 (1):
- 13) Ouellet D, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1998; 64 (4): 355-362
- 14) Hafner R, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42 (3): 631-639
- 15) Kakuda TN, et al.: J Antimicrob Chemother. 2014; 69 (3): 728-734
- 16) Wallace RJ Jr, et al. : J Infect Dis. 1995 ; 171 (3) : 747-750
- 17) 高橋賢成ほか:臨床薬理.1995;26(1):149-150
- 18) 厚生労働省: 重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過 敏症症候群
- 19) 坂田英明ほか:日本化学療法学会雑誌.2009;57(2): 97-100
- 20) 諏訪俊男ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (12): 921-932
- 21) 社内資料:生物学的同等性試験
- 22) Chu SY, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36 (5): 1147-1150
- 23) 藤井良知ほか:Jpn J Antibiot. 1989; 42 (2): 512-541
- 24) 佐々木次郎ほか: Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 1058-1073
- 25) 古賀宏延ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 698-714
- 26) 力富直人ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 715-728
- 27) 塙伸太郎ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 950-954
- 28) 宮崎康博ほか: Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 926-934
- 29) 諏訪俊男ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 213-226
- 30) 諏訪俊男ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (12): 933-940

- 31) Suzuki A, et al.: Drug Metab Pharmacokin. 2003; 18 (2): 104-113
- 32) 藤井良知ほか:Jpn J Antibiot. 1994; 47 (10): 1283-
- 33) 瀧井昌英ほか: Chemotherapy. 1989; 37(1): 15-21
- 34) 足立暁ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 660-666
- 35) 第十八改正 日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021: C1597-C1605
- 36) 懸川友人ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 123-128
- 37) 小野武夫ほか: Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 1-34
- 38) 五島瑳智子ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 35-58
- 39) 横田健ほか: Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 59-70
- 40) 西野武志ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 95-
- 41) 長手尊俊ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 129-155
- 42) 吉沢花子ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3):117-122
- 43) 洲崎健ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3):111-116
- 44) Brown BA, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36 (9): 1987-1990
- 45) 長手尊俊ほか:Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 156-169
- 46) Cohen Y, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36 (10): 2104-2107

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

辰巳化学株式会社 薬事・学術課 〒 921-8164 金沢市久安 3 丁目 406 番地 TEL 076-247-2132 FAX 076-247-5740

## 26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



## 辰巳化学株式会社

金沢市久安3丁目406番地