

貯法：室温保存
有効期間：3年

日本標準商品分類番号
872149

高親和性AT₁レセプターブロッカー

処方箋医薬品^{注)}

オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠

	承認番号	販売開始
OD錠 5 mg	22900AMX00159	2017年 9 月
OD錠10mg	22900AMX00136	2017年 9 月
OD錠20mg	22900AMX00137	2017年 9 月
OD錠40mg	22900AMX00138	2017年 9 月

オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」

OLMESARTAN OD TABLETS「DSEP」

注)注意—医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]
- 2.3 アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者(ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く)[10.1 参照]

3. 組成・性状

*3.1 組成

販売名	有効成分	添加剤
オルメサルタン OD錠 5 mg 「DSEP」	1錠中 オルメサルタン メドキシミル(日局) 5mg	結晶セルロース、β-シクロデキ ストリン、カルメロース、スクラ ロース、アセスルファムカリウム、 ステアリン酸マグネシウム、 黄色三酸化鉄、香料、dl-α-ト コフェロール
オルメサルタン OD錠 10 mg 「DSEP」	1錠中 オルメサルタン メドキシミル(日局) 10mg	結晶セルロース、β-シクロデキ ストリン、カルメロース、スクラ ロース、アセスルファムカリウム、 ステアリン酸マグネシウム、 香料、dl-α-トコフェロール
オルメサルタン OD錠 20 mg 「DSEP」	1錠中 オルメサルタン メドキシミル(日局) 20mg	
オルメサルタン OD錠 40 mg 「DSEP」	1錠中 オルメサルタン メドキシミル(日局) 40mg	

3.2 製剤の性状

販売名	剤形 ^{注)}	色	外形			識別 コード
			直径 (mm)	厚さ (mm)	質量 (mg)	
オルメサルタン OD錠 5 mg 「DSEP」	素錠 (口腔内 崩壊錠)	淡黄白色				オルメ EP OD5
			6.1	約3.0	約80	
オルメサルタン OD錠 10 mg 「DSEP」	素錠 (口腔内 崩壊錠)	白色～ 微黄白色				オルメ EP OD10
			6.1	約3.0	約80	
オルメサルタン OD錠 20 mg 「DSEP」	素錠 (口腔内 崩壊錠) (割線入)	白色～ 微黄白色				オルメ EP OD20
			7.6	約3.8	約160	
オルメサルタン OD錠 40 mg 「DSEP」	素錠 (口腔内 崩壊錠)	白色～ 微黄白色				オルメ EP OD40
			9.6	約4.7	約320	

注)においはないか、又はわずかに特異なにおいがある。

4. 効能又は効果

高血圧症

6. 用法及び用量

通常、成人にはオルメサルタン メドキシミルとして10～20mgを1日1回経口投与する。なお、1日5～10mgから投与を開始し、年齢、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は40mgまでとする。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中に重篤な肝機能障害があらわれたとの報告があるので、肝機能検査を実施するなど観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]
- 8.2 手術前24時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン-アンジオテンシン系の抑制作用による高度な血圧低下を起こす可能性がある。
- 8.3 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
 - 9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。
 - 9.1.2 高カリウム血症の患者
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。高カリウム血症を増悪させるおそれがある。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、血清カリウム値に注意すること。
 - 9.1.3 脳血管障害のある患者
過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させるおそれがある。
 - 9.1.4 厳重な減塩療法中の患者
低用量から投与を開始し、増量する場合は徐々に行うこと。一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。[11.1.4 参照]
- 9.2 腎機能障害患者
 - 9.2.1 重篤な腎機能障害(血清クレアチニン値3.0mg/dL以上)のある患者
これらの患者を対象とした有効性及び安全性を検討する臨床試験は実施していない。腎機能を悪化させるおそれがある。[16.6.1 参照]

9.2.2 血液透析中の患者

低用量から投与を開始し、増量する場合は徐々に行うこと。一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。[11.1.4 参照]

9.3 肝機能障害患者

軽度又は中等度の肝機能障害患者 (Child-Pugh分類スコア：5～9) でオルメサルタンの血漿中濃度が上昇することが報告されている。[16.6.2 参照]

9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性

妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響 (腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等) が認められた例が報告されている^{1)、2)}。本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]

- (1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
- (2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中にも必要に応じ説明すること。
 - ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
 - ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
 - ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。

妊娠中期及び末期にアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤又はアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形、肺の形成不全等があらわれたとの報告がある。[2.2、9.4.1 参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。動物実験 (ラット) の5mg/kg/日で乳汁中への移行が認められている。動物実験 (ラット周産期及び授乳期経口投与) の200mg/kg/日で出生児に腎盂拡張を伴う死亡及び体重減少が、8mg/kg/日で出生児に体重増加抑制及び生後分化の遅延が認められている。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

開始用量を遵守し、慎重に投与すること。一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

10. 相互作用

10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレンフマル酸塩 ラジレス (糖尿病患者に使用する場合。ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く。) [2.3 参照]	非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン、トリアムテレン等 カリウム補給剤 塩化カリウム等	血清カリウム値が上昇することがある。	本剤のアルドステロン分泌抑制作用によりカリウム貯留作用が増強するおそれがある。 危険因子：腎機能障害のある患者
利尿降圧剤 フロセミド、トリクロルメチアジド等 [11.1.4 参照]	一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。低用量から投与を開始し、増量する場合は徐々に行うこと。	利尿降圧剤で治療を受けている患者にはレニン活性が亢進している患者が多く、本剤が奏効しやすい。
リチウム製剤 炭酸リチウム	リチウム中毒が起こるおそれがある。	明確な機序は不明であるが、ナトリウムイオン不足はリチウムイオンの貯留を促進するといわれているため、本剤がナトリウム排泄を促進することにより起こると考えられる。
アリスキレンフマル酸塩	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。eGFRが60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。	
非ステロイド性消炎鎮痛剤	降圧作用が減弱するおそれがある。 腎機能を悪化させるおそれがある。	非ステロイド性消炎鎮痛剤は、血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成阻害作用により、本剤の降圧作用を減弱させる可能性がある。 プロスタグランジンの合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

** 11.1.1 血管性浮腫 (頻度不明)

顔面、口唇、咽頭、舌の腫脹等が症状としてあらわれることがある。また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管血管性浮腫があらわれることがある。

11.1.2 腎不全 (頻度不明)

11.1.3 高カリウム血症 (頻度不明)

11.1.4 ショック (頻度不明)、失神 (頻度不明)、意識消失 (頻度不明)
冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[9.1.4、9.2.2、10.2 参照]

- 11.1.5 肝機能障害(頻度不明)、黄疸(頻度不明)
AST、ALT、 γ -GTP上昇等の肝機能障害があらわれることがある。[8.1 参照]
- 11.1.6 血小板減少(頻度不明)
- 11.1.7 低血糖(頻度不明)
脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。糖尿病治療中の患者であらわれやすい。
- 11.1.8 横紋筋融解症(頻度不明)
筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11.1.9 アナフィラキシー(頻度不明)
そう痒感、全身発赤、血圧低下、呼吸困難等が症状としてあらわれることがあり、アナフィラキシーショックを起こしたとの報告もある。
- 11.1.10 重度の下痢(頻度不明)
長期投与により、体重減少を伴う重度の下痢があらわれることがある。生検により腸絨毛萎縮等が認められたとの報告がある。
- 11.1.11 間質性肺炎(頻度不明)
発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	1～5%未満	1%未満	頻度不明
過敏症		発疹	そう痒
血液	赤血球数減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少	白血球数増加、血小板数減少	貧血
精神神経系	めまい、立ちくらみ、ふらつき感	頭痛、頭重感、眠気	
消化器		軟便	下痢、嘔気・嘔吐、口渇、口内炎、胃部不快感、便秘、腹痛
循環器			心房細動、動悸、ほてり、胸痛
肝臓	ALT上昇、AST上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇	ALP上昇	
泌尿器	BUN上昇	血清クレアチニン上昇、尿蛋白陽性、尿沈渣陽性	頻尿
その他	CK上昇、CRP上昇、トリグリセリド上昇、血清カリウム上昇、尿酸上昇	全身倦怠感、咳嗽	浮腫、異常感(浮遊感、気分不良等)、胸部不快感、筋肉痛、脱力感、疲労、しびれ、味覚異常、脱毛

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

本剤をメトホルミン塩酸塩製剤又はカモスタットメシル酸塩製剤等と一包化し高温多湿条件下にて保存した場合、メトホルミン塩酸塩製剤又はカモスタットメシル酸塩製剤等が変色することがあるので、一包化は避けること。

14.2 薬剤交付時の注意

- 14.2.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

- 14.2.2 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

- 14.2.3 本剤は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。


16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康な成人男性51例にオルメサルタン メドキシミルOD錠40mg1錠(水なし又は水で服用)又はオルメサルタン メドキシミル錠40mg1錠(水で服用)を、クロスオーバー法で空腹時単回経口投与して、活性代謝物のオルメサルタンの薬物動態パラメータを比較した。Cmax及びAUC_{last}の幾何平均値の比の両側90%信頼区間は、いずれも0.80～1.25の範囲内であり、両製剤の生物学的同等性が確認された³⁾。オルメサルタン メドキシミルOD錠5mg、OD錠10mg及びOD錠20mgは「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、標準製剤をオルメサルタン メドキシミルOD錠40mgとしたとき、溶出挙動は同等と判定され、生物学的に同等とみなされた。

オルメサルタン メドキシミルOD錠40mg(水なし又は水で服用)又はオルメサルタン メドキシミル錠40mg(水で服用)単回経口投与時のオルメサルタンの血漿中濃度推移



オルメサルタン メドキシミルOD錠40mg(水なし又は水で服用)又はオルメサルタン メドキシミル錠40mg(水で服用)単回経口投与時のオルメサルタンの薬物動態パラメータ

剤形	例数	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC _{last} (ng・hr/mL)
OD錠40mg (水なしで服用)	51	978±331	2.5±0.8	7.5±1.2	6,770±2,180
OD錠40mg (水で服用)	50	904±256	2.6±0.9	7.5±1.2	6,570±1,810
錠40mg (水で服用)	51	983±234	2.1±0.8	7.4±1.0	7,170±2,090

mean±SD

健康な成人男性24例にオルメサルタン メドキシミル5mg、10mg、20mg及び40mgを空腹時単回経口投与したとき、オルメサルタンの血漿中濃度は速やかに上昇し、投与1.7～2.2時間後に最高に達した。Cmax及びAUCは投与量に従い増加した⁴⁾。

オルメサルタン メドキシミル単回経口投与時のオルメサルタンの薬物動態パラメータ

投与量	例数	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC (ng・hr/mL)
5mg	6	152±31	1.8±0.4	8.7±1.2	892±191
10mg	6	277±46	1.7±0.5	10.2±1.8	1,576±244
20mg	6	481±117	2.2±0.4	11.0±3.8	2,903±915
40mg	6	1,006±152	1.7±0.5	10.6±4.7	5,807±1,142

mean±SD

16.1.2 反復投与

本態性高血圧症患者にオルメサルタン メドキシミル10mg(20例)及び20mg(19例)を14日間、40mg(10例)を

7日間反復経口投与したところ、最終日のオルメサルタン
の薬物動態学的パラメータは、次のとおりであった。

投与量	例数	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC (ng・hr/mL)
10mg ^{注1)}	20	294.3±78.7	2.2±0.8	6.5±0.9	2,033.5±478.5
20mg ^{注1)}	19	516.9±150.6	2.5±1.1	6.3±0.8	3,394.7±917.3
40mg ^{注2)}	10	1,039.0±250.6	2.6±1.0	6.0±1.0	8,162.0±2,345.0

注1)14日間投与、注2)7日間投与、mean±SD

健康な成人男性27例にオルメサルタン　メドキシミル
10mg、20mg及び40mgを1日1回7日間反復経口投与した
ときの血漿中オルメサルタン濃度を検討したところ、速や
かに定常状態に達し、蓄積性はほとんど認められなかった⁵⁾。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康な成人男性12例にオルメサルタン　メドキシミル
20mgを空腹時、低脂肪食摂取30分後あるいは高脂肪食摂
取30分後に単回経口投与したとき、それぞれのオルメサル
タンのCmax及びAUCにはほとんど差はなく、食事の影響
は認められなかった⁶⁾。

16.2.2 バイオアベイラビリティ

健康な成人男性24例にオルメサルタン　メドキシミル
20mgを空腹時単回経口投与又はオルメサルタン16.2mgを
静脈内に単回投与し、絶対バイオアベイラビリティを求め
た結果、25.6%であった(外国人データ)。

16.3 分布

16.3.1 血清蛋白結合率(限外濾過法)

オルメサルタンの血清蛋白結合率は99%と高く、主にアル
ブミンのワルファリンサイトに結合する(*in vitro*)が、ワ
ルファリンとの併用試験でワルファリンの薬物動態に影響
がなく血液凝固系に影響を及ぼさなかった(外国人データ)。

16.4 代謝

オルメサルタン　メドキシミルは、経口投与後、主に小腸上
皮、肝臓又は血漿においてエステラーゼによる加水分解を受
け、活性代謝物のオルメサルタンに代謝される。血漿中には
オルメサルタンのみが認められ、その他の代謝物は存在しな
い。ヒト肝ミクロソームを用い、チトクロームP450分子種7
種類(1A1&2、2A6、2C19、2C8&9、2D6、2E1、3A4)の
活性について、オルメサルタンによる阻害率を検討したとこ
ろ、臨床用量で想定される血漿中濃度ではいずれの分子種も
ほとんど阻害しなかった。また、ヒト培養肝細胞にて、オル
メサルタン　メドキシミルによるチトクロームP450の誘導は
認められなかった(*in vitro*)。

16.5 排泄

健康な成人男性6例に¹⁴C-オルメサルタン　メドキシミル
20mgを単回経口投与したところ、投与した総放射能の
12.6%(240時間後まで)が尿中に、77.2%(312時間後まで)
が糞中に排泄された(外国人データ)。

健康な成人男性24例にオルメサルタン　メドキシミル5mg、
10mg、20mg及び40mgを空腹時単回経口投与したとき、投
与48時間までに尿中にオルメサルタンが11.6～14.6%排泄さ
れた。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

健康な成人男性8例と、腎機能障害患者26例を重症度別に
8～9例ずつ3群に分けた計34例に対し、オルメサルタン
メドキシミル10mgを1日1回7日間反復経口投与したとき
の7日目の定常状態における血漿中オルメサルタンのAUC
の幾何平均値は、腎機能正常者と比較して、軽度、中等度
及び重度腎機能障害患者でそれぞれ1.6倍、1.8倍、2.8倍で
あった⁷⁾(外国人データ)。^[9.2.1 参照]

16.6.2 肝機能障害患者

軽度及び中等度肝機能障害患者12例にオルメサルタン　メ
ドキシミル10mgを空腹時単回経口投与したとき、肝機能
正常者と比較して血漿中オルメサルタンのAUCの幾何平均
値はそれぞれ1.1倍、1.7倍であった⁷⁾(外国人データ)。
^[9.3 参照]

16.6.3 高齢者

健康な高齢者(65歳以上)6例にオルメサルタン　メドキシ
ミル10mgを単回経口投与し、健康な非高齢者とオルメサ
ルトンのAUCの幾何平均値を比較したところ、ほとんど差
は認められなかった⁸⁾。

また、高齢高血圧症患者(75歳以上)17例にオルメサルタン
メドキシミル10mgを1日1回14日間反復経口投与したとこ
ろ、非高齢患者に比較しAUCの幾何平均値が1.4倍高値を
示したが、蓄積性はほとんど認められなかった⁷⁾(外国人
データ)。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内臨床試験

本態性高血圧症患者を対象としたオルメサルタン　メドキ
ソミルの二重盲検比較試験を含む臨床試験での「判定不能」
を含む降圧率(下降例数^{*}/評価例数)は79.8%(364/456例)、
「判定不能」を含まない降圧率は84.7%(364/430例)であっ
た。なお、このうち軽症・中等症の本態性高血圧症患者を対
象とした二重盲検比較試験によって、本剤の有用性が確認さ
れた。

降圧効果はオルメサルタン　メドキシミル投与後1週間で
発現し、2週間以内に有意な降圧を示した後、4～8週間で
最大に達することが確認された。

※下降：収縮期血圧(-20mmHg以上)及び拡張期血圧(-10mmHg以上)を満た
す場合、平均血圧(-13mmHg以上)を満たす場合、あるいは下降傾
向[※]であっても150/90mmHg未満(ただし、入院患者では
140/85mmHg未満)に降圧した場合

※※下降傾向：収縮期血圧(-10mmHg以上)及び拡張期血圧(-5mmHg以上)を
満たす場合、あるいは平均血圧(-7mmHg以上)を満たす場合

17.1.2 国内第Ⅲ相試験

腎機能障害を伴う高血圧症患者を対象としたオルメサルタ
ン　メドキシミルの臨床試験での「判定不能」を含む降圧率
は68.0%(17/25例)、「判定不能」を含まない降圧率は
77.3%(17/22例)であった。
副作用発現頻度は、自他覚症状が10.0%(3/30例)、臨床検
査値異常が20.7%(6/29例)であり、認められた自他覚症状
の副作用は、頭重(感)、低血圧及び咳が各3.3%(1/30例)
であった。

17.1.3 国内第Ⅲ相試験

重症高血圧症患者を対象としたオルメサルタン　メドキシ
ミルの臨床試験での「判定不能」を含む降圧率は86.2%
(25/29例)、「判定不能」を含まない降圧率は92.6%(25/27
例)であった。
副作用発現頻度は、自他覚症状が6.9%(2/29例)、臨床検
査値異常が21.4%(6/28例)であり、認められた自他覚症状
の副作用は、眠気及び軟便が各3.4%(1/29例)であった。

17.1.4 国内臨床試験(長期投与)

軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象に、12ヵ月間オル
メサルタン　メドキシミルを単独投与した結果、安定した
降圧効果が得られた。「判定不能」を含む降圧率は80.7%
(134/166例)、「判定不能」を含まない降圧率は93.1%
(134/144例)であった。

17.1.5 国内第Ⅲ相試験(長期投与)

軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象に、12ヵ月間オル
メサルタン　メドキシミルをカルシウム拮抗剤もしくはサイ
アザイド系利尿降圧剤を併用投与した結果、安定した降
圧効果が得られた。カルシウム拮抗剤併用療法での「判定不
能」を含む降圧率は85.0%(17/20例)、「判定不能」を含ま
ない降圧率は100.0%(17/17例)であった。利尿剤併用療法
での「判定不能」を含む降圧率は72.7%(16/22例)、「判定不
能」を含まない降圧率は100.0%(16/16例)であった。
副作用発現頻度は、カルシウム拮抗剤併用療法群で自他覚
症状が4.5%(1/22例)、臨床検査値異常が4.5%(1/22例)、
利尿剤併用療法群で自他覚症状が37.0%(10/27例)、臨床
検査値異常が25.9%(7/27例)であった。主な自他覚症状の
副作用は、カルシウム拮抗剤併用療法群で立ちくらみ4.5%
(1/22例)、利尿剤併用療法群でめまい14.8%(4/27例)で
あった。

17.1.6 国内第Ⅱ相試験(血圧日内変動)

軽症・中等症本態性高血圧症を対象に、オルメサルタン
メドキシミルを12週間投与し、自由行動下血圧測定による
24時間血圧日内変動を検討した結果、オルメサルタン　メ
ドキシミルは1日1回投与において、血圧推移のプロファイ
ルに影響を及ぼすことなく、また夜間血圧を過度に低下さ
せることなく24時間安定した降圧作用を示すことが確認さ
れた。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

オルメサルタン メドキシミルはプロドラッグであり、生体内で活性代謝物であるオルメサルタンに変換され、アンジオテンシンⅡ (AⅡ) タイプ1 (AT₁) 受容体に選択的に作用してAⅡの結合を競合的に阻害し、昇圧系であるAⅡの薬理作用を抑制する。

18.2 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用

オルメサルタンのAT₁受容体拮抗作用をヒトAT₁受容体への¹²⁵I-AⅡ結合阻害で検討したところ、50%阻害濃度 (IC₅₀ 値)は1.3nMであった (*in vitro*)。また、オルメサルタンはウサギ及びモルモットの摘出血管において、AⅡによる収縮反応を抑制し、その抑制作用は薬物除去後も持続的であった。ラット及びイヌにおいて、オルメサルタン メドキシミルは、経口投与によりAⅡによる昇圧反応を持続的に抑制した⁹⁾。

18.3 降圧作用

18.3.1 オルメサルタン メドキシミルは経口投与により、腎性高血圧ラット、高血圧自然発症ラット、正常血圧ラットの順に強い降圧作用を示したが、心拍数に影響を与えなかった⁹⁾。

18.3.2 オルメサルタン メドキシミルを高血圧自然発症ラットに24週間反復経口投与すると、耐性を生じることなく安定した降圧作用を示し、反射性の頻脈も認められなかった。また、14日間反復経口投与後、休薬してもリバウンドは認められなかった⁹⁾。

18.3.3 オルメサルタンを高血圧自然発症ラットに静脈内投与すると総末梢血管抵抗が減少し、腎血管抵抗の減少が認められた。血圧は下降したが、心拍数に変化はなく、心拍出量は増大した。従って、本剤の降圧作用は全身血管の拡張に基づく総末梢血管抵抗の減少によるものと考えられる⁹⁾。


18.3.4 オルメサルタン メドキシミルを高血圧自然発症ラットに20週間反復経口投与すると、血圧の下降とともに尿中蛋白排泄及びアルブミン排泄量の減少が認められ、腎臓の病理所見の改善も認められた⁹⁾。

18.3.5 オルメサルタン メドキシミルを高血圧自然発症ラットに8週間反復経口投与すると、血圧の下降とともに心重量の低下及び心筋線維径の減少が認められ、心肥大を抑制することが確認された⁹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：オルメサルタン メドキシミル
(Olmesartan Medoxomil)
化学名：(5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate
分子式：C₂₉H₃₀N₆O₆
分子量：558.59
性 状：白色～微黄白色の結晶性の粉末である。
アセトニトリル又はエタノール (99.5) に溶けにくく、水にほとんど溶けない。

構造式：



分配係数：log Pow=1.0 (pH7)
Pow=(オクタノール相のオルメサルタン メドキシミル濃度/水相のオルメサルタン メドキシミル濃度)

20. 取扱い上の注意

アルミピロー又はプラスチックボトル開封後は湿気を避けて保存すること。

22. 包装

〈オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」〉
(PTP：乾燥剤入り) 100錠 (10錠×10)
〈オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」〉
(PTP：乾燥剤入り) 100錠 (10錠×10) 140錠 (14錠×10)
500錠 (10錠×50) 700錠 (14錠×50)
〈オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」〉
(PTP：乾燥剤入り) 100錠 (10錠×10) 140錠 (14錠×10)
500錠 (10錠×50) 700錠 (14錠×50)
(プラスチックボトル：パラ：乾燥剤入り) 500錠
〈オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」〉
(PTP：乾燥剤入り) 100錠 (10錠×10) 140錠 (14錠×10)
500錠 (10錠×50)

23. 主要文献

- 1) 阿部真也ほか：周産期医学 2017；47(10)：1353-1355
- 2) 齊藤大祐ほか：鹿児島産科婦人科学会雑誌 2021；29：49-54
- 3) 社内資料：日本人健康成人男性を対象としたオルメテック錠40mgと口腔内崩壊錠の生物学的同等性試験
- 4) 田中孝典ほか：臨床医薬 2003；19(10)：1131-1142
- 5) 田中孝典ほか：臨床医薬 2003；19(10)：1143-1156
- 6) 田中孝典ほか：臨床医薬 2003；19(11)：1283-1295
- 7) von Bergmann K, et al.：J Hypertens. 2001；19(S1)：S33-S40
- 8) 田中孝典ほか：臨床医薬 2003；19(11)：1297-1306
- 9) 小池博之ほか：三共研究所年報 2003；55：1-91

24. 文献請求先及び問い合わせ先

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-13-12
TEL：0120-100-601

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

第一三共エスファ株式会社
Daichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1

26.2 販売提携

第一三共株式会社
Daichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1