

* * 2022年11月改訂(第8版)

* 2022年8月改訂(第7版、
効能変更、用法変更)

貯 法 : 2~8°C保存

* * 有効期間 : 30箇月

抗悪性腫瘍剤／微小管阻害薬結合抗CD79bモノクローナル抗体

ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

ポライビー[®]点滴静注用30mg

ポライビー[®]点滴静注用140mg

POLIVY[®] for Intravenous Infusion

日本標準商品分類番号

874291

	30mg	140mg
承認番号	30300AMX00258	30300AMX00256
販売開始	2021年5月	2021年5月



Roche ロシュ グループ

(注)注意－医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分に対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して、十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与すること。

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ポライビー点滴静注用 30mg	ポライビー点滴静注用 140mg
有効成分	1バイアル中 ^{注1)} ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) ^{注2)} 38mg	1バイアル中 ^{注1)} ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) ^{注2)} 150mg
添加剤	1バイアル中 コハク酸 2.22mg 水酸化ナトリウム 1.02mg 精製白糖 77mg ポリソルベート20 2.3mg	1バイアル中 コハク酸 8.88mg 水酸化ナトリウム 4.08mg 精製白糖 309mg ポリソルベート20 9.0mg

注1) 本剤は注射用水(点滴静注用30mg : 1.8mL、点滴静注用140mg : 7.2mL)を抜き取り、1バイアルに溶解した時にポラツズマブ ベドチン濃度が20mg/mLとなるように過量充填されている。

注2) 本剤を構成する抗体部分は、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

3.2 製剤の性状

販売名	ポライビー点滴静注用 30mg	ポライビー点滴静注用 140mg
剤形	注射剤(バイアル)	
性状	白色から灰白色の塊	
pH ^{注3)}	5.0~5.6	
浸透圧比 ^{注3)、注4)}	約0.5	

注3) 注射用水(点滴静注用30mg : 1.8mL、点滴静注用140mg : 7.2mL)にて溶解時

注4) 生理食塩液に対する比

* 4. 効能又は効果

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

* 5. 効能又は効果に関連する注意

「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。^[17.1.1-17.1.3参照]

* 6. 用法及び用量

通常、成人には、ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)として、以下の抗悪性腫瘍剤との併用で、1回1.8mg/kg(体重)を3週間間隔で6回点滴静注する。初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。

○リツキシマブ(遺伝子組換え)、シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩及びプレドニゾロン又はメチルプレドニゾロンとの併用
○ベンダムスチン塩酸塩製剤及びリツキシマブ(遺伝子組換え)との併用

* 7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 本剤及び併用する抗悪性腫瘍剤の投与時期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知した上で投与すること。^[17.1.1-17.1.3参照]

7.2 本剤投与によるinfusion reactionを軽減させるために本剤投与の30分~1時間前に、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤の前投与を考慮すること。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮すること。^[11.1.4参照]

7.3 本剤投与により以下の副作用が発現した場合には、症状、重症度等に応じて、以下の基準を目安に、本剤の休薬等を考慮すること。

本剤の投与中止・休薬・減量基準

副作用	程度 ^{注1)}	処置
	Grade1又は2	Grade1又はベースラインに回復するまで休薬又は本剤の投与速度を下げる。症状が回復した場合には、元の投与速度で投与を再開することができる。
infusion reaction	Grade3	Grade1又はベースラインに回復するまで休薬する。症状が回復した場合には、休薬前の投与速度の1/2の投与速度で投与を再開することができる。再開後、infusion reactionが認められない場合には、投与速度を30分ごとに50mg/時ずつ上げることができる。
	Grade4	投与を中止する。
		〈リツキシマブ(遺伝子組換え)、シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩及びプレドニゾロン又はメチルプレドニゾロンとの併用の場合〉
		感覚性 : 1.4mg/kgに減量する。既に1.4mg/kgで、次回投与日までにGrade2が持続又は再発した場合、1.0mg/kgに減量する。既に1.0mg/kgの場合、投与を中止する。
末梢性ニューロパシー	Grade2	運動性 : Grade1以下に回復するまで休薬する。回復後に投与を再開する場合、1.4mg/kgに減量する。既に1.4mg/kgの場合、1.0mg/kgに減量する。既に1.0mg/kgの場合、投与を中止する。
	Grade3	感覚性 : Grade2以下に回復するまで休薬する。回復後に投与を再開する場合、1.4mg/kgに減量する。既に1.4mg/kgの場合、1.0mg/kgに減量する。既に1.0mg/kgの場合、投与を中止する。
	Grade4	運動性 : Grade1以下に回復するまで休薬する。回復後に投与を再開する場合、1.4mg/kgに減量する。既に1.4mg/kgの場合、1.0mg/kgに減量する。既に1.0mg/kgの場合、投与を中止する。

副作用	程度 ^{注)}	処置
末梢性ニューロパチー	〈ベンダムスチン塩酸塩製剤及びリツキシマブ(遺伝子組換え)併用の場合)	
	Grade2又は3 (初発)	症状が回復するまで休薬する。次回投与予定日の14日目までにGrade1以下に回復した場合には、以降は1.4mg/kgに減量して投与する。14日目までにGrade1以下に回復しなかった場合には、投与を中止する。
	Grade2又は3 (再発)	投与を中止する。
Grade4	投与を中止する。	
好中球減少	Grade3又は4	好中球数が1,000/mm ³ 以上に回復するまで休薬する。回復後は休薬前の用量で再開することができる。
血小板減少	Grade3又は4	血小板数が75,000/mm ³ 以上に回復するまで休薬する。回復後は休薬前の用量で再開することができる。

注) GradeはNCI-CTCAE v4.03に準じる

8. 重要な基本的注意

8.1 骨髄抑制があらわれることがあるので、治療開始前及び治療期間中は、定期的に血液検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。また、本剤の投与にあたっては、G-CSF製剤の適切な使用を考慮すること。[11.1.1参照]

8.2 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5参照]

8.3 肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.7参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 感染症を合併している患者

骨髄抑制等により、感染症が増悪するおそれがある。[11.1.2参照]

9.1.2 末梢性ニューロパチーを合併している患者

症状を悪化させるおそれがある。[11.1.3参照]

9.3 肝機能障害患者

本剤を構成するモノメチルアウリスタチンE(MMAE)は主に肝代謝により消失することから、肝機能障害はMMAEの血中濃度を上昇させる可能性がある。なお、肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。

9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は、適切な避妊法を用いるよう指導すること。[9.5参照]

9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。[15.2参照]

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物試験(ラット)において、妊娠6日目及び13日目にMMAEを投与したところ、胚・胎児毒性及び催奇形性が報告されている。[9.4.1参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ヒトでの乳汁中移行に関するデータはないが、ヒトIgGは母乳中に移行することが報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

10. 相互作用

MMAEは主にCYP3Aによって代謝される。[16.4参照]

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
強いCYP3A阻害剤 イトラコナゾール、リトナビル、クラリスロマイシン等 [16.7.1参照]	副作用の発現頻度及び重症度が増加するおそれがあるので、CYP3A阻害作用のない薬剤又は中程度以下のCYP3A阻害剤への代替を考慮すること。やむを得ず併用する際には、患者の状態を慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。	強いCYP3A阻害剤との併用により、MMAEの代謝が阻害され、MMAEの血中濃度が上昇する可能性がある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

*11.1.1 骨髄抑制(49.2%)

好中球減少(31.6%)、発熱性好中球減少症(10.2%)、貧血(21.7%)、血小板減少(14.7%)、白血球減少(11.3%)、リンパ球減少(6.8%)等があらわれることがある。[8.1参照]

*11.1.2 感染症(20.3%)

重篤な肺炎(3.6%)及び敗血症(1.8%)等、日和見感染を含む感染症があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。[9.1.1参照]

*11.1.3 末梢性ニューロパチー(34.5%)

末梢性ニューロパチー(19.4%)、末梢性感覺ニューロパチー(15.3%)、多発ニューロパチー(0.9%)、末梢性運動ニューロパチー(0.5%)等があらわれることがあるので、感覺鈍麻、筋力低下、錯覚、知覚過敏等の症状があらわれた場合には、本剤の休薬、減量又は中止等を考慮すること。[9.1.2参照]

*11.1.4 Infusion reaction(6.5%)

嘔吐、発疹、発熱、悪寒、紅潮、呼吸困難、低血圧等を含むinfusion reactionがあらわれることがあり、多くの場合は、初回投与時に発現が認められたが、2回目以降の投与時にも認められている。異常が認められた場合には、本剤の投与を中断又は中止し適切な処置を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[7.2参照]

*11.1.5 腫瘍崩壊症候群(0.7%)

異常が認められた場合は本剤の投与を中止し、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[8.2参照]

11.1.6 進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)

本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知機能障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、構音障害、失語等の症状があらわれた場合には、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

*11.1.7 肝機能障害(6.8%)

トランサミナーゼやビリルビン値の上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。[8.3参照]

11.2 その他の副作用

	10%以上	3%以上10%未満	3%未満
* 皮膚		脱毛症、発疹	皮膚乾燥、爪の障害、そう痒症、尋麻疹、全身性剥脱性皮膚炎
肝臓			LDH上昇
* 腎臓			血中クレアチニン增加、血尿
* 免疫系			低γグロブリン血症、免疫グロブリン減少
* 消化器	悪心(22.6%)、便秘(17.6%)、下痢(17.1%)	嘔吐、口内炎、腹痛	消化不良、口内乾燥、リバーゼ増加、腹部膨満、アミラーゼ増加、胃酸逆流

		10%以上	3%以上10%未満	3%未満
* 心・血管系				高血圧、血管炎
* 筋骨格系				筋痙攣、筋骨格痛、四肢痛、関節痛
* 呼吸器		呼吸困難		咳嗽、口腔咽頭痛、肺臓炎、鼻出血、咽頭の炎症
* 精神・神経系		味覚異常、錯覚、頭痛		浮動性めまい
* 代謝	食欲減退			脱水、低カリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミン血症、低カルシウム血症
* その他	疲労(19.9%)	無力症、体重減少、発熱、倦怠感		粘膜の炎症、悪寒、浮腫、全身健康状態低下、歩行障害

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 溶解

(1) 日局注射用水(点滴静注用30mg : 1.8mL、点滴静注用140mg : 7.2mL)により溶解してポラツスマブ ベドチン(遺伝子組換え)を20mg/mLの濃度にした後、静かにバイアルを回転させ、完全に溶解すること。変色、くもり又は粒子が溶解液に認められた場合は使用しないこと。

(2) 溶解後速やかに希釈しない場合は、2~8°Cで保存し、24時間以内に投与すること。残液は廃棄すること。

14.1.2 希釈

(1) 必要量をバイアルから抜き取り、ポラツスマブ ベドチン(遺伝子組換え)の希釈後の濃度が0.72mg/mLから2.70mg/mLになるように、日局生理食塩液、5%ブドウ糖溶液のいずれかの輸液バッグを用いて希釈する。静かに輸液バッグを回転させて混和すること。他剤と混和しないこと。

(2) 抗体タンパクが凝集するおそれがあるので、希釈後に決して激しい振動を加えないこと。

(3) 調製後、希釈した液は速やかに使用すること。なお、やむを得ず希釈した液を保存する場合は、2~8°Cで保存し、24時間以内に使用すること。残液は廃棄すること。

14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 0.2又は0.22μmインラインフィルターを通して投与すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

臨床試験において、本剤に対する抗体の産生が報告されている。

15.2 非臨床試験に基づく情報

本剤の構成成分であるMMAEは、ラットの骨髄小核試験で遺伝毒性(異数性誘発作用)を示した。[9.4.2参照]


16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回及び反復投与

日本人の再発又は難治性のB細胞性非ホジキンリンパ腫患者7例に、1サイクルを3週間として、本剤1.0mg/kg^{注1)}又は1.8mg/kgを各サイクルの第1日目に静脈内投与したときの、初回投与後の本剤の血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータ並びに反復投与時の本剤の血漿中濃度推移は以下のとおりであった。また、本剤1.8mg/kg投与時のC_{trough}に基づく本剤の蓄積係数は、第3及び6サイクルで、それぞれ1.67及び2.01であった¹⁾。

注1) 承認用量は1回1.8mg/kg(体重)である。



単回投与時の本剤の薬物動態パラメータ(平均値±標準偏差)

用量 (mg/kg)	例 数	C _{max} (ng/mL)	AUC _{inf} (ng·day/mL)	CL (mL/day/kg)	V _{ss} (mL/kg)	t _{1/2} (day)	T _{max} ^{注2)} (day)
1.0	3	315± 28.7	823± 177	22.2± 4.24	64.3± 21.6	4.43± 0.979 ^{注3)}	0.0896 (0.0833- 0.233)
1.8	3	613± 67.2	2250± 274	14.4± 1.84	91.7± 9.98	7.98± 1.21	0.0903 (0.0889- 0.231)

注2) 中央値(範囲)

注3) n=4

16.3 分布

MMAEのヒト血漿タンパクに対する $in vitro$ 結合率は71~77%であり、血液/血漿中濃度比は1.34~1.65であった²⁾。

16.4 代謝

$in vitro$ 試験においてMMAEは主にCYP3Aで代謝されることが示された³⁾。[10. 参照]

16.5 排泄

ラットにMMAE部分を放射性標識したポラツスマブ ベドチンを10mg/kgで単回静脈内投与したところ、放射能のほとんどは糞中に排泄され、尿中への排泄率は投与量の約5%であった⁴⁾。

16.7 薬物相互作用

16.7.1 ケトコナゾール

生理学的薬物動態モデルに基づいたシミュレーションにおいて、本剤単独投与時に対するケトコナゾール(強いCYP3A阻害剤)併用投与時のMMAEのC_{max}及びAUCの幾何平均値の比は、それぞれ1.18及び1.48と推定された⁵⁾。[10.2参照]

16.7.2 その他

生理学的薬物動態モデルに基づいたシミュレーションにおいて、本剤単独投与時に対するリファンピシン(強いCYP3A誘導剤)併用投与時のMMAEのC_{max}及びAUCの幾何平均値の比は、それぞれ0.71及び0.51と推定された⁵⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈未治療のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫〉

* 17.1.1 國際共同第Ⅲ相試験(GO39942試験[POLARIX試験])


未治療のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)患者[国際予後指標(IPI)2~5の患者が組み入れられ、0又は1の患者は除外された]879例(日本人85例を含む)を対象に、本剤とリツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン及びプレドニゾン(国内未承認)、プレドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用(Pola+R-CHP)療法^{注1)}の有効性及び安全性をリツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン及びプレドニゾン(国内未承認)、プレドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用(R-CHOP)療法^{注2)}と比較する第Ⅲ相ランダム化二重盲検プラセボ対照試験を実施した。主要評価項目である主治医評価による無増悪生存期間について、Pola+R-CHP療法のR-CHOP療法に対する優越性が検証された(層別ハザード比[95%信頼区間]: 0.73[0.57, 0.95]、[層別log-rank検定:P=0.0177(両側有意水準0.05)]、2021年6月28日データカットオフ)。本剤が投与された435例中419例(日本人44例を含む)(96.3%)に副作用が認められた。主な副作用は、悪心36.8%(160/435例)、好中球減少症29.7%(129/435例)、貧血27.1%(118/435例)、疲労25.1%(109/435例)、脱毛症23.9%(104/435例)、便秘23.4%(102/435例)、末梢性ニューロパシー23.2%(101/435例)、下痢20.7%(90/435例)であった⁶⁾。[5., 7.1参照]

注1)3週間を1サイクルとし、第1~6サイクルは、本剤1.8mg/kg、

リツキシマブ375mg/m²、シクロホスファミド750mg/m²及びドキソルビシン50mg/m²を各サイクルDay1に投与し、プレドニゾン(国内未承認)100mg、プレドニゾロン100mg又はメチルプレドニゾロン80mgを各サイクルのDay1~5に投与。第7及び8サイクルは、リツキシマブ375mg/m²を各サイクルのDay1に投与。

注2)3週間を1サイクルとし、第1~6サイクルは、リツキシマブ375mg/m²、シクロホスファミド750mg/m²、ドキソルビシン50mg/m²及びビンクリスチン1.4mg/m²(上限2mg)を各サイクルDay1に投与し、プレドニゾン(国内未承認)100mg、プレドニゾロン100mg又はメチルプレドニゾロン80mgを各サイクルのDay1~5に投与。第7及び8サイクルは、リツキシマブ375mg/m²を各サイクルのDay1に投与。

無増悪生存期間のKaplan-Meier曲線



〈再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫〉

17.1.2 海外第Ⅰb/Ⅱ相試験(GO29365試験)

GO29365試験の第Ⅱ相ランダム化パートでは、自家造血幹細胞移植の適応とならない再発又は難治性のDLBCL患者80例を対象に、ベンダムスチン+リツキシマブ併用療法(BR療法;40例)を対照群とし、本剤とBRの併用療法(Pola+BR療法;40例)の有効性及び安全性を検討した。本剤は1.8mg/kg、ベンダムスチンは90mg/m²、リツキシマブは375mg/m²を3週間を1サイクルとして6サイクル投与した^{注3)}。その結果、主要評価項目である独立評価委員会評価によるPrimary Response Assessment(PRA、本剤最終投与後6~8週)時点におけるPET-CTを用いた完全奏効割合は、Pola+BR療法群では40.0%(16/40例)(95%信頼区間: 24.9~56.7%)、BR療法群では17.5%(7/40例)(95%信頼区間: 7.3~32.8%)であった(2018年4月30日データカットオフ)^{7), 8)}。

本剤が投与された39例中36例(92.3%)に副作用が認められた。主な副作用は、好中球減少症53.8%(21/39例)、血小板減少症41.0%(16/39例)、下痢及び貧血が各33.3%(13/39例)、疲労及び悪心が各23.1%(9/39例)、発熱及び末梢性ニューロパシーが各20.5%(8/39例)であった⁷⁾。[5., 7.1 参照]

注3)各薬剤の投与時期は以下のとおり。

・本剤: サイクル1 Day2、サイクル2以降は各サイクルDay1

・リツキシマブ: 各サイクルDay1

・ベンダムスチン: サイクル1 Day2及びDay3、サイクル2以降は各サイクルDay1及びDay2

17.1.3 国内第Ⅱ相試験(JO40762試験[P-DRIVE試験])

自家造血幹細胞移植の適応とならない再発又は難治性のDLBCL患者35例を対象に、Pola+BR療法の有効性及び安全性を検討した。本剤は1.8mg/kg、ベンダムスチンは90mg/m²、リツキシマブは375mg/m²を3週間を1サイクルとして6サイクル投与した^{注3)}。主要評価項目である治験責任医師評価によるPRA時点におけるPET-CTを用いた完全奏効割合は34.3%(95%信頼区間: 19.1~52.2%)であった(2019年12月24日データカットオフ)。

本剤が投与された35例中33例(94.3%)に副作用が認められた。主な副作用は、貧血37.1%(13/35例)、悪心31.4%(11/35例)、血小板減少症及び好中球減少症が各25.7%(9/35例)、便秘、血小板数減少及び好中球数減少が各22.9%(8/35例)、倦怠感及び食欲減退が各20.0%(7/35例)であった⁹⁾。[5., 7.1 参照]

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ポラツズマブ ベドチンは、抗CD79bヒト化IgG1モノクローナル抗体と、微小管重合阻害作用を有するMMAEを、リンカーを介して共有結合させた抗体薬物複合体である¹⁰⁾。

ポラツズマブ ベドチンは、腫瘍細胞の細胞膜上に発現するCD79bに結合し、細胞内に取り込まれた後にプロテアーゼによりリンカーが切断され、MMAEが細胞内に遊離する^{11)~14)}。遊離したMMAEは微小管に結合し、細胞分裂を阻害してアポトーシスを誘導すること等により、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられている^{15)~17)}。

18.2 抗腫瘍効果

ポラツズマブ ベドチンは、ヒトびまん性大細胞型B細胞リンパ腫由来WSU-DLCL2細胞株を皮下移植した重症複合型免疫不全マウスにおいて、腫瘍増殖抑制作用を示した^{18), 19)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称: ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)

(Polatuzumab Vedotin(Genetical Recombination))
(JAN)


分子式: ベドチン: C₆₈H₁₀₆N₁₁O₁₅

抗体: 軽鎖(C₁₀₄₀H₁₆₁₆N₂₇₆O₃₄₉S₅)、重鎖(C₂₁₈₂H₃₃₈₅N₅₇₉O₆₆₂S₁₅): 主成分

分子量: 約153,000

構造式: ポラツズマブ ベドチンは、抗体薬物複合体であり、遺伝子組換えモノクローナル抗体(分子量: 約148,000)の平均3~4個のCys残基に、MMAEとリンカーからなるベドチン(1-(6-[(2S)-1-((2S)-5-カルバモイルアミノ)-1-[(4-[(2S)-1-((2S)-1-[(3R,4S,5S)-1-((2S)-2-[(1R,2R)-3-[(1S,2R)-1-ヒドロキシ-1-フェニルプロパン-2-イル]アミノ]-1-メトキシ-2-メチル-3-オキソプロピル]ビロリジン-1-イル]-3-メトキシ-5-メチル-1-オキソヘプタン-4-イル](メチル)アミノ]-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル]アミノ]-1-メチル-1-オキソブタン-2-イル]メチルカルバモイルオキシ|メチルフェニル)アミノ]-1-オキソヘプタン-2-

イル|アミノ)-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル]アミノ|-6-オキソヘキシル)-2,5-ジオキソピロリジン-3-イル基)が結合している。447個のアミノ酸残基からなる重鎖2本及び218個のアミノ酸残基からなる軽鎖2本で構成される糖タンパク質である。



20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

〈再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫〉

21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装

〈ポライバー点滴静注用30mg〉

1バイアル

〈ポライバー点滴静注用140mg〉

1バイアル

*23. 主要文献

- 1) 国内第I相試験(JO29138試験)(2021年3月23日承認、CTD2.7.2.2.3.1)
- 2) MMAEの*in vitro*血漿蛋白質結合及び血球移行(2021年3月23日承認、CTD2.6.4.4.2)
- 3) MMAEの代謝関与酵素の同定(2021年3月23日承認、CTD2.6.4.5.2.1)
- 4) ラットにおけるポラツズマブベドチン投与後のマスバランス(2021年3月23日承認、CTD2.6.4.6.1)
- 5) 薬物相互作用(2021年3月23日承認、CTD2.7.2.3.5.1)
- 6) 社内資料:国際共同第III相試験(GO39942試験[POLARIX試験])
- 7) 海外第Ib/II相試験(GO29365試験)(2021年3月23日承認、CTD2.7.3.1-3、2.7.4.2.1.1)
- 8) Sehn LH, et al. J Clin Oncol 2020;38:155-65.
- 9) 国内第II相試験(JO40762試験[P-DRIVE試験])(2021年3月23日承認、CTD2.7.3.1-3、2.7.4.2.1.1)
- 10) Li D, et al. Br J Pharmacol 2019;176:3805-18.
- 11) Pfeifer M, et al. Leukemia 2015;29:1578-86.
- 12) Polson AG, et al. Blood 2007;110:616-23.
- 13) Polson AG, et al. Cancer Res 2009;69:2358-64.
- 14) Sutherland MSK, et al. J Biol Chem 2006;281:10540-7.
- 15) Bai R, et al. J Biol Chem 1990;265:17141-9.
- 16) Doronina SO, et al. Nat Biotechnol 2003;21:778-84.
- 17) Francisco JA, et al. Blood 2003;102:1458-65.
- 18) WSU-DLCL2移植モデルにおける抗腫瘍効果(2021年3月23日承認、CTD2.6.2.2.2.2)

19) WSU-DLCL2移植モデルにおけるポラツズマブベドチンとリツキシマブ+化学療法薬との併用効果(2021年3月23日承認、CTD2.6.2.2.2.5)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

中外製薬株式会社 メディカルインフォメーション部
〒103-8324 東京都中央区日本橋室町2-1-1
電話：0120-189706
Fax：0120-189705
<https://www.chugai-pharm.co.jp/>

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

CHUGAI | 中外製薬株式会社 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1
 ロシュ グループ

® F.ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）登録商標

