

貯法：室温保存
有効期間：3年

47

漢方製剤

チョウトウ サン

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
有効成分	本品7.5g中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス4.5gを含有する。 日局セッコウ …… 5.0g 日局キクカ …… 2.0g 日局チョウトウコウ…3.0g 日局ニンジン …… 2.0g 日局チンピ …… 3.0g 日局ボウフウ …… 2.0g 日局バクモンドウ…3.0g 日局カンゾウ …… 1.0g 日局ハンゲ …… 3.0g 日局ショウキョウ…1.0g 日局プクリョウ …… 3.0g
添加剤	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物

3.2 製剤の性状

剤形	顆粒剤
色	淡灰褐色
におい	特異なにおい
味	僅かに辛くて酸味がある
識別コード	ツムラ/47

4. 効能又は効果

慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの

6. 用法及び用量

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2 参照]
- 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益気湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン 配合錠 等 [8.2、11.1.1、11.1.2 参照]	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、蕁麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、軟便、下痢、便秘等

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

18.1.1 血圧降下作用

SHRの摘出腸間膜血管において、ノルアドレナリン、カリウム及びカルシウムによる収縮を抑制した¹⁾ (in vitro)。

18.1.2 脳血流保持作用

SHRにおいて、NO合成酵素阻害剤であるN^G-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) を処置したところ、経口投与で認められる脳血流保持作用が消失した²⁾。

18.2 血圧上昇抑制作用

高血圧自然発症ラット（SHR）に経口投与したところ、血圧上昇が抑制された¹⁾。

18.3 脳血流保持作用

SHRに経口投与したところ、脱血による脳血流量の減少が抑制された²⁾。

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g【ボトル】
5kg（500g×10）【パウチ】
2.5g×42包【分包】
2.5g×189包【分包】

23. 主要文献

- Ishii, K. et al. :和漢医薬学会誌. 1987;4 (2) :107-115
- Sugimoto, A. et al. :Jpn. J. Pharmacol. 2000;83 (2) :135-142

24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社ツムラ お客様相談窓口
東京都港区赤坂2-17-11 〒107-8521
TEL：0120-329-970 FAX：03-5574-6610

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元
株式会社ツムラ
東京都港区赤坂2-17-11