

皮膚軟化剤

イオウ・カンフルローション「東豊」

日本薬局方 イオウ・カンフルローション

Sulfur and Camphor Lotion

開封日 年 月 日

500mL

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩 4-15-3

※2020年12月改訂(第6版)  
(組成の記載方法変更)  
2015年8月改訂(第5版)  
(日局に合わせ成分名称変更)

【貯 法】 (1) 気密容器  
(2) 開封後は冷所に保管すること。

【使用期限】 製造の翌月から3年

【注 意】 取扱い上の注意の項参照

【禁 忌】 (次の患者には使用しないこと)  
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

※組成: 1mL中 イオウ 60mg dl-カンフル 5mg  
添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、水酸化カルシウム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル及びエタノールを含む。

性状: 本剤は淡黄色の懸濁液で、放置するとき、成分の一部を分離する。

【効能又は効果】 座瘡、酒皸

【用法及び用量】

1日2回患部に塗布する。朝は上清液、晩は混濁液を用いる。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

日本標準商品分類番号 872669

承認番号	16000AMZ05459
薬価収載	2008年7月
販売開始	1977年10月
再評価結果	1983年4月

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発赤、発疹等
皮膚	皮膚炎

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

眼又は眼の周囲には使用しないこと。

【取扱い上の注意】

- (1) 本剤を小分けするときは容器をよく洗い、本剤をよく振り混ぜて、成分が均等になるように小分けすること。
- (2) 使用時他の薬剤、化粧品が混入しないようにすること。
- (3) 空気中の炭酸ガスを吸収して炭酸カルシウムの浮遊物がみられることがある。

製造番号

使用期限

