

貯法：室温保存  
有効期間：3年

パーキンソン病治療薬・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦活剤)

劇薬 処方箋医薬品<sup>注</sup>

ゾニサミド口腔内崩壊錠

## ゾニサミドOD錠25<sub>mg</sub>TRE「杏林」

パーキンソン病治療薬(レボドパ賦活剤)

劇薬 処方箋医薬品<sup>注</sup>

ゾニサミド口腔内崩壊錠

## ゾニサミドOD錠50<sub>mg</sub>TRE「杏林」

ZONISAMIDE OD Tablets TRE

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）


- 1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5参照]
- 2 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	ゾニサミドOD錠 25mgTRE「杏林」	ゾニサミドOD錠 50mgTRE「杏林」
有効成分 (1錠中)	日局ゾニサミド 25mg	日局ゾニサミド 50mg
添加剤	D-マンニトール、D-マンニトール・低置換度ヒドロキシプロピルセルロース・ポリビニルアルコール（完全けん化物）造粒物、結晶セルロース、クロスボビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、タルク、クエン酸トリエチル、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸マグネシウム	D-マンニトール、D-マンニトール・低置換度ヒドロキシプロピルセルロース・ポリビニルアルコール（完全けん化物）造粒物、結晶セルロース、クロスボビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、タルク、クエン酸トリエチル、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸マグネシウム、黄色三酸化鉄

#### 3.2 製剤の性状

販売名	ゾニサミドOD錠 25mgTRE「杏林」	ゾニサミドOD錠 50mgTRE「杏林」
剤形	素錠	割線入り素錠
色調	白色～帯黄白色	微黄白色～淡黄白色
外形		
直径(mm)	8.0	10.5
厚さ(mm)	3.2	3.8
質量(mg)	200	400

### 4. 効能又は効果

#### 〈OD錠25mg〉

##### ○パーキンソン病

（レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合）

##### ○レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム

（レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合）

#### 〈OD錠50mg〉

##### パーキンソン病

（レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合）

### 6. 用法及び用量

#### 〈OD錠25mg〉

本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。

##### パーキンソン病

通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。なお、パーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off現象）の改善には、1日1回50mgを経口投与する。

##### レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム

通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。

#### 〈OD錠50mg〉

##### パーキンソン病

本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。

通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。なお、パーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off現象）の改善には、1日1回50mgを経口投与する。

### 7. 用法及び用量に関連する注意

#### 〈パーキンソン病〉

本剤の1日50mg投与において、1日25mg投与時を上回るon時の運動機能の改善効果は確認されていない。[17.1.1、17.1.2参照]

### 8. 重要な基本的注意

- 1 連用中は定期的に肝・腎機能、血液検査を行うことが望ましい。[11.1.4参照]
- 2 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
- 3 発汗減少があらわれることがあり、特に夏季に体温が上昇することがあるので、本剤投与中は体温上昇に留意し、このような場合には高温環境下をできるだけ避け、適切な処置を行うこと。[11.1.10参照]
- 4 本剤投与中又は投与中止後に、自殺企図があらわれることがあるので、患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。[11.2、15.1.3、15.1.4参照]

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.3 肝機能障害患者

##### 9.3.1 重篤な肝機能障害又はその既往歴のある患者

血中濃度が上昇するおそれがある。

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。妊娠中にゾニサミド製剤を投与された患者が心室中隔欠損、心房中隔欠損等を有する児を出産したとの報告があり、動物実験（マウス、ラット、イヌ、サル）で流産、催奇形作用（口蓋裂、心室中隔欠損等）が報告されている。また、妊娠中にゾニサミド製剤を投与された患者の児に呼吸障害があらわれたとの報告がある。[2.1参照]

#### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ヒト母乳中への移行が報告されている。

## 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能（腎機能、肝機能等）が低下している。

## 10. 相互作用

本剤は、主として薬物代謝酵素CYP3Aで代謝される。[16.4.2参照]

### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗てんかん剤 フェニトイン カルバマゼピン フェノバルビ タール バルプロ酸 等	本剤と抗てんかん剤の併用時、これらの薬剤を減量又は中止した場合に、本剤の血中濃度が上昇することがある。	フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタールではCYPが誘導され、本剤の血中濃度が低下することが示唆されている。
フェニトイン	眼振、構音障害、運動失調等のフェニトインの中毒症状があらわれることがあるので、できるだけ血中濃度を測定し、減量するなど適切な処置を行うこと。	本剤によりフェニトインの代謝が抑制され、血中濃度が上昇することが示唆されている。
三環系抗うつ剤 アミトリプチリン等 四環系抗うつ剤 マプロチリン等	MAO-B阻害作用を有するセレギリンにおいて、三環系抗うつ剤との併用により、高血圧、失神、不全収縮、発汗、てんかん、動作・精神障害の変化及び筋強剛といった副作用があらわれ、更に死亡例も報告されている。	相加・相乗作用によると考えられる。
レセルピン誘導體 レセルピン等	本剤の作用が减弱される可能性がある。	脳内ドパミンを減少させる。
フェノチアジン系 薬剤 クロルプロマジン等 ブチロフェノン系 薬剤 ハロペリドール 等 スルピリド メトクロプラミド		脳内ドパミン受容体を遮断する。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 悪性症候群（1%未満）

本剤投与中又は投与中止後に悪性症候群があらわれることがある。発熱、意識障害、無動無言、高度の筋硬直、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗、血清CKの上昇等があらわれた場合には、体冷却、水分補給等の全身管理、及び再投与後に漸減するなど適切な処置を行うこと。なお、本症発症時には、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。

#### 11.1.2 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、紅皮症（剥脱性皮膚炎）（いずれも頻度不明）

発熱、紅斑、水疱・びらん、そう痒感、咽頭痛、眼充血、口内炎等の異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.3 過敏症症候群（頻度不明）

初期症状として発疹、発熱がみられ、さらにリンパ節腫脹、肝機能障害等の臓器障害、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス6（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

#### 11.1.4 再生不良性貧血、無顆粒球症、赤芽球癆（いずれも頻度不明）、血小板減少（1%未満）

[8.1参照]

#### 11.1.5 急性腎障害（頻度不明）

#### 11.1.6 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.7 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

AST、ALT、γ-GTPの上昇等を伴う重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

#### 11.1.8 横紋筋融解症（1%未満）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

#### 11.1.9 腎・尿路結石（1%未満）

腎疝痛、排尿痛、血尿、結晶尿、頻尿、残尿感、乏尿等があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.1.10 発汗減少に伴う熱中症（頻度不明）

発汗減少があらわれ、体温が上昇し、熱中症をきたすことがある。発汗減少、体温上昇、顔面潮紅、意識障害等がみられた場合には、投与を中止し、体冷却等の適切な処置を行うこと。[8.3参照]

#### 11.1.11 幻覚（1%以上）、妄想、錯乱、せん妄（いずれも1%未満）等の精神症状

### 11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
過敏症		発疹、湿疹、そう痒感	
精神神経系	眠気（6.7%）、ジスキネジア、気力低下、抑うつ、めまい・ふらつき、睡眠障害、頭痛・頭重、幻視・幻聴	精神活動緩慢化、不安・不穏、精神症状の悪化、感覚異常、無気力・自発性低下、異常感、激越、行動異常、興奮、認知症の悪化、意識消失、異常な夢、自殺企図 <sup>注)</sup> 、ジストニア、しびれ感、認知障害	運動失調
循環器		血圧低下、動悸、起立性低血圧、血圧上昇、上室性期外収縮、心室性期外収縮	
消化器	食欲不振（5.2%）、悪心、口渇、胃不快感、便秘	嘔吐、下痢、味覚異常、胸やけ、腹部膨満感、流涎、胃炎、嚥下障害、胃痛、歯周炎、腹部不快感、胃潰瘍、口内炎、歯肉炎	
血液		白血球減少、赤血球減少、ヘモグロビン減少、白血球増加、ヘマトクリット減少、貧血、顆粒球減少、血小板減少、好酸球増多	

	1%以上	1%未満	頻度不明
肝臓	ALT、ALP、AST、LDH上昇	γ-GTP上昇、肝機能異常	
腎・泌尿器	BUN上昇	排尿障害、頻尿、クレアチニン上昇、尿失禁、尿中蛋白陽性、膀胱炎	
その他	体重減少、CK上昇、立ちくらみ、浮腫、倦怠感	脱力感、転倒、発熱、血中カリウム減少、トリグリセリド上昇、腰痛、視覚障害、四肢痛、脱水、気管支炎、筋肉痛、血中尿酸上昇、血糖上昇、呼吸困難、前立腺癌、打撲、汗疹、関節痛、顔面潮紅、血中コレステロール上昇、骨折、体重増加、脱毛、白内障、副鼻腔炎	発汗減少

注) [8.4、15.1.3、15.1.4参照]

### 13. 過量投与

#### 13.1 症状

昏睡状態、ミオクローヌス、眼振等の症状があらわれる。

#### 13.2 処置

特異的な解毒剤は知られていない。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

### 15. その他の注意

#### 15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。

15.1.2 血清免疫グロブリン (IgA、IgG等) の異常があらわれることがある。

15.1.3 パーキンソン病患者を対象とした国内臨床試験において、トレリーフ錠を投与された患者での自殺又は自殺関連行為の副作用発現割合は0.24% (2/842例) であった。また、パーキンソニズムを伴うレビー小体型認知症患者を対象とした国内臨床試験では、自殺又は自殺関連行為の副作用は発現していない。[8.4、11.2、15.1.4参照]

15.1.4 海外で実施されたゾニサミド製剤 (承認外効能・効果、用法・用量) を含む複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬服用群でプラセボ群と比較して約2倍高く (抗てんかん薬服用群:0.43%、プラセボ群:0.24%)、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ1,000人あたり1.9人多いと計算された (95%信頼区間:0.6~3.9)。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセボ群と比べ1,000人あたり2.4人多いと計算されている。なお、海外臨床試験におけるゾニサミド製剤の自殺念慮及び自殺企図の発現率は0.45%であり、プラセボ群では0.23%であった。[8.4、11.2、15.1.3参照]

### 16. 薬物動態

#### 16.1 血中濃度

##### 16.1.1 単回投与

水で服用の結果 (健康成人23例、ゾニサミドとして25mgを1回投与) <sup>1)</sup>

剤形	T <sub>max</sub> (h) <sup>a)</sup>	C <sub>max</sub> (μg/mL) <sup>b)</sup>	t <sub>1/2</sub> (h) <sup>b)</sup>	AUC <sub>0-96</sub> (μg・h/mL) <sup>b)</sup>
ゾニサミドOD錠25mg	8.0(1.0-12.0)	0.100±0.015	96.6±32.5	7.16±0.93
ゾニサミド錠25mg	4.0(1.0-24.0)	0.099±0.015	99.1±24.2	7.00±0.87

a) 中央値 (最小値-最大値)、b) 平均値±標準偏差

水なしで服用の結果 (健康成人23例、ゾニサミドとして25mgを1回投与)

剤形	T <sub>max</sub> (h) <sup>a)</sup>	C <sub>max</sub> (μg/mL) <sup>b)</sup>	t <sub>1/2</sub> (h) <sup>b)</sup>	AUC <sub>0-96</sub> (μg・h/mL) <sup>b)</sup>
ゾニサミドOD錠25mg	6.0(1.0-12.0)	0.101±0.027	119.1±39.2	6.83±1.54
ゾニサミド錠25mg	4.0(1.0-12.0)	0.100±0.023	102.4±36.4	6.77±1.50

a) 中央値 (最小値-最大値)、b) 平均値±標準偏差

##### 16.1.2 反復投与

###### <パーキンソン病>

1日1回25mg又は50mgを4週間経口投与したときの定常状態でのトラフ濃度は、それぞれ1.14±0.48 μg/mL (108例の平均値±標準偏差)、2.57±0.86 μg/mL (105例の平均値±標準偏差) であった<sup>2)</sup>。(ゾニサミド錠のデータ)

###### <レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム>

1日1回25mg又は50mg<sup>注)</sup>を4週間経口投与したときの定常状態でのトラフ濃度は、それぞれ1.43±0.34 μg/mL (39例の平均値±標準偏差)、3.43±1.34 μg/mL (37例の平均値±標準偏差) であった<sup>3)</sup>。(ゾニサミド錠のデータ)

##### 16.1.3 生物学的同等性

健康成人にゾニサミドOD錠25mgとゾニサミド錠25mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠 (ゾニサミドとして25mg)、水あり (23例) 及び水なし (23例) で1回経口投与して血漿中ゾニサミド濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C<sub>max</sub>) について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>1)</sup>。

##### 16.1.4 生物学的同等性試験

###### <ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」>


ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」とトレリーフOD錠25mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠 (ゾニサミドとして25mg) 健康成人男子に絶食時単回経口投与 (水なしで服用及び水で服用) して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C<sub>max</sub>) について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、その対数値の平均値の差がlog (0.90) ~ log (1.11) の範囲内にあり、かつ、平均値の差の90%信頼区間がlog (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両製剤の生物学的同等性が確認された<sup>4)</sup>。

—水なしで服用—

薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-192</sub> (ng・h/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (h)	t <sub>1/2</sub> (h)
ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」	12606.7 ±1789.4	120.20 ±22.42	8.00 ±8.46	111.1 ±42.1
トレリーフOD錠25mg	12034.2 ±1601.4	113.69 ±18.02	6.36 ±3.56	109.9 ±23.5

(平均値±標準偏差、n=14)




一水で服用一

薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-192</sub> (ng・h/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (h)	t <sub>1/2</sub> (h)
ゾニサミドOD錠 25mgTRE「杏林」	11014.3 ±2036.9	114.06 ±22.68	7.57 ±6.35	112.6 ±29.4
トレリーフ OD錠25mg	10809.4 ±1968.9	111.63 ±25.94	4.43 ±3.39	134.2 ±45.8

(平均値±標準偏差, n=14)



血漿中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

## 16.2 吸収

### 16.2.1 食事の影響

健康成人12例において、空腹時及び食後に25mg単回投与したときの薬物動態パラメータを比較した結果、バイオアベイラビリティに対する食事の影響はほとんど認められなかった<sup>5)</sup>。(ゾニサミド錠のデータ)

## 16.3 分布

### 16.3.1 血清蛋白結合率

48.6% (*in vitro*、ヒト血清、限外ろ過法)<sup>6)</sup>

## 16.4 代謝

### 16.4.1 主な代謝産物及び代謝経路

主として肝臓で代謝され、イソキサゾール環開裂体を生成した後、グルクロン酸抱合等を受ける<sup>7)</sup>。

### 16.4.2 代謝酵素

主としてCYP3A<sup>8)</sup> [10. 参照]

## 16.5 排泄

### 16.5.1 排泄経路

主として尿中<sup>7)</sup>

## 16.5.2 排泄率

経口投与後2週間における尿中排泄率は、未変化体として28.9~47.8%、主代謝物(イソキサゾール環開裂体のグルクロン酸抱合体)として12.4~18.7%であった。これらは投与量の47.6~60.2%であった<sup>7)</sup>(健康成人、200mg 1回、200mg/日又は400mg/日<sup>注</sup> 2日間投与)。

## 16.6 特定の背景を有する患者

### 16.6.1 腎機能障害患者

(300mg 1回<sup>注</sup>) 経口投与(外国人データ)<sup>9)</sup>

クレアチニンクリアランス (mL/min)	T <sub>max</sub> (h)	C <sub>max</sub> (μg/mL)	t <sub>1/2</sub> (h)	CL <sub>r</sub> <sup>a)</sup> (mL/min)	Ae <sup>b)</sup> (%)
>60	3.3	3.64	58	3.42	16.8
20~60	4.3	3.73	58	2.50	11.9
<20	2.9	4.08	63	2.23	13.3

a) 腎クリアランス

b) 尿中排泄率(投与後8日間までに尿中に排泄されたゾニサミドの用量に対する百分率)

腎クリアランス及び尿中排泄率で正常腎機能患者との間に差が認められた。

注) 本剤のパーキンソン病に対する承認用量は1日25~50mg、レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズムに対する承認用量は1日25mgである。

## 16.8 その他

(ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」)

ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(令和2年3月19日 薬生薬審発0319第1号)」に基づき、ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた<sup>10)</sup>。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

ゾニサミド錠の国内臨床試験成績は以下のとおりであった。

#### 〈パーキンソン病〉

#### 17.1.1 国内後期第Ⅱ相/第Ⅲ相試験

レボドパ製剤による治療で十分な効果が得られていないパーキンソン病患者347例を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験を実施した結果、25mg投与群ではプラセボ投与群に比べ主要評価項目としたUPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) Part III合計スコア(運動能力検査)が改善し、有効性が認められた<sup>11)</sup>、<sup>12)</sup>。[7. 参照]

UPDRS Part III合計スコア及び変化量(最終評価時-ベースライン)

投与群	症例数	ベースライン	最終評価時	変化量		検定 <sup>b)</sup>
				調整平均値 <sup>a)</sup>	標準誤差 <sup>a)</sup>	
プラセボ群	81	22.9	21.0	-2.0	0.8	—
25mg群	76	26.5	19.8	-6.3	0.8	p<0.001
50mg群	82	22.5	16.8	-5.8	0.8	p=0.003

投与期間:12週間

a) ベースライン値を共変量とした共分散分析モデルより算出。

b) Dunnett検定(vsプラセボ群)

ゾニサミドの副作用発現頻度は25mg群で40.5%(32/79例)、50mg群で49.4%(42/85例)であり、主な副作用(発現頻度が5%以上)は25mg群で体重減少(5.1%)、50mg群で傾眠(12.9%)、食欲減退(7.1%)、血中クレアチンホスホキナーゼ増加(7.1%)、気力低下(5.9%)であった。

#### 17.1.2 国内第Ⅲ相試験(運動機能スコアによる評価)

レボドパ製剤による治療で十分な効果が得られていないパーキンソン病患者(UPDRS Part III合計スコア10点以上)196例を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験を実施した結果、25mg投与群ではプラセボ投与群に比べ主要評価項目としたUPDRS Part III合計スコア(運動能力検査)が改善し、有効性が認められた<sup>13)</sup>、<sup>14)</sup>。[7. 参照]

UPDRS Part III合計スコア及び変化量（最終評価時-ベースライン）

投与群	症例数	ベースライン	最終評価時	変化量		検定 <sup>b)</sup>
				調整平均値 <sup>a)</sup>	標準誤差 <sup>a)</sup>	
プラセボ群	63	21.5	18.7	-2.9	0.9	—
25mg群	61	21.4	15.6	-5.9	0.9	p=0.029
50mg群	60	23.0	17.6	-5.5	0.9	p=0.073

投与期間:12週間

a) ベースライン値を共変量とした共分散分析モデルより算出。

b) Dunnett検定 (vsプラセボ群)

ゾニサミドの副作用発現頻度は25mg群で30.2% (19/63例)、50mg群で34.9% (22/63例) であり、主な副作用 (発現頻度が3%以上) は25mg群でジスキネジー、傾眠、幻覚、食欲減退 (各3.2%)、50mg群で傾眠、悪心 (各4.8%)、不眠症、ジスキネジー、無力症、幻覚 (各3.2%) であった。

### 17.1.3 国内第Ⅲ相試験 (off時間による評価)

レボドパ製剤による治療で十分な効果が得られていない、wearing-off現象を発現したパーキンソン病患者 (off時間が1日2時間以上発現) 389例を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験を実施した結果、50mg投与群ではプラセボ投与群に比べ主要評価項目としたoff時間が短縮し、有効性が認められた<sup>15)、16)</sup>。

off時間 (時間/日) 及び変化量 (最終評価時-ベースライン)

投与群	症例数	ベースライン	最終評価時	変化量		検定 <sup>b)</sup>
				調整平均値 <sup>a)</sup>	標準誤差 <sup>a)</sup>	
プラセボ群	129	6.303	6.300	-0.011	0.173	—
25mg群	125	6.435	5.991	-0.436	0.176	p=0.086
50mg群	121	6.377	5.657	-0.719	0.179	p=0.005

投与期間:12週間

a) ベースライン値を共変量とした共分散分析モデルより算出。

b) 閉検定手順 (vsプラセボ群)

### レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム)

#### 17.1.4 国内第Ⅲ相試験

レボドパ製剤を12週間以上連続して服用中のパーキンソニズムを伴うレビー小体型認知症患者351例を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験を実施した結果、ゾニサミド25mg投与群はプラセボ投与群に比べ主要評価項目としたUPDRS Part III合計スコア (運動能力検査) が改善し、有効性が認められた<sup>17)、18)</sup> (本試験では、ゾニサミドの投与群として25mg投与群、50mg投与群<sup>注)</sup> の2群を設定した。)

UPDRS Part III合計スコア及び変化量 (12週時-ベースライン)

投与群	症例数	ベースライン	最終評価時	変化量		検定 <sup>b)</sup>
				調整平均値 <sup>a)</sup>	標準誤差 <sup>a)</sup>	
プラセボ群	118	30.5	29.2	-1.4	0.6	—
25mg群	117	31.9	28.1	-4.1	0.6	p=0.005

投与期間:12週間

a) ベースライン値を共変量とし、投与群、評価時期とその交互作用、実施医療機関を含むMMRM (Mixed Model for Repeated Measures) 法で算出。

b) Hochberg法により多重性を調整。

ゾニサミドの副作用発現頻度は25mg群で15.4% (18/117例) であり、主な副作用 (発現頻度が1%以上) は傾眠 (3.4%)、体重減少 (1.7%)、精神症状 (1.7%) であった。

注) 本剤のレビー小体型認知症に伴うパーキンソニズムに対する承認用量は1日25mgである。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

作用機序はまだ完全に解明されていないが、6-ヒドロキシドパミン (6-OHDA) により片側黒質線条体のドパミン神経を選択的に破壊したパーキンソン病モデルラット (片側6-OHDA処置ラット) を用いた脳微小透析法による実験において、レボドパ (ベンセラジド塩酸塩含有) 併用下における破壊側線条体細胞外液中ドパミンレベルに対し有意な上昇作用を示す。また、ラット及びサル線条体ミトコンドリア・シナプトソーム膜標本中のMAO活性を阻害し、その阻害作用は比較的MAOのB型に選択性を示す<sup>19)</sup>。さらに、T型Caチャネル及びNaチャネル (ともにヒト遺伝子組換えタンパク質) に対して、それぞれのチャネルにおける電流の阻害作用を示す<sup>20)</sup>。

### 18.2 レボドパ作用の増強効果

レスセルピン処置パーキンソン病モデルラットにおけるレボドパ (ベンセラジド塩酸塩含有) 惹起運動亢進に対して増強効果を示す<sup>21)</sup>。

### 18.3 レボドパ作用の延長効果

片側6-OHDA処置ラットにおけるレボドパ (ベンセラジド塩酸塩含有) 惹起回転運動の持続時間に対して延長効果を示す<sup>22)</sup>。

### 18.4 実験的wearing-off現象の改善効果

片側6-OHDA処置ラットへの高用量塩酸メチルドパ (ベンセラジド塩酸塩含有) 反復投与により惹起した実験的wearing-off現象に対して改善効果を示す<sup>23)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名:ゾニサミド (Zonisamide)

化学名:1,2-Benzisoxazol-3-ylmethanesulfonamide


分子式:C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>S

分子量:212.23

性状:白色〜微黄色の結晶又は結晶性の粉末である。

アセトン又はテトラヒドロフランに溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、エタノール (99.5) に溶けにくく、水に極めて溶けにくい。

化学構造式:



融点:164~168°C

## 20. 取扱い上の注意

アルミビロー開封後は湿気を避けて保存すること。

## 22. 包装

〈ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」〉

30錠 [10錠 (PTP) ×3、乾燥剤入り]

〈ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」〉

30錠 [10錠 (PTP) ×3、乾燥剤入り]

## 23. 主要文献

- 1) 白倉健史ほか: BIO Clinica. 2014; 29(13):78-81
- 2) 反復投与① (トレリーフ錠: 2013年8月20日承認、審査報告書)
- 3) 反復投与② (トレリーフ錠、同OD錠: 2018年7月2日承認、申請資料概要2.5.3.1)
- 4) キョーリンリメディオ株式会社社内資料:  
ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料
- 5) 食事の影響試験 (トレリーフ錠: 2009年1月21日承認、申請資料概要2.7.1.2)
- 6) Matsumoto K., et al.: Arzneim-Forsch./Drug Res. 1983; 33: 961-968
- 7) Ito T., et al.: Arzneim-Forsch./Drug Res. 1982; 32: 1581-1586
- 8) Nakasa H., et al.: Mol. Pharmacol. 1993; 44: 216-221
- 9) ゾニサミドの腎機能障害患者における薬物動態 (トレリーフ錠: 2009年1月21日承認、申請資料概要2.7.2.2)

- 10) キョーリンリメディオ株式会社社内資料：  
ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料
- 11) 国内後期第Ⅱ相/第Ⅲ相試験①（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.7.6）
- 12) 国内後期第Ⅱ相/第Ⅲ相試験②（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.7.3.2）
- 13) Murata M., et al.: Neurol. Clin. Neurosci. 2016; 4: 10-15
- 14) 国内第Ⅲ相試験（運動機能スコアによる評価）（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.7.6）
- 15) Murata M., et al.: Mov. Disord. 2015; 30: 1343-1350
- 16) 国内第Ⅲ相試験（off時間による評価）（トレリーフ錠：2013年8月20日承認、審査報告書）
- 17) レビー小体型認知症患者対象臨床試験（第3相試験）（トレリーフ錠、同OD錠：2018年7月2日承認、申請資料概要2.7.6.2）
- 18) UPDRS Part Ⅲ合計スコア及び変化量（トレリーフ錠、同OD錠：2018年7月2日承認、申請資料概要2.7.3.3）
- 19) 脳内ドパミンレベル増加作用及びMAO阻害作用（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.6.2.2）
- 20) チャネル阻害作用（トレリーフ錠、同OD錠：2018年7月2日承認、申請資料概要2.6.2.2）
- 21) レボドパ作用の増強効果（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.6.2.2）
- 22) レボドパ作用の延長効果（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.6.2.2）
- 23) 実験的wearing-off現象の改善効果（トレリーフ錠：2009年1月21日承認、申請資料概要2.6.2.2）

#### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

キョーリンリメディオ株式会社 学術部  
〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1  
TEL 0120-960189  
FAX 0120-189099

#### 26. 製造販売業者等

##### 26.1 製造販売元

## キョーリンリメディオ株式会社

富山県南砺市井波885番地

##### \*26.2 販売元

## 杏林製薬株式会社

東京都千代田区大手町一丁目3番7号