

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16000AMZ04071

販売開始 1993年9月

収斂・消炎・保護剤  
亜鉛華単／亜鉛華軟膏

# 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」

## ZINC OXIDE(10%)SIMPLE OINTMENT

### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

重度又は広範囲の熱傷には使用しないこと。〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

有効成分	100g中 日局酸化亜鉛 10g
添加剤	ミツロウ、ダイズ油、ジブチルヒドロキシトルエン

#### 3.2 製剤の性状

性状	淡黄色で、僅かに特異なおいがある。
----	-------------------

### 4. 効能又は効果

- 下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐  
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、面皰、せつ、よう
- その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

### 6. 用法及び用量

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状
皮膚	発疹、刺激感等

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤使用時の注意

眼には使用しないこと。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

皮膚のタンパク質に結合又は吸着して不溶性の沈殿物や被膜を形成し、収れん、消炎、保護並びに緩和な防腐作用を現す。また、毛細血管の透過性を減少させ、血漿の浸出や白血球の遊出を抑制するので炎症を抑える（抗炎症作用）と共に、創面又は潰瘍面などを乾燥させる<sup>1)</sup>。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：酸化亜鉛（Zinc Oxide）

分子式：ZnO

分子量：81.38

性状：白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

水、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

空气中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

### 22. 包装

500g（ポリエチレン容器）、15kg（缶）

### 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書，C-2101-2104，  
廣川書店，2021

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部  
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
TEL. 0120-014-561

### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元

 **日興製薬株式会社**  
岐阜県羽島市江吉良町1593

#### 26.2 発売元

 **丸石製薬株式会社**  
大阪市鶴見区今津中2-4-2