

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16100AMZ01317

販売開始 1979年1月

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

日本薬局方 フェノール・亜鉛華リニメント

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」

PHENOL AND ZINC OXIDE LINIMENT 「NIKKO」

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと。
[フェノールが吸収され中毒症状を起こすおそれがある。]

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	100g中 日局液状フェノール 2.2mL、 日局酸化亜鉛 10g
添加剤	グリセリン、トラガント末、カルメロースナ トリウム

3.2 製剤の性状

性状	本品は白色ののり状で、僅かにフェノールの においがある。
----	---------------------------------

4. 効能又は効果

皮膚そう痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

6. 用法及び用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。なお、症状により
適宜増減する。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど
適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状
皮膚	発疹、刺激感等

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 眼には使用しないこと。
- 14.1.2 長期間又は広範囲に使用しないこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

フェノール（2%）の防腐、消毒、鎮痒作用と酸化亜鉛の
収れん作用のほか、皮膚面に塗擦すると水分が蒸発して
トラガントの薄膜が残り、皮膚を保護する作用を有する¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

19.1 液状フェノール

一般名称：液状フェノール（Liquefied Phenol）

性状：本品は無色又は僅かに赤色を帯びた液で、特異な
においがある。本品はエタノール（95）、ジエチルエーテル又は
グリセリンと混和する。本品とグリセリンの等容量混液は水と混和する。
本品は光又は空気によって徐々に暗赤色となる。

本品は皮膚を侵して白くする。

比重 d_{20}^{20} ：約1.065

19.2 酸化亜鉛

一般名称：酸化亜鉛（Zinc Oxide）

分子式：ZnO

分子量：81.38

性状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
本品は水、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエ
チルエーテルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

22. 包装

500g（ガラス容器）

23. 主要文献

- 1) 第十八改正日本薬局方解説書 C-4635-4636, 廣川書店,
2021

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3番地
電話 (03) 3254-1831

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

26.2 発売元

日興製薬販売株式会社
東京都千代田区神田紺屋町32番地