

貯 法：室温保存

有効期間：5年

高コレステロール血症改善ビタミン剤

リボフラビン酪酸エステル錠

# ハイボン錠 20mg

## HIBON Tablets

承認番号 21400AMZ00025

販売開始 1966年8月

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	有効成分	添加剤
ハイボン錠 20mg	1錠中 日本薬局方 リボフラビン酪酸エ ステル 20mg	ステアリン酸マグネシウ ム、マクロゴール6000、カ ルメロースカルシウム、ポ ピドン、乳糖水和物

#### 3.2 製剤の性状

販売名	性状	外形・大きさ		
		直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)
ハイボン錠 20mg	黄色～ 淡褐黄 色の素 錠			
		(長径) 10.5 (短径) 5.5	約 3.5	188

### 4. 効能・効果

- 高コレステロール血症
- ビタミン B<sub>2</sub> 欠乏症の予防及び治療。
- 下記疾患のうち、ビタミン B<sub>2</sub> の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合。
  - 口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎
- ビタミン B<sub>2</sub> の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉體労働時等）。
  - 高コレステロール血症及びビタミン B<sub>2</sub> の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと。

### 6. 用法・用量

リボフラビン酪酸エステルとして、通常、成人1日5～20mgを2～3回に分割経口投与する。  
高コレステロール血症には、通常、成人1日60～120mgを2～3回に分割経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満
消化器	下痢、悪心・嘔吐、胃膨満、腹部膨満	胃不快感、食欲不振

注) 再評価結果を含む

### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

尿を黄変させ、臨床検査値に影響を与えることがある。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

### 16. 薬物動態

#### 16.1 血中濃度

健康成人1名にリボフラビン酪酸エステル87mg（リボフラビンとして50mg）を経口投与すると、血中リボフラビン濃度は2～4時間をピークとする上昇が認められ、24時間後にも投与前よりやや高い値を維持した<sup>1)</sup>。

#### 16.2 吸収

マウスに<sup>14</sup>C-リボフラビン酪酸エステルを経口投与すると、小腸の上半部から吸収された<sup>2)</sup>。

#### 16.3 分布

マウスに<sup>14</sup>C-リボフラビン酪酸エステルを経口投与すると、小腸の上半部から吸収され門脈系を経て肝に取り込まれ、肝静脈から各臓器に運ばれた。リンパ系を介するのは僅かであった。肝臓、腎臓、心臓に著明に取り込まれるが、その他の臓器にもよく取り込まれた<sup>2)</sup>。

#### 16.5 排泄

健康成人1名にリボフラビン酪酸エステル87mg（リボフラビンとして50mg）を経口投与すると、尿中に排泄されたリボフラビン量は最初の4時間で負荷量の約0.7%、24時間で約4.0%であった<sup>1)</sup>。

### 17. 臨床成績

#### 17.2 製造販売後調査等

##### 17.2.1 国内臨床試験

高脂質血症患者を対象とした二重盲検比較試験において、高コレステロール血症に対する有用性が確認されている<sup>3)</sup>。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

経口投与後、体内各組織に貯留され、徐々に親薬物（リボフラビン）に変換されてビタミン B<sub>2</sub> 作用を示す。また、肝のコレステロール生合成抑制とコレステロール排泄若しくは異化作用促進によりコレステロール上昇抑制作用を示すと考えられる<sup>4)</sup>。

#### 18.2 コレステロール上昇抑制作用

家兔にリボフラビン酪酸エステルを投与すると、ラノリン-綿実油投与による血清コレステロール値の上昇を抑制した<sup>5)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見


一般名：リボフラビン酪酸エステル (Riboflavin Butyrate)

化学名：(2R, 3S, 4S)-5-(7, 8-Dimethyl-2, 4-dioxo-3, 4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)pentan-1, 2, 3, 4-tetrayl tetrabutanoate

分子式：C<sub>33</sub>H<sub>44</sub>N<sub>4</sub>O<sub>10</sub>

分子量：656.72

構造式：



融点：146～150℃

性状：・橙黄色の結晶又は結晶性の粉末で、僅かに特異なにおいがあり、味は僅かに苦い。

- ・メタノール、エタノール (95) 又はクロロホルムに溶けやすく、ジエチルエーテルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。
- ・光によって分解する。

## 22. 包装

700錠 [14錠 (PTP) × 50]

1000錠 [瓶、バラ、乾燥剤入り]

## 23. 主要文献

- 1) 吉利 和 他：診断と治療 1971；59：937-940 (L20240219)
- 2) 陳 震東：ビタミン 1968；38 (4)：283-292 (L20240220)
- 3) 五島雄一郎 他：診断と新薬 1994；31 (10)：1662-1690 (L20240221)
- 4) 第十八改正日本薬局方解説書 . 2021：C-6120-C-6123 (L20240222)
- 5) 大川 博 他：基礎と臨床 1974；8 (9)：2641-2649 (L20240223)

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室

〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号

TEL 0120-226-898

FAX 050-3535-8939

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元



**NIPRO**

ニプロ株式会社

大阪府摂津市千里丘新町3番26号